


إجابات أسئلة الدرس

الاتصال عند نقطة



الشكل (١٥-١).

(١) اعتماداً على الشكل (١٥-١) الذي يمثل منحنى الاقتران ق المعروف على مجموعة الأعداد الحقيقية، حدد قيم س التي يكون الاقتران ق عندها غير متصل.

الحل

ق(س) غير متصل عندما $s = 1$ ، $s = 3$

منهاجي 

$$(2) \left. \begin{array}{l} s > 1, \quad s^2 - 1 \\ s \leq 1, \quad 2s \end{array} \right\} = \text{إذا كان ق(س)}$$

منهاجي 

فابحث اتصال الاقتران ق عندما $s = 1$

الحل

ق(س) غير متصل عندما $s = 1$ ؛ لأن نهـا ق(س) غير موجودة.
 $s \leftarrow 1$



$$(3) \left. \begin{array}{l} 1 \neq s, \quad \frac{5}{1+s} \\ 1 = s, \quad 3 \end{array} \right\} = (s) \text{ إذا كان هـ}$$

فابحث اتصال الاقتران هـ عندما $s = 1$

الحل

هـ (س) غير متصل عندما $s = 1$ ؛ لأن هـ (1) \neq نهـا (س) هـ (س).
 $s \leftarrow 1$



$$(4) \left. \begin{array}{l} 1 > s, \quad 3 + s^2 \\ 1 \geq s > 1, \quad s - 5 \\ 1 \leq s, \quad 3 + s^3 \end{array} \right\} = (s) \text{ إذا علمت أن ق (س)}$$

فابحث اتصال الاقتران ق عندما:

$$(أ) \quad s = 1 \quad (ب) \quad s = -1$$

الحل

(أ) ق (س) متصل عندما $s = 1$ ؛ لأن ق (1) $= 4 =$ نهـا ق (س).
 $s \leftarrow 1$

(ب) ق (س) غير متصل عندما $s = -1$ ؛ لأن نهـا ق (س) غير موجودة.
 $s \leftarrow -1$



$$(5) \left. \begin{array}{l} 3 \neq s, \quad \frac{s-3}{3-s} \\ 3 = s, \quad 2 + m \end{array} \right\} = (s) \text{ إذا كان ق (س)}$$

وكان الاقتران ق متصلاً عندما $s = 3$ ، فجد قيمة الثابت م.

الحل

ق (س) متصل عندما $s = 3 \iff$ ق (3) $=$ نهـا ق (س)
 $s \leftarrow 3$

$$1 - = m \iff 1 - = 2 + m$$

$$(6) \left. \begin{array}{l} \text{أ} + \text{س} \\ \text{س} > 2, \\ \text{س} = 2, \\ \text{س} < 2, \end{array} \right\} \text{إذا كان هـ (س) = } \left. \begin{array}{l} 8 \\ \text{ب} + \text{س} = 6 \end{array} \right\}$$

وكان الاقتران هـ متصلًا عندما $\text{س} = 2$ ، فجد قيمة كل من الثابتين: أ، ب.

الحل

هـ (س) متصل عندما $\text{س} = 2$

نهـا هـ (س) = هـ (2) = نهـا هـ (س)

$$\begin{array}{l} \text{س} \leftarrow -2 \\ \text{س} \leftarrow +2 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{أ} + 2 = 8 \\ \text{أ} = 6 \\ \text{ب} + 2 = 8 \\ \text{ب} = 6 \end{array}$$

$$(7) \left. \begin{array}{l} \text{أ} - \text{ب} \\ \text{س} > 1, \\ \text{س} = 1, \\ \text{س} < 1, \end{array} \right\} \text{إذا كان ل (س) = } \left. \begin{array}{l} 4 \\ \text{أ} - \text{ب} + 3 + \text{ب} = 2 \end{array} \right\}$$

وكان الاقتران ل متصلًا عندما $\text{س} = 1$ ، فجد قيمة كل من الثابتين: أ، ب.

الحل

ل (س) متصل عندما $\text{س} = 1$

$$\begin{array}{l} \text{س} \leftarrow -1 \\ \text{س} \leftarrow +1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{ل (س) = ل (1) = 4 \\ \text{أ} - \text{ب} + 3 + \text{ب} = 2 \end{array}$$

① $\text{أ} - \text{ب} = 4$

② $\text{أ} + \text{ب} + 2 = 4$

بحل المعادلتين (1)، (2) ينتج أن $\text{أ} = 3$ ، $\text{ب} = 1$

٨) إذا كان الاقتران ق متصلًا عندما $s = 2$ ، وكانت نهـا 2 ق (s) + $s = 6$ ، فجد قيمة ق (2) .

الحل

$$\text{نهـا } 2 \text{ ق } (s) + s = 6$$

$$\text{نهـا } 2 \text{ ق } (s) + s = 6 \iff \text{نهـا } 2 \text{ ق } (2) = 2$$

وبما أن الاقتران (ق) متصل عندما $s = 2$ ، فإن ق $(2) = 2$