

إجابات أسئلة مراجعة الدرس

المركبات الهيدروكربونية المشبعة

السؤال الأول:

الفكرة الرئيسة: أفسر سبب تسمية الألكانات مركبات هيدروكربونية مشبعة.

لأن جميع الروابط بين ذرات الكربون هي روابط أحادية.

السؤال الثاني:


أوضح المقصود بكل من:

المركبات الهيدروكربونية: هي المواد التي تتكون من كربون وهيدروجين فقط.

التصاوغ: وجود أكثر من صيغة بنائية للصيغة الجزيئية نفسها.



السؤال الثالث:

2 ، أرسم صيغة بنائية للمركب 2-ثنائي ميثيل هكسان.



السؤال الرابع:

IUPAC أسمى المركبات الآتية وفق نظام التسمية العالمي




أ- 6- إيثيل - 3 ، 2 - ثنائي ميثيل أوكتان.


ب- 2 - ميثيل هكسان.

السؤال الخامس:


C_7H_{16} أرسم المتصاوغات البنائية للهبتان ، وأسمي كلاً منها.




هبتان




2- ميثيل هكسان




3- ميثيل هكسان




2،3- ثنائي ميثيل بنتان




3،3- ثنائي ميثيل بنتان




2،2- ثنائي ميثيل بنتان



2،2،3 - ثنائي ميثيل بيوتان



3- إيثيل بنتان



2،4- ثنائي ميثيل بنتان

السؤال السادس:


أكمل المعادلات الآتية وأوازنها:



السؤال السابع:

أطرح سؤالاً تكون إجابته: المتصاوغات البنائية لألكان ما تختلف في ترتيب ذرات الكربون في جزيئاتها ما يؤدي إلى اختلاف الشكل الفراغي للجزيء الذي يؤثر في قوى لندن الرابطة بين جزيئات كل متصاوغ.

السؤال الثامن:



يوضح الشكل الآتي تغيّر درجات الانصهار والغليان لعدد من الألكانات ذات السلاسل المستقيمة. أدرس الشكل جيدًا، ثم أجب عما يأتي:

أ- **استنتج** الحالة الفيزيائية للألكانات المكونة من (4 و 6 ذرات كربون) عند درجة حرارة 25°C .

الألكان المكون من (4 ذرات كربون غاز، والألكان المكون من (6 ذرات كربون سائل.

ب- **أفسر** تزايد درجة غليان الألكان بزيادة عدد ذرات الكربون فيه.

بسبب زيادة قوى لندن بزيادة الكتلة المولية.

ج- **أتوقع** درجة غليان الألكان ذي السلسلة المستقيمة الذي يحوي 11 ذرة كربون.

أعلى من درجة غليان الألكان المكون من (10 ذرات كربون.