



جمهورية مصر العربية  
وزارة التربية والتعليم  
قطاع الكتب

# الرياضيات

الصف الرابع الابتدائي

الفصل الدراسي الثاني

كتاب التلميذ

تأليف

د. جان ميشيل حنا

د. فايز مراد مينا

د. أحمد محمد سيد أحمد

٢٠١٣-٢٠١٤

غير مصرح بتداول هذا الكتاب خارج وزارة التربية والتعليم

## لجنة التعديل والمراجعة

د. محمد محي الدين عبد السلام

خبير مناهج ومواد تعليمية

أ. سمير محمد سعداوي

معلم وخبير رياضيات

د. آمال فوزي النجار

خبير مناهج ومواد تعليمية

أ. إيمان سيد رمضان محمد

خبير مناهج ومواد تعليمية

مراجعة لغوية: د/ إسماعيل محمد عبد العاطي

إشراف علمي

أ. حسين محمود حسين

مستشار الرياضيات

إشراف تربوي

أ.د/ محمد رجب فضل الله

مستشار الوزير لتطوير المناهج

والمشرف العام على مركز تطوير المناهج

# مقدمة

## عزيزى التلميذ / عزيزتى التلميذة ..

يُسعدنا أن نُقدِّمَ لكم كتابَ الصفِّ الرابعِ الابتدائىِّ فى الرياضياتِ، وقدَّ بذلنا ما فى وسعنا كى نجعلَ من دراسةِ الرياضياتِ عملاً مُحبباً لديك. إننا نثقُ فى قدراتِكَ، وفى أنك ستستوعبُ مادةَ الكتابِ، بلُ تسعى نحوَ المزيدِ.

فإلى جانبِ الأشكالِ والرسومِ المشوقةِ، راعينا أن نُكثِرَ من تطبيقاتِ الرياضياتِ فى الموادِّ الأخرى، وفى الحياةِ العمليَّةِ، بحيثُ تُشعرُ بقيمةِ الرياضياتِ وأهميَّةِ دراستِها والاستزادةِ منها. ستجدُ فى مواقفَ عديدةٍ أننا نطلبُ منك الاستعانةَ بحاسبةِ الجيبِ فى التَّحَقُّقِ من صحَّةِ عملياتِ حسابيَّةِ، كما أننا ندعوكَ إلى استخدامِ الحاسوبِ (الكمبيوتر) فى إجراءِ بعضِ العملياتِ ورسمِ بعضِ الأشكالِ وزخرفَتِها.

احرصْ على مُتابعةِ كلِّ ما كُتِبَ، ولا تتردِّدْ فى سؤالِ مُعلِّمِكَ / مُعلِّمتِكَ فى كلِّ ما قد يواجهُكَ من صعوباتِ.

تذكرُ أن الرياضياتِ بها عديدٌ من الأسئلةِ ذاتِ الإجاباتِ الصَّحيحةِ والمتعددةِ، وأن دراستِها تحملُ العديدَ من القيمِ التى تعكسُ هذا الجهدَ الإنسانىَّ الضَّخْمَ.

وفُتِّك اللهُ ووفَّقنا إلى ما فيه خيرُ الوطنِ،،

المؤلِّفون

# المحتويات

## التسوية والأعداد العشرية

الوحدة  
الأولى



|    |                |   |
|----|----------------|---|
| ٢  | الدرس الأول :  | الكسور  |
| ٥  | الدرس الثاني : | الأعداد العشرية.  |
| ٧  | الدرس الثالث : | المزيد من الأعداد العشرية.                                  |
| ١١ | الدرس الرابع : | المقارنة بين عددين عشريين وترتيب مجموعة من الأعداد العشرية. |
| ١٣ | الدرس الخامس : | عمليات حسابية على الأعداد العشرية.                          |
| ٢٠ | الدرس السادس : | التقريب   |

## الهندسة

الوحدة  
الثانية



|    |                |                                  |
|----|----------------|----------------------------------|
| ٢٨ | الدرس الأول :  | التطابق.                         |
| ٣١ | الدرس الثاني : | الأشكال المتماثلة وخطوط التماثل. |
| ٣٥ | الدرس الثالث : | الأنماط البصرية.                 |

## القياس

الوحدة  
الثالثة



|    |                |        |
|----|----------------|--------|
| ٣٧ | الدرس الأول :  | السعة. |
| ٤٠ | الدرس الثاني : | الوزن. |
| ٤٣ | الدرس الثالث : | الوقت. |

# المحتويات



|    |   |
|----|---|
| ٤٨ | الدرس الأول : جمع البيانات وعرضها وتمثيلها. |
| ٥٢ | الدرس الثاني : الاحتمال.                    |



# الوحدة الأولى

## الكسور و الأعداد العشرية

- الكسور.
- الأعداد العشرية.
- المزيد من الأعداد العشرية.
- المقارنة بين عددين عشريين وترتيباً
- مجموعة من الأعداد العشرية.
- عمليات حسابية على الأعداد العشرية.
- التقريب.



## الكسور

## الدَّرْسُ الأول

## أولاً: العدد الكسرى


نعلم أن: أى عدد صحيح يمكن كتابته في صورة كسرٍ بأكثر من طريقة:

$$= \frac{3}{3} = \frac{6}{6} = \frac{1}{1} = 1, \quad \dots \quad = \frac{21}{3} = \frac{14}{2} = \frac{7}{1} = 7$$

وبذلك يمكننا إيجاد مجموع عدد صحيح وكسرٍ ووضع الناتج في صورة كسرية.

$$\left( \frac{7}{6} = 3 \text{ لأن } 3 \times \frac{2}{2} = \frac{6}{2} \right) \quad \frac{7}{6} = \frac{1}{6} + \frac{6}{6} = \frac{1}{6} + 3$$

ويمكن كتابة  $\left( \frac{1}{6} + 3 \right)$  بالصورة  $3 \frac{1}{6}$  بالصورة  $\frac{19}{6}$



**مثال ١** ضع كلاً من الأعداد الآتية في صورة كسرية:  $1 \frac{1}{6}$  ،  $5 \frac{1}{3}$  ،  $2 \frac{1}{10}$

$$\frac{7}{6} = \frac{1}{6} + \frac{6}{6} = \frac{1}{6} + 1 = 1 \frac{1}{6} \quad \text{الحل:}$$

$$\frac{16}{3} = \frac{1}{3} + \frac{15}{3} = \frac{1}{3} + 5 = 5 \frac{1}{3}$$



$$\frac{21}{10} = \frac{1}{10} + \frac{20}{10} = \frac{1}{10} + 2$$

**مثال ٢** ضع في صورة عدد صحيح وكسرٍ كلاً مما يأتي:  $\frac{4}{3}$  ،  $\frac{17}{5}$  ،  $\frac{21}{10}$

$$1 \frac{1}{3} = \frac{1}{3} + 1 = \frac{1}{3} + \frac{3}{3} = \frac{4}{3} \quad \text{الحل:}$$

$$3 \frac{2}{5} = \frac{2}{5} + 3 = \frac{2}{5} + \frac{15}{5} = \frac{17}{5}$$

$$2 \frac{1}{10} = \frac{1}{10} + 2 = \frac{1}{10} + \frac{20}{10} = \frac{21}{10}$$

## ثانياً: الكسور المتساوية ومقارنة الكسور

مثال ١

$$\frac{2}{3} = \frac{8}{12} \quad , \quad \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

إذا ضرب كل من حدى الكسر أو قسما على العدد نفسه فإن قيمة الكسر لا تتغير

مثال ٢

أى الكسرين  $\frac{2}{3}$  ،  $\frac{4}{7}$  أكبر؟

الحل: م.م.أ. للمقامين ٧ ، ٣ هو ٢١

$$\frac{14}{21} = \frac{7 \times 2}{7 \times 3} = \frac{2}{3} \quad , \quad \frac{12}{21} = \frac{3 \times 4}{3 \times 7} = \frac{4}{7}$$

$$\frac{4}{7} < \frac{2}{3}$$

مثال ٣

(١) ضع الكسور الآتية فى أبسط صورة:

$$\frac{30}{60} \quad (د) \quad 1\frac{6}{8} \quad (ج)$$

$$\frac{24}{28} \quad (ب) \quad \frac{9}{15} \quad (أ)$$

$$\frac{6}{7} = \frac{4 \div 24}{4 \div 28} = \frac{24}{28} \quad (ب)$$

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \div 9}{3 \div 15} = \frac{9}{15} \quad (أ) \quad \text{الحل:}$$

$$1\frac{2}{5} = \frac{7}{5} = \frac{5 \div 30}{5 \div 60} = \frac{30}{60} \quad (د) \quad 1\frac{3}{4} = 1\frac{6 \div 8}{6 \div 8} = 1\frac{6}{8} \quad (ج)$$

(٢) رتب تنازلياً:  $\frac{5}{11}$  ،  $\frac{3}{7}$  ،  $\frac{1}{3}$ 

$$\frac{7}{11} = \frac{1}{3} \quad , \quad \frac{9}{11} = \frac{3}{7} \quad \text{الحل:}$$

$$\frac{5}{11} , \frac{1}{3} , \frac{3}{7} \quad :$$

$$\frac{5}{11} < \frac{7}{11} < \frac{9}{11} \quad \text{الترتيب:}$$



مثال ٤

أوجد الناتج في أبسط صورة:

$$\frac{1}{6} - \left( \frac{5}{8} + \frac{7}{8} \right) \quad (1)$$

$$1 = \frac{6}{6} = \frac{1}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6} - \frac{12}{8} = \text{الحل:}$$

$$\left( \frac{5}{3} + \frac{6}{3} \right) - \frac{13}{3} \quad (ب)$$

$$2 = \frac{6}{3} = \frac{7}{3} - \frac{13}{3} = \text{الحل:}$$

$$\frac{8}{56} = \frac{2}{13}$$

$$\frac{20}{35} = \frac{4}{7}$$

$$\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

أكمل:

$$\frac{8}{56} = \frac{2}{13}$$

$$\frac{20}{35} = \frac{4}{7}$$

$$\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$$

الحل:

ثالثاً: جمع وطرح الكسور المختلفة المقامات:

مثال ١

$$\frac{3}{4} + \frac{3}{5} \quad \text{أوجد ناتج}$$

الحل:

م. م. أ هو ٢٠

$$\frac{15}{20} = \frac{15}{20} = \frac{15}{20} + \frac{12}{20} = \frac{3}{4} + \frac{3}{5} = \text{المقدار}$$

مثال ٢

أوجد ناتج ما يأتي في أبسط صورة:

$$\frac{4}{5} - \left( \frac{1}{5} + \frac{2}{3} \right)$$

الحل:

م. م. أ بين المقامات هو ١٥

$$\frac{12}{15} - \left( \frac{3}{15} + \frac{10}{15} \right) = \frac{4}{5} - \left( \frac{1}{5} + \frac{2}{3} \right) = \text{المقدار}$$

$$\frac{1}{15} = \frac{31}{15} = \frac{12}{15} - \frac{43}{15} =$$

## الدرس الثاني

## الأعداد العشرية

علمنا أن: العدد  $\frac{23}{10}$  يمكن أن يكتب على صورة عدد صحيح وكسر كالآتي:

$$2 \frac{3}{10} = \frac{3}{10} + 2 = \frac{3}{10} + \frac{20}{10} = \frac{23}{10}$$

كما أن: هذا العدد يمكن أن يكتب بصورة أخرى باستخدام فاصلة تسمى "علامة عشرية"

كالآتي:  $2,3 = 2 \frac{3}{10}$  (ويقرأ اثنين وثلاثة من عشرة)

كما أن:  $1,9 = 1 \frac{9}{10}$  ،  $12,5 = 12 \frac{5}{10}$  ،  $0,7 = \frac{7}{10}$  وهكذا.....

## مثال ١

اكتب باستخدام العلامة العشرية كما يأتي:

$$\frac{6}{10} ، 1 \frac{5}{10} ، 9 \frac{1}{10} ، 4 \frac{7}{10}$$

الحل:  $0,6 = \frac{6}{10}$  ،  $1,5 = 1 \frac{5}{10}$  ،  $9,1 = 9 \frac{1}{10}$  ،  $4,7 = 4 \frac{7}{10}$

## ملحوظة

يمكن كتابة أعداد أخرى مثل:  $7 \frac{1}{6}$  باستخدام العلامة العشرية كالآتي:

$$\left( \frac{5}{10} = \frac{1}{2} \right) \quad 7,5 = 7 \frac{5}{10} = 7 \frac{1}{2}$$

$$\left( \frac{4}{10} = \frac{2}{5} \right) \quad 3,4 = 3 \frac{4}{10} = 3 \frac{2}{5}$$

## مثال ٢

اكتب باستخدام العلامة العشرية كما يأتي:  $10 \frac{1}{5}$  ،  $3 \frac{1}{6}$  ،  $2 \frac{4}{5}$

$$\text{الحل: } 3,5 = 3 \frac{5}{10} = 3 \frac{1}{2} \quad ، \quad 2,8 = 2 \frac{8}{10} = 2 \frac{4}{5}$$

$$10,2 = 10 \frac{2}{10} = 10 \frac{1}{5}$$

مثال ٣

حوّل إلى الصّورة العشريّة كلا مما يلي: (أ)  $\frac{9}{5}$ ، (ب)  $\frac{34}{6}$ ، (ج)  $\frac{17}{6}$ ، (د)  $\frac{35}{5}$

الحلّ: (أ)  $1,8 = \frac{18}{10} = \frac{2 \times 9}{2 \times 5} = \frac{9}{5}$ ، (ب)  $1,7 = \frac{17}{10} = \frac{2 \div 34}{2 \div 20} = \frac{34}{20}$

(ج)  $2,8 = \frac{28}{10} = \frac{5 \times 17}{5 \times 6} = \frac{17}{6}$ ، (د)  $7 = \frac{70}{10} = \frac{5 \div 35}{5 \div 5} = \frac{35}{5}$

مثال ٤ حوّل من الصّورة الكسريّة إلى الصّورة العشريّة كلا مما يأتي:

$\frac{18}{6}$  ،  $\frac{11}{6}$  ،  $\frac{18}{5}$

الحلّ:  $3,6 = 3 \frac{6}{10} = \frac{6}{10} + 3 = \frac{3}{5} + 3 = \frac{3}{5} + \frac{15}{5} = \frac{18}{5}$

$5,5 = 5 \frac{5}{10} = \frac{5}{10} + 5 = \frac{1}{2} + 5 = \frac{1}{2} + \frac{10}{2} = \frac{11}{2}$

$0,9 = \frac{9}{10} = \frac{18}{20}$


ملحوظة

يتكوّن العدد: ٢,٣ من جزئين، أحدهما صحيح والآخر عشريّ

٢ هو الجزء الصحيح  
(٢ آحاد)

٠,٣ هو الجزء العشريّ  
(٣ أجزاء من عشرة)

ويمكن تمثيل هذا العدد بالجزء المظلل من الشكل التالي:



٢,٣ = اثنين وثلاثة أجزاء من عشرة

|      |               |       |
|------|---------------|-------|
| آحاد | أجزاء من عشرة | العدد |
| ٢    | ٣             | ٢,٣   |

## الدرس الثالث

## المزيد من الأعداد العشرية

$$1 \frac{57}{100} = \frac{57}{100} + 1 = \frac{57}{100} + \frac{100}{100} = \frac{157}{100} \quad \text{١ لاحظ:}$$

يمكن كتابة هذا العدد باستخدام العلامة العشرية كالتالي:

$$1,57 = 1 \frac{57}{100} \quad \text{(ويقرأ واحدًا وسبعة وخمسين من مائة)}$$

## مثال ١

اكتب في صورة عدد عشري كلا من الأعداد الآتية:

$$\frac{27}{100}, 8 \frac{27}{100}, 19 \frac{51}{100}, 127 \frac{73}{100}$$

$$\text{الحل: } 8 \frac{27}{100} = 8,27, 19 \frac{51}{100} = 19,51 \quad \text{وهذا.....}$$

$$1 \frac{3}{100} = \frac{3}{100} + 1 = \frac{3}{100} + \frac{100}{100} = \frac{103}{100} \quad \text{٢ لاحظ:}$$

في هذه الحالة يُكتب العدد كالتالي:

$$1,03 = 1 \frac{3}{100} \quad \text{(ويقرأ واحدًا وثلاثة من مائة)}$$

## ملحوظة

لاحظ أننا لم نكتب هذا العدد ١,٣ لأنه في هذه الحالة سيعني  $1 \frac{3}{10}$  وليس  $1 \frac{3}{100}$

| العدد | أجزاء من مائة | أجزاء من عشرة | آحاد |
|-------|---------------|---------------|------|
| ١,٠٣  | ٣             | ٠             | ١    |



مثال ٢

اكتب في صورة عدد عشري كلا من الأعداد الآتية:

$$\frac{502}{100}, \frac{209}{100}, 15 \frac{7}{100}, 2 \frac{1}{100}$$

الحل:

$$2,01 = 2 \frac{1}{100}$$

$$15,07 = 15 \frac{7}{100}$$

$$2,09 = ,09 + 2 = \frac{9}{100} + \frac{200}{100} = \frac{209}{100}$$

$$5,02 = ,02 + 5 = \frac{2}{100} + \frac{500}{100} = \frac{502}{100}$$

ملحوظة

يمكن كتابة أعداد أخرى بالصورة العشرية مثل  $8 \frac{11}{100}$  الذي يكتب كالتالي:

$$8,22 = 8 \frac{22}{100} = 8 \frac{11}{50}$$

$$8,25 = 8 \frac{25}{100} = 8 \frac{1}{4} \quad \text{وكذلك:}$$

$$47,08 = 47 \frac{8}{100} = 47 \frac{2}{25},$$

مثال ٣

اكتب في صورة أعداد عشرية كلا من الأعداد الآتية:

$$\frac{27}{4}, \frac{3}{5}, 106 \frac{1}{4}, 23 \frac{8}{25}, 1 \frac{9}{50} \quad \text{الحل:}$$

$$23,32 = 23 \frac{32}{100} = 23 \frac{8}{25}, \quad 1,18 = 1 \frac{18}{100} = 1 \frac{9}{50}$$

$$106,25 = 106 \frac{25}{100} = 106 \frac{1}{4}, \quad 1,06 = \frac{6}{100} = \frac{3}{50}$$

$$6,75 = 6 \frac{75}{100} = 6 \frac{3}{4} = \frac{27}{4}$$



$$٣ \text{ لاحظ: } ١ \frac{٧}{١٠٠٠} = \frac{٧}{١٠٠٠} + ١ = \frac{٧}{١٠٠٠} + \frac{١٠٠٠}{١٠٠٠} = \frac{١٠٠٧}{١٠٠٠}$$

في هذه الحالة يُكتَبُ العددُ كالتالي:

$$١,٠٠٧ = ١ \frac{٧}{١٠٠٠}$$

(ويقرأ واحدًا وسبعةً من ألفٍ)

| أجزاء من ألفٍ | أجزاء من مائةٍ | أجزاء من عشرةٍ | آحادٌ |
|---------------|----------------|----------------|-------|
| ٧             | ٠              | ٠              | ١     |

### مثال ٤

لاحظ:

$$٠,٣٠ = ٠,٣ \quad \text{أى أن} \quad \frac{٣٠}{١٠٠} = \frac{١٠ \times ٣}{١٠ \times ١٠} = \frac{٣}{١٠}$$

$$٠,٤٠ = ٠,٤ \quad \text{أى أن} \quad \frac{٤٠}{١٠٠} = \frac{١٠ \div ٤٠}{١٠ \div ١٠٠} = \frac{٤٠}{١٠٠}$$

$$٠,١٠ = ٠,١ \quad ٠,٧٠ = ٠,٧ \quad ٠,٢٠ = ٠,٢$$

### مثال ٥

لاحظ:

$$٠,٤ + ٠,٠٧ = ٠,٤٧ \quad (أ)$$

$$٠,٦ + ٠,٠٨ = ٠,٦٨ \quad (ب)$$

$$٢ + ٠,٣ + ٠,٠٥ = ٢,٣٥ \quad (ج)$$

مثال ٦

حوّل من الصّورة الكسريّة إلى الصّورة العشريّة كلّاً ممّا يأتي:

$$\frac{117}{500} ، 3 \frac{9}{1000}$$

$$3,009 = 3 \frac{9}{1000}$$

$$0,234 = \frac{234}{1000} = \frac{117}{500} \quad \text{الحلّ:}$$

مثال ٧ اكتب في صورة عشرية

$$\frac{\dots}{\dots} = \frac{7}{125} \quad \text{(ب)} \quad \frac{\dots}{\dots} = \frac{\dots}{\dots} = \frac{125 \times 3}{125 \times 8} = \frac{3}{8} \quad \text{(أ)}$$

$$\frac{\dots}{\dots} = \frac{11}{250} \quad \text{(د)} \quad \frac{\dots}{\dots} = \frac{3}{200} \quad \text{(ج)}$$

الحلّ:

$$0,375 = \frac{375}{1000} = \frac{125 \times 3}{125 \times 8} = \frac{3}{8} \quad \text{(أ)}$$

$$0,056 = \frac{56}{1000} = \frac{8 \times 7}{8 \times 125} = \frac{7}{125} \quad \text{(ب)}$$

$$0,015 = \frac{15}{1000} = \frac{5 \times 3}{5 \times 200} = \frac{3}{200} \quad \text{(ج)}$$

$$0,044 = \frac{44}{1000} = \frac{4 \times 11}{4 \times 250} = \frac{11}{250} \quad \text{(د)}$$

## الدرس الرابع

المقارنة بين عددين عشريين وترتيب  
مجموعة من الأعداد العشرية

أولاً: بالنسبة لأي عدد عشري، يمكن إيجاد عددين صحيحين ينحصر بينهما هذا العدد:

فيما يلي بعض الأمثلة التي يكون فيها الفرق بين العددين الصحيحين أصغر ما يمكن:

(أ) العدد ١٧,٩٢ ينحصر بين ١٧ ، ١٨ أي أن:  $١٧ < ١٧,٩٢ < ١٨$

(ب) العدد ٠,٣٥ ينحصر بين ٠ ، ١ أي أن:  $٠ < ٠,٣٥ < ١$

(ج) العدد ٥٨ ينحصر بين ٥٧ ، ٥٩ أي أن:  $٥٧ < ٥٨ < ٥٩$

## مثال ١

أكمل بأعداد صحيحة، بحيث يكون الفرق بين العددين الصحيحين في كل حالة أصغر ما يمكن:

..... > ٨,٠٤ > ..... ، ..... > ٢٦,٦٣ > ..... ، ..... > ١٠٥,١ > .....

..... > ٠,٩٢ > ..... ، ..... > ٨,٠٤ > ٨ الحل:  $٩ > ٨,٠٤ > ٨$

..... > ١٠٥,١ > ١٠٥  $١٠٦ > ١٠٥,١ > ١٠٥$

..... > ٠,٩٢ > ٠  $١ > ٠,٩٢ > ٠$

..... > ٢٦,٦٣ > ٢٦  $٢٧ > ٢٦,٦٣ > ٢٦$

ثانياً: إيجاد أعداد عشرية تنحصر بين عددين معلومين:

## مثال ٢

اكتب عدداً ينحصر بين ١٧، ١٨

الحل: هناك الكثير من الأعداد التي ينحصر كل منها بين ١٧ ، ١٨

مثلاً: ١٧,١ ، ١٧,٢ ، ١٧,٥٨ ، ١٧,٩٥٨ ، ..... الخ.

مثال ٣

اكتب عدداً ينحصر بين ١٧,٢ ، ١٧,١


الحل: هناك الكثير من الأعداد التي ينحصر كلٌ منها بين ١٧,٢ ، ١٧,١

مثل: ١٧,١١ ، ١٧,١٢ ، ..... الخ

مثال ٤

اكتب ثلاثة أعداد ينحصر كلٌ منها بين ٥٧,٧ ، ٥٧,٩ مبيّناً ذلك على خط الأعداد

الحل:



الأعداد الثلاثة يمكن أن تكون ٥٧,٨٥ ، ٥٧,٨ ، ٥٧,٧١

أوجد أعداداً أخرى تنحصر بين (٥٧,٩ ، ٥٧,٧)

ثالثاً: مقارنة وترتيب الأعداد العشرية:

مثال ٥

ضع العلامة المناسبة < أو > في □ :

|       |   |           |        |   |             |
|-------|---|-----------|--------|---|-------------|
| ٩,٧   | □ | ١٧,٢٢ (ب) | ٤,٣    | □ | ٥,١ (أ)     |
| ١١٢,١ | □ | ٨٦,٦٨ (د) | ٤٩,٩٨  | □ | ٥٣,٠١ (ج)   |
| ٤٣٦,٩ | □ | ٥٠٨ (و)   | ٢٧٣٢,٥ | □ | ٢٧٣,٠٥ (هـ) |

الحل:

|       |   |           |        |   |             |
|-------|---|-----------|--------|---|-------------|
| ٩,٧   | < | ١٧,٢٢ (ب) | ٤,٣    | < | ٥,١ (أ)     |
| ١١٢,١ | > | ٨٦,٦٨ (د) | ٤٩,٩٨  | < | ٥٣,٠١ (ج)   |
| ٤٣٦,٩ | < | ٥٠٨ (و)   | ٢٧٣٢,٥ | > | ٢٧٣,٠٥ (هـ) |



## الدَّرْسُ الخَامِسُ

## عمليات حسابية على الأعداد العشرية

أولاً: جمع الكسور والأعداد العشرية:

## تمهيد

إذا أخذت من والدك جنيهين ونصفاً، ومن والدتك ثلاثة جنيهاً ورُبْعاً، فكم يكون مجموع ما معك أي  $2\frac{1}{4}$  ،  $3\frac{1}{4}$  ؟

تعلم أن: نصف الجنيه = ٥٠ قرشاً، ورُبْع الجنيه = ٢٥ قرشاً

ما أخذته من والدك = ٢,٥ جنيه، وما أخذته من والدتك = ٣,٢٥ جنيه

$$\text{مجموع ما معك} = 2,50 + 3,25 = 5,75 \text{ جنيه}$$

لعلك لاحظت وَضَعَ الرقم ٠ على يمين الرقم ٥ في العدد الأول لمساواة عدد الأجزاء العشرية في العددين، ثم جمعنا أجزاء المائة أولاً، فأجزاء العشرة، ثم الأعداد الصحيحة معاً. ويمكن إجراء عملية الجمع بطريقةٍ أخرى كما يلي:

$$5,75 = 5 \frac{75}{100} = 3 \frac{25}{100} + 2 \frac{50}{100} = 3 \frac{25}{100} + 2 \frac{5}{10} = 3,25 + 2,5$$

## مثال ١

وحدِّ الأجزاء العشرية للكسور والأعداد العشرية التالية (كما في المثال):

مثال: ٣٤,٢٥٨ ، ٥,٠٦ ، ١٨,٧

الحل: الأعداد هي: ٣٤,٢٥٨ ، ٥,٠٦٠ ، ١٨,٧٠٠

(أ) ١,٣٠٠ ، ٠,٥٤٠ ، ٢٥٦,١١٢ تصبح بعد تجسيها ١,٣٠٠ ، ٠,٥٤٠ ، ٢٥٦,١١٢

(ب) ١٩,٠٣٤ ، ٣,٢٠٠ ، ٩٧,٣٨٠ تصبح بعد تجسيها ١٩,٠٣٤ ، ٣,٢٠٠ ، ٩٧,٣٨٠

(ج) ١٥,٩٧٣ ، ٠,٨٠٠ ، ١٤,٠٠٠ تصبح بعد تجسيها ١٥,٩٧٣ ، ٠,٨٠٠ ، ١٤,٠٠٠



### مثال ٢ هناك طريقتان لعملية الجمع:

(١) الطريقة الأفقية :

$$\begin{aligned} 31,6 &= 7,8 + 23,8 \quad (أ) \\ 22,95 &= 4,20 + 18,75 = 4,2 + 18,75 \quad (ب) \\ 1,237 + 82,14 + 365,8 &\quad (ج) \\ 449,177 &= 1,237 + 82,140 + 365,800 = \end{aligned}$$

(٢) الطريقة الرأسية :

|   |  |   |
|---|--|---|
| $\begin{array}{r} 365,800 \quad (ج) \\ + 82,140 \\ + 1,237 \\ \hline 449,177 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 18,75 \quad (ب) \\ + 4,20 \\ \hline 22,95 \end{array}$ | $\begin{array}{r} 23,8 \quad (أ) \\ + 7,8 \\ \hline 31,6 \end{array}$ |
|---|--|---|

**ملحوظة**

يلاحظُ مما سبق أنه عند إجراء عملية الجمع لكسور أو أعداد عشرية، ينبغي أولاً توحيد الأجزاء العشرية للأعداد المطلوب جمعها، وذلك بإضافة أصفار على يمين آخر جزءٍ عشريٍّ لعدم تأثير ذلك على قيمة العدد لأن:  
٢,٥ = ٢,٥٠ = ٢,٥٠٠ = ..... إلخ

### مثال ٣

\* أوجد ناتج جمع ما يلي :

|  |   |
|--|---|
| $\dots\dots\dots = 9,3 + 2,65 \quad (ب)$         | $\dots\dots\dots = 4,6 + 17,3 \quad (أ)$            |
| $\dots\dots\dots = 0,43 + 0,875 \quad (د)$       | $\dots\dots\dots = 5,75 + 13,8 \quad (ج)$           |
| $\dots\dots\dots = 2,65 + 13 \quad (و)$          | $\dots\dots\dots = 9 + 1,007 \quad (هـ)$            |
| $\dots\dots\dots = 27,99 + 213,01 \quad (ح)$     | $\dots\dots\dots = 4,3 + 9,8 \quad (ز)$             |
| $\dots\dots\dots = 2,5 + 17,3 + 28,65 \quad (ط)$ | $\dots\dots\dots = 213,8 + 1,97 + 53,245 \quad (ي)$ |

**الحل:** (أ)  $21,9 = 4,6 + 17,3$  (ب)  $11,95 = 9,3 + 2,65$

$$\begin{aligned} 1,305 &= 0,43 + 0,875 \text{ (د)} & 19,55 &= 5,75 + 13,8 \text{ (ج)} \\ 15,65 &= 2,65 + 13 \text{ (و)} & 10,007 &= 9 + 1,007 \text{ (هـ)} \\ 241,00 &= 27,99 + 213,01 \text{ (ح)} & 14,1 &= 4,3 + 9,8 \text{ (ز)} \\ & & 48,00 &= 2,5 + 17,3 + 28,25 \text{ (ط)} \\ & & 269,015 &= 213,8 + 1,97 + 53,245 \text{ (ي)} \end{aligned}$$

ثانياً: طرح الكسور والأعداد العشرية:

### تمهيد

إذا كان مع عصام سبعة جنيهات ونصف، وأعطى أخاه الأصغر جنيهين وربعاً. فكم يبقى مع عصام؟

ما مع عصام = 7,5 جنيه ، ما أعطاه لأخيه = 2,25 جنيه

الباقي = 7,5 - 2,25 =

$$\begin{array}{r} \text{7,5} \\ - 2,25 \\ \hline \end{array}$$

↓ ↓ ↓

$$10 \text{ (في المئات)}$$

$$9,50 - 2,25 = 7,25 \text{ جنيه}$$

لعلك لاحظت وُضِعَ الرقم 0 على يمين الرقم 5 في العدد الأول لتجنيس الأجزاء العشرية في العددين، ثم أُجريت عملية الطرح كما تعلمت سابقاً أجزاء المائة فأجزاء العشرة ثم الأعداد الصحيحة.

### ملحوظة

يُلاحظُ مما سبق أنه عند إجراء عملية الجمع أو الطرح لكسور أو أعداد عشرية، ينبغي أولاً مساواة عدد الأجزاء العشرية في الأعداد المطلوب جمعها أو طرحها، وذلك بإضافة أصفار على يمين آخر جزء عشري (لعدم تأثير ذلك على قيمة العدد العشري).

### مثال 1

(1) الطريقة الأفقية :

$$4,3 = 1,4 - 5,7 \text{ (أ)}$$

$$10,35 = 2,65 - 13,00 = 2,65 - 13 \text{ (ب)}$$

$$24,250 - 68,005 = 24,25 - 68,005 \text{ (ج)}$$

$$43,755 =$$

(٢) الطريقة الرأسية :

$$\begin{array}{r} \textcircled{7} \textcircled{9} \textcircled{10} \\ ٦٨,٠٠٥ \quad (\text{ج}) \\ ٢٤,٢٥٠ \quad - \\ \hline ٤٣,٧٥٥ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \textcircled{٢} \textcircled{٩} \textcircled{١٠} \\ ١٣,٠٠ \quad (\text{ب}) \\ ٢,٦٥ \quad - \\ \hline ١٠,٣٥ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (١) \\ ٥,٧ \\ ١,٤ \quad - \\ \hline ٤,٣ \end{array}$$

مثال ٢

أوجد ناتج ما يلي:

$$\begin{aligned} &= ١٥٧,١٢٥ - ٣١٢,٥ \quad (\text{هـ}) \\ &= (١,٣ + ١٧) - (٠,٠٦٥ + ٢٤,٢٣٥) \quad (\text{و}) \\ &= ٦٧,٠٣٥ - ٨٨,٣٥ + ٥١٢ \quad (\text{ز}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= ٠,٢١٤ - ٢,٣٢٥ \quad (١) \\ &= ٥,٣٤ - ٨٩,٧٥ \quad (\text{ب}) \\ &= ٠,٢٧٥ - ٠,٦ \quad (\text{ج}) \\ &= ٣,٥ - ١٢,٧٨ \quad (\text{د}) \end{aligned}$$

الحل:

$$(١) \quad ٢,١١١ = ٠,٢١٤ - ٢,٣٢٥$$

$$(\text{ب}) \quad ٨٤,٤١ = ٥,٣٤ - ٨٩,٧٥$$

$$(\text{ج}) \quad ٠,٣٢٥ = ٠,٢٧٥ - ٠,٦٠٠ = ٠,٢٧٥ - ٠,٦$$

$$(\text{د}) \quad ٩,٢٨ = ٣,٥٠ - ١٢,٧٨ = ٣,٥ - ١٢,٧٨$$

$$(\text{هـ}) \quad ١٥٥,٣٧٥ = ١٥٧,١٢٥ - ٣١٢,٥٠٠ = ١٥٧,١٢٥ - ٣١٢,٥$$

$$(\text{و}) \quad ٦,٠٠ = ١٨,٣٠٠ - ٢٤,٣٠٠ = (١,٣ + ١٧) - (٠,٠٦٥ + ٢٤,٢٣٥)$$

$$(\text{ز}) \quad ٥٣٣,٣١٥ = ٦٧,٠٣٥ - ٦٠٠,٣٥٠ = ٦٧,٠٣٥ - ٨٨,٣٥ + ٥١٢$$

ثالثًا: قسمة عدد صحيحٍ على ١٠، ١٠٠، ١٠٠٠:

مثال ٣ =  $١٠ \div ٦٧$  (١) =  $١٠ \div ٤٥$  (ب) =  $١٠ \div ٣٨٩$  (ج)

أكمل (كما في المثال):

$$٥,٨ = ٥ + ٠,٨ = \frac{٥٠}{١٠} + \frac{٨}{١٠} = \frac{٥٨}{١٠} = ١٠ \div ٥٨$$

الحل:  $٦,٧ = ٦ + ,٧ = \frac{٦٠}{١٠} + \frac{٧}{١٠} = \frac{٦٧}{١٠} = ١٠ \div ٦٧$  (١)

(ب)  $٤,٥ = ٤ + ,٥ = \frac{٤٠}{١٠} + \frac{٥}{١٠} = \frac{٤٥}{١٠} = ١٠ \div ٤٥$

(ج)  $٣٨,٩ = ٣٨ + ,٩ = \frac{٣٨٠}{١٠} + \frac{٩}{١٠} = \frac{٣٨٩}{١٠} = ١٠ \div ٣٨٩$

ألاحظ أنه عند قسمة عدد صحيحٍ على ١٠ فإن ناتج القسمة هو عدد أرقامه هي نفس ..... العدد الصحيح مع وضع فاصلة (علامة) عشرية بعد رقم واحدٍ من اليمين.

ماذا  
تلاحظ؟

مثال ٤

أوجد ناتج ما يلي (كما في المثال):  $١٥٤ \div ١٠ = ١٥,٤$

..... =  $١٠ \div ٧٨$  (١) | ..... =  $١٠ \div ٣٤٨$  (ب)

..... =  $١٠ \div ٢٥٠$  (ج) | ..... =  $١٠ \div ٧٨٥٩٤٣٢$  (د)

الحل:

$٧,٨ = ١٠ \div ٧٨$  (١) |  $٣٤,٨ = ١٠ \div ٣٤٨$  (ب)

$٢٥ = ١٠ \div ٢٥٠$  (ج) |  $٧٨٥٩٤٣,٢ = ١٠ \div ٧٨٥٩٤٣٢$  (د)



مثال ٥

لاحظ المثال:  $٢,٨٩ = ٢ + ٠,٨٩ = \frac{٢٠٠}{١٠٠} + \frac{٨٩}{١٠٠} = ١٠٠ \div ٢٨٩$

أكمل كما بالمثال السابق:

(١)  $١٠٠ \div ٤٩٤$  (ب)  $١٠٠ \div ٢٨٥٧$  (ج)  $١٠٠ \div ٧٢٨٠$

الحل:

(١)  $٤٠,٩٤ = ٤ + ٠,٩٤ = \frac{٤٠٠}{١٠٠} + \frac{٩٤}{١٠٠} = ١٠٠ \div ٤٩٤$

(ب)  $٢٨,٥٧ = ٢٨ + ٠,٥٧ = \frac{٢٨٠٠}{١٠٠} + \frac{٥٧}{١٠٠} = ١٠٠ \div ٢٨٥٧$

(ج)  $٧٢,٨٠ = ٧٢ + ٠,٨٠ = \frac{٧٢٠٠}{١٠٠} + \frac{٨٠}{١٠٠} = ١٠٠ \div ٧٢٨٠$

ألاحظ أنه عند قسمة عدد صحيح على ..... فإن ناتج القسمة هو عدد أرقامه هي نفس ..... العدد الصحيح مع وضع ..... بعد رقمين من اليمين.

ماذا تلاحظ؟

مثال ٦

لاحظ المثال:  $٤,١٢ = ١٠٠ \div ٤١٢$  ،  $٧,٨ = ١٠٠ \div ٧٨٠$  (ولماذا؟)

أوجد ناتج قسمة ما يلي (كما في المثال):

(١)  $١٠٠ \div ٦٣٥$  (ب)  $١٠٠ \div ٤٨٥٩٧$

(ج)  $١٠٠ \div ٢٣٥٠$  (د)  $١٠٠ \div ٩٩٩٩٠٠$

الحل:

(١)  $٦٣,٥ = ١٠٠ \div ٦٣٥$  (ب)  $٤٨٥,٩٧ = ١٠٠ \div ٤٨٥٩٧$

(ج)  $٢٣,٥٠ = ١٠٠ \div ٢٣٥٠$  (د)  $٩٩٩٩ = ١٠٠ \div ٩٩٩٩٠٠$



## مثال ٧

$$\text{لاحظ المثال: } ٤,٢٥٧ = ٤ + ٠,٢٥٧ = \frac{٤٠٠٠}{١٠٠٠} + \frac{٢٥٧}{١٠٠٠} = ١٠٠٠ \div ٤٢٥٧$$

أكمل كما بالمثل السابق:

$$= \dots + \dots = \frac{٨٠٠٠}{١٠٠٠} + \frac{\dots}{١٠٠٠} = ١٠٠٠ \div ٨٣٧٦ \quad (أ)$$

$$= \dots + \dots = \frac{٩٩٠٠٠}{\dots} + \frac{\dots}{\dots} = ١٠٠٠ \div ٩٩٨٧٥ \quad (ب)$$

$$= \dots + \dots = \frac{٢٥٧٥٠٠٠}{\dots} + \frac{\dots}{\dots} = ١٠٠٠ \div ٢٥٧٥٤٨٧ \quad (ج)$$

الحل:

$$٨,٣٧٦ = ٨ + ,٣٧٦ = \frac{٨٠٠٠}{١٠٠٠} + \frac{٣٧٦}{١٠٠٠} = ١٠٠٠ \div ٨٣٧٦ \quad (أ)$$

$$٩٩,٨٧٥ = ٩٩ + ,٨٧٥ = \frac{٩٩٠٠٠}{١٠٠٠} + \frac{٨٧٥}{١٠٠٠} = \dots \div ٩٩٨٧٥ \quad (ب)$$

$$٢٥٧٥,٨٧ = ٢٥٧٥ + ,٤٨٧ = \frac{٢٥٧٥٠٠٠}{١٠٠٠} + \frac{٤٨٧}{١٠٠٠} = ١٠٠٠ \div ٢٥٧٥٤٨٧ \quad (ج)$$

ماذا تلاحظ؟

ألاحظ أنه عند قسمة عدد صحيح على ١٠٠٠ فإن ناتج القسمة هو عدد أرقامه هي ..... مع وضع ..... بعد ثلاثة ..... من .....

## مثال ٨

أوجد خارج القسمة لكل مما يلي (كما في المثال):

$$\text{مثال: } ٤,٢٥ = ١٠٠٠ \div ٤٢٥٠ \quad , \quad ٧,٢٩٤ = ١٠٠٠ \div ٧٢٩٤$$

$$٩,٨ = ١٠٠٠ \div ٩٨٠٠٠$$

$$٢٤,٢٦٩ = ١٠٠٠ \div ٢٤٢٦٩ \quad (ب) \quad ٣,٥٩٨ = ١٠٠٠ \div ٣٥٩٨ \quad (أ)$$

$$٧٨٥,٦٤٠ = ١٠٠٠ \div ٧٨٥٦٤٠ \quad (د) \quad ٣٢٥٤,٣١٩ = ١٠٠٠ \div ٣٢٥٤٣١٩ \quad (ج)$$

## الدَّرْسُ السَّادِسُ

## أولاً التَّقْرِيبُ لِأَقْرَبِ عَشْرَةٍ

## مقدمة

أحياناً يكون من الضروري معرفة الأعداد بدقة، مثل: حالات القياسات الدقيقة في المعامل، وفي مجال المحاسبات المالية، وغيرها.... ولكننا في بعض الحالات لا نحتاج لمعرفة الأعداد بدقة، ويمكن الاكتفاء بأعداد تقريبية.

## فمثلاً:

- إذا كان عدد سكان إحدى القرى الصغيرة ٧٢١٠٥ نسمة، فإنه يمكن أن نعتبر عدد السكان تقريباً ٧٢٠٠٠ نسمة.
- إذا كانت المسافة بين مدينتين هي ١٩٧ كم، فإنه يمكن اعتبار هذه المسافة حوالي ٢٠٠ كم


## والآن سندرس القواعد التي تتبع عند تقريب الأعداد

## مثال:

قرب العدد ٤٥٧ لأقرب عشرة.

لذلك نتبع الخطوات الآتية:

- ١- نعلم أن العدد ٤٥٧ ينحصر بين ٤٥٠، ٤٦٠ (أي بين ٤٥ عشرة، ٤٦ عشرة)
- ٢- نحدد موضع العدد بالنسبة لكل من العددين ٤٥٠، ٤٦٠



فنجده أنه أقرب إلى ٤٦٠ إلى منه إلى ٤٥٠

- ٣- لذلك نقول إن ٤٥٧ يساوي تقريباً ٤٦٠ لأقرب عشرة، ونكتب ذلك هكذا:  
 $457 \approx 460$  لأقرب عشرة.

## قاعدة التقريب لأقرب عشرة

عند التقريب إلى أقرب عشرة نتبع الخطوات التالية

- (١) نستبدل رقم الآحاد بالرقم صفر
- (٢) إذا كان رقم الآحاد  $\leq 5$  يضاف إلى رقم العشرات ١
- (٣) إذا كان رقم الآحاد  $> 5$  نحتفظ برقم العشرات بقيمته

فمثلاً  $1832 \approx 1830$  ،  $3270 \approx 3270$

$\downarrow$   $\downarrow$   
 $5 <$   $5 >$

## مثال ١

قرب كلًا من الأعداد الآتية لأقرب عشرة:

|           |            |          |
|-----------|------------|----------|
| ٨٦٠٢٩ (ج) | ٧٦٥١ (ب)   | ٢٣٦ (أ)  |
| ٩٩٩٩ (و)  | ٢١٣٩٥ (هـ) | ٩٠٠٤ (د) |

## الحل:

|                 |            |
|-----------------|------------|
| ٢٤٠ $\approx$   | ٢٣٦ (أ)    |
| ٧٦٥٠ $\approx$  | ٧٦٥١ (ب)   |
| ٨٦٠٣٠ $\approx$ | ٨٦٠٢٩ (ج)  |
| ٩٠٠٠ $\approx$  | ٩٠٠٤ (د)   |
| ٢١٤٠٠ $\approx$ | ٢١٣٩٥ (هـ) |
| ١٠٠٠٠ $\approx$ | ٩٩٩٩ (و)   |

## قاعدة التقريب لأقرب مائة

عند التقريب لأقرب مائة نتبع الخطوات التالية:

- ١) نستبدل رقمي الآحاد والعشرات بصفرين
- ٢) إذا كان رقم العشرات  $\leq 5$  يضاف إلي رقم المئات ١
- ٣) إذا كان رقم العشرات  $> 5$  نحتفظ برقم المئات بقيمته

فمثلاً

$$2300 \approx 2327, \quad 2700 \approx 2654$$

$$\begin{array}{c} \downarrow \\ 5 > \end{array} \quad \begin{array}{c} \downarrow \\ 5 < \end{array}$$

### مثال ٢

قرب كلًا من الأعداد الآتية لأقرب مائة:

|            |             |           |
|------------|-------------|-----------|
| ٦٠٣٤٩٩ (ج) | ٣٧٢٠٥١ (ب)  | ٥٣٨٢٤ (١) |
| ٩٩٠٩٠٩ (و) | ٩٧٣٠٤٩ (هـ) | ٨٩٩٥٠ (د) |

الحل:

|        |           |             |
|--------|-----------|-------------|
| ٥٣٨٠٠  | $\approx$ | ٥٣٨٢٤ (١)   |
| ٣٧٢١٠٠ | $\approx$ | ٣٧٢٠٥١ (ب)  |
| ٦٠٣٥٠٠ | $\approx$ | ٦٠٣٤٩٩ (ج)  |
| ٨٩١٠٠٠ | $\approx$ | ٨٩٩٥٠ (د)   |
| ٩٧٣٠٠٠ | $\approx$ | ٩٧٣٠٤٩ (هـ) |
| ٩٩٠٩٠٠ | $\approx$ | ٩٩٠٩٠٩ (و)  |



## قاعدة التقريب لأقرب ألف

عند التقريب إلى أقرب ألف نتبع الخطوات التالية  
 نستبدل أرقام الأحاد والعشرات والمئات بأصفار  
 إذا كان رقم المئات  $\leq 5$  يضاف إلى رقم الآلاف ١  
 إذا كان رقم المئات  $> 5$  نحافظ برقم الآلاف بقيمته  
 فمثلاً

$$2000 \approx 2327 \quad , \quad 3000 \approx 2604$$

$$\downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow$$

$$> \qquad \qquad \qquad \leq$$

مثال ٣

قرب كل من الأعداد الآتية لأقرب ألف:

|             |              |            |
|-------------|--------------|------------|
| ٤٣٦١,٩٩ (ج) | ٦٤٣٥,٥ (ب)   | ٧٨٦٢٩٦ (أ) |
| ٩٩٩٥٠٠ (و)  | ٧٥٠٤٩,٩ (هـ) | ٥١٩٩٠٠ (د) |

الحل:

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| ٥٢٠٠٠٠ $\approx$ ٥١٩٩٠٠ (د)  | ٧٨٦٠٠٠ $\approx$ ٧٨٦٢٩٦ (أ) |
| ٧٥٠٠٠ $\approx$ ٧٥٠٤٩,٩ (هـ) | ٦٠٠٠ $\approx$ ٦٤٣٥,٥ (ب)   |
| ١٠٠٠٠٠٠ $\approx$ ٩٩٩٥٠٠ (و) | ٤٠٠٠ $\approx$ ٤٣٦١,٩٩ (ج)  |

## نشاط

١ - قرب كل من الأعداد الآتية لأقرب عشرة آلاف:

|               |               |             |
|---------------|---------------|-------------|
| ١٠٥٠٠ (ج)     | ١٥٣٨٧ (ب)     | ٦٥٤٣٢,١ (أ) |
| ٢٣٦٨٤٩,٩٩ (و) | ٨٩٤٣٠,٥٢ (هـ) | ١٣٩٥٠,٥ (د) |

ب - قرب كل من الأعداد الآتية لأقرب مائة ألف:

|               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| ٤٩٩٥٠٠٧ (ج)   | ١٢٣٤٥٧٨,٩ (ب)  | ٨٧٦٥٤٣٢١ (أ) |
| ٥٦١٤٧٦٥,٣ (و) | ٦٥٠٠٤٩,٧٦ (هـ) | ٦١٩٥٠٠٠٠ (د) |

## ثالثاً: التقريب لأقرب وحدة

نعلم أنه توجد أعداد كثيرة غير صحيحة مثل:  $8,75$  ،  $53,07$  ،  $\frac{3}{4}$  ،  $96, \dots$  عند تقريب أي من هذه الأعداد غير الصحيحة إلى أقرب وحدة فإن العدد الناتج عن التقريب يكون عدداً صحيحاً.

**فمثلاً:** إذا أردنا تقريب العدد  $53,8$  لأقرب وحدة، فإننا نجد أن هذا العدد ينحصر بين العددين الصحيحين  $53$  ،  $54$  وهو أقرب إلى العدد  $54$  منه إلى العدد  $53$  (كما يظهر على خط الأعداد).



لذلك فإن:  $53,8 \approx 54$  لأقرب وحدة.

### قاعدة التقريب لأقرب وحدة:

من دراستك للمثال السابق، استنتج قاعدة عامة للتقريب لأقرب وحدة.  
لذلك:

عند التقريب لأقرب وحدة، ننظر إلى رقم الأجزاء من **عشرة** فإذا كان هذا الرقم أصغر من **5** يُحذف الجزء الكسري ويبقى كما هو. وإذا كان هذا الرقم مساوياً **5** أو أكبر من **5** يُحذف الجزء الكسري ويزاد **واحد**.

أحياناً نقول "التقريب لأقرب عدد صحيح" بدلاً من أن نقول "التقريب لأقرب وحدة"

ملحوظة

## مثال ١

قرب العدد  $١٧٣,٢$  لأقرب وحدة

**الحل:** رقم الأجزاء من عشرة هو  $٢$  (أصغر من  $٥$ )، والتالي يكون  $١٧٣,٢ \approx ١٧٣$  لأقرب وحدة.

## مثال ٢

قرب العدد  $٦٤,٦٩$  لأقرب وحدة.

**أكمل الحل:** رقم الأجزاء من عشرة هو  $٦$  (أكبر من  $٥$ ) وبالتالي يكون  $٦٤,٦٩ \approx ٦٥$  لأقرب وحدة.

## مثال ٣

قرب العدد  $٤٠٢,٥٠١$  لأقرب عدد صحيح.

**أكمل الحل:** رقم الأجزاء من عشرة هو  $٥$  (يساوي  $٥$ ) وبالتالي يكون  $٤٠٢,٥٠١ \approx ٤٠٣$  لأقرب وحدة.

## مثال ٤

قرب العدد  $\frac{٤}{٥}$  لأقرب عدد صحيح.

**الحل:** نعلم أن  $\frac{٤}{٥} = \frac{٨}{١٠} = ٠,٨$ ، وبالتالي  $\frac{٤}{٥} = ٠,٨$  وبالتالي فإن  $\frac{٤}{٥} \approx ١$  لأقرب عدد صحيح.

## تدريب ٥ قَرِّبْ كلاً من الأعداد الآتية لأقرب عدد صحيح:

|                       |                       |                        |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| ٦٦٤,٠٩ (ج)            | ٥٣,٥ (ب)              | ١٠,١ (أ)               |
| ٢٥٣,٣٩٨ (و)           | ٦٠٠,٦٠١ (هـ)          | ٧,٤٩٩ (د)              |
| ٩٦٧ $\frac{١}{٤}$ (ط) | ٢٠٤ $\frac{٣}{٥}$ (ح) | ١٣٥ $\frac{٧}{١٠}$ (ز) |

## رابعاً التقريب لأقرب جزء من عشرة

مثال ١

قَرِّبِ العددَ ١٦٤,٣٧ لأقربِ جزءٍ من عشرة.

الحل: العدد ١٦٤,٣٧ ينحصر بين ١٦٤,٣ ، ١٦٤,٤ ، وهو أقرب للعدد ١٦٤,٤ منه

للعدد ١٦٤,٣



لذلك فإن:  $١٦٤,٣٧ \approx ١٦٤,٤$  لأقرب جزء من عشرة

### قاعدة التقريب لأقرب جزء من عشرة:

استنتج قاعدة عامة للتقريب، وأكمل لأقرب جزء من عشرة.

- عند التقريب لأقرب جزء من عشرة، ننظر لرقم الأجزاء من مائه
- فإذا كان هذا الرقم أصغر من ٥ يُستبدل رقم الأجزاء من مائه بصفر ويبقى باقي العدد كما هو.
  - أما إذا كان هذا الرقم مساوياً ٥ أو أكبر من ٥ يُستبدل رقم الأجزاء من مائه بصفر ويزاد رقم الأجزاء من عشرة واحداً.

مثال ٢

قَرِّبِ العددَ ٦٧,٢٩ لأقربِ جزءٍ من عشرة.

الحل: رقم الأجزاء من مائة هو ٩ (أكبر من ٥)، لذلك فإن:

$٦٧,٢٩ \approx ٦٧,٣$  لأقرب جزء من عشرة.






# الوحدة الثانية

## العندسة

- التطابق .
- الأشكال المتماثلة وخطوط التماثل .
- الأنماط البصرية .




## التطابق

### الدرس الأول

كيف تتحقق من تطابق شكلين عملياً؟

مثال ١



إذا أردت التحقق عملياً من تطابق الشكلين ا ب ج د، س ص ع م اتبع الخطوات الآتية:

(١) أحضر ورقة شفافة وانقل فيها الشكل ا ب ج د.

(ب) ضع الورقة الشفافة مقلوبة فوق الشكل س ص ع م، وحرك الورقة، فإذا انطبق الشكلان

على بعضهما تمام الانطباق، بحيث لا ترى إلا شكلاً واحداً، تتأكد حينئذ من أنهما منطبقان، ويكون: ا ← فوق س، ب ← فوق ص، ج ← فوق ع، د ← فوق م

وأيضاً:  $\overline{اب} \equiv \overline{سص}$ ،  $\overline{بج} \equiv \overline{صع}$ ،  $\overline{جد} \equiv \overline{صم}$ ،  $\overline{دا} \equiv \overline{م س}$   
(الرمز  $\equiv$  يُقرأ تطابق).

كذلك أيضاً:  $\sphericalangle ا \equiv \sphericalangle س$ ،  $\sphericalangle ب \equiv \sphericalangle ص$ ،  $\sphericalangle ج \equiv \sphericalangle ع$ ،  $\sphericalangle د \equiv \sphericalangle م$


وبصفة عامة:

يتطابق مُضَلَّعان إذا كانت:

١- أضلاعُهما المتناظرة متساوية.

٢- زواياهما المتناظرة متساوية.


## مثال ٢



- (أ) لاحظ أن المربع س ص ع ل يطابق المربع ا ب ج د.  
 (ب) لاحظ أن المربع ز ح ط ي يطابق المربع م ن هـ و.  
 (ج) شرط تطابق مربعين:

يتطابق مربعان إذا كان طول ضلع أحدهما = طول ضلع الآخر

## مثال ٣



- (أ) لاحظ أن المستطيل س ص ع ل بحيث يطابق المستطيل ا ب ج د.  
 (ب) لاحظ أن المستطيل ط ق ك ي بحيث يطابق المستطيل م ن هـ و.  
 (ج) شرط تطابق مستطيلين:


يتطابق مستطيلان إذا كان طول أحدهما = طول الآخر، عرض أحدهما = عرض الآخر  
 ومعنى آخر إذا كان بُعدا أحدهما = بعد الآخر



مثال ٤

سؤال؟ هل يكفي تساوي الأضلاع المتناظرة لشكلين لكي يكونا متطابقين؟


للإجابة عن هذا السؤال، نقوم بالتدريب الآتي:




شكل (٣)




شكل (٢)




شكل (١)



شكل (٦)



شكل (٥)



شكل (٤)

- ١- تحقق بالقياس من أن أطوال أضلاع الأشكال ١، ٢، ٣ جميعها متساوية، وجميع أطوال الأضلاع للأشكال ٤، ٥، ٦ أيضًا متساوية.
- ٢- استخدم ورقة شفافة لمعرفة الأشكال المتطابقة من بين الأشكال الستة.
- ٣- حدّد الشكلين المتطابقين من الأشكال الثلاثة الأولى: شكل ( ) وشكل ( )
- ٤- حدّد الشكلين المتطابقين من الأشكال الثلاثة الأخرى: شكل ( ) وشكل ( )
- ٥- حدّد شكلين غير متطابقين من الأشكال الثلاثة الأولى: شكل ( ) وشكل ( )
- ٦- حدّد شكلين غير متطابقين من الأشكال الثلاثة الأخرى: شكل ( ) وشكل ( )
- ٧- ما العلاقة بين قياسات الزوايا للأشكال التي وجدت أنها متطابقة؟
- ٨- ما العلاقة بين قياسات الزوايا للأشكال التي وجدت أنها ليست متطابقة؟

كما سبق نرى أنه: لا يكفي تساوي الأضلاع المتناظرة لشكلين لكي نعتبر أن هذين

الشكلين متطابقان، بل يلزم أيضًا تساوي الزوايا المتناظرة.

حالة خاصة: يكفي تساوي الأضلاع المتناظرة في مثلثين لكي يكونا متطابقين.


وذلك لأن تساوي الأضلاع المتناظرة في مثلثين يؤدي بالضرورة

لتساوي زواياهما المتناظرة.

## الأشكالُ المتماثلةُ وخطوطُ التَّمَاثُلِ

### تعريف

### خط التماثل



إذا طَوِيَ الشكلُ أ ب ج د حول س ص

فانطبق جزئه الأيمن على جزئه الأيسر تماما سمي المستقيم س ص

بخط تماثل الشكل أ ب ج د

وفي هذه الحالة يسمى الشكل أ ب ج د شكلا متماثلا حول محور

### مثال ١

(١) حدّد الأشكالَ المتماثلةَ فيما يلي، وارسمْ لكلِّ منها خطَّ تماثلٍ واحداً:



شكل (٥)



شكل (٤)



شكل (٣)



شكل (٢)



شكل (١)



شكل (٩)



شكل (٨)



شكل (٧)




شكل (٦)

- (ب) هل يوجد أكثر من خط تماثل لبعض الأشكال السابقة؟  
 (ج) إذا كانت إجابتك "نعم" فحدّد هذه الأشكال، ثمّ ارسم هذه الخطوط.  
 (د) هل توجد أشكال مما سبق ليس لها خط تماثل؟  
 وإذا كانت إجابتك "نعم" فحدّدها

مما سبق يتضح أنّ بعض الأشكال الهندسية لها خط تماثل أو أكثر، (وتعتبر أشكالاً متماثلة) وبعضها ليس لها أيّ خط تماثل، (وتعتبر أشكالاً غير متماثلة)

### مثال ٢

تخيل أن  $أ ج$  هو خط طي، لاحظ متوازي الأضلاع  
 ا ب ج د المرسوم وأجب في حالة الطي:




- (أ) هل ب تنطبق على ج؟ لا  
 (ب) هل ينطبق  $\Delta$  ا ب ج على  $\Delta$  ا د ج؟ لا  
 (ج) هل  $أ ج$  خط تماثل للشكل ا ب ج د؟ لا  
 (د) هل  $\Delta$  ا ب ج يطابق  $\Delta$  ا د ج؟ ولماذا؟  
 لاحظ أن  $\Delta$  ا ب ج يطابق ج د ا (في حالة عدم الطي)

مما سبق يُمكن القول بأنه إذا وُجدَ خط يقسم شكلاً إلى جزئين متطابقين،  
 فليس من الضروري أن يكون هذا الخط خط تماثل للشكل.

### مثال ٣

لاحظ الشكل المرسوم إلى الجانب الأيسر ثمّ أكمل:



- (أ) الشكل ا ب ج د مُعيّن.  
 (ب) ارسم ب د، هل ب د خط تماثل للشكل  
 ا ب ج د، ولماذا؟ نعم لأنه يقسم الشكل  
 ا ب ج د إلى جزئين منطبقين تماماً عند الطي  
 (لأنّ أحدهما الجزأين المتماثلين بلونٍ ما).




(ج) تحقق من أن  $\overleftrightarrow{اج}$  خطٌ تماثلٍ ثانٍ للشكلِ  $ا ب ج د$ . ثمّ لَوْنِ أَحَدِ الْجَزَائِنِ الْمُتَمَاثِلِينَ بِلَوْنٍ آخَرَ غَيْرِ السَّابِقِ (فِي رَقْمِ ب).

ثُمَّ سَبِقْ نَجِدْ أَنْ: لِلْمَعْيِنِ خَطَانِ تَمَاثِلِ.

ناقش مع معلمك: عدد خطوط التماثل لكل من المربع - المستطيل

## مثال ٤



تأمل الشكلين المرسومين ثمّ أجب:

(١) أكمل:

كلٌّ من الشكلين (١)، (٢) يسمّى "شبه منحرف" ولكن شكل (١) شبه منحرف متساوي الساقين، وشكل (٢) شبه منحرف

(ب) في شكل (١):

- ١- هل  $\overleftrightarrow{م ن}$  خطٌ تماثلٍ لشكل (١)؟ ولماذا؟ **نعم**: لأنه يقسم الشكل إلى جزئين متطابقين عند الطي
- ٢- هل  $\overleftrightarrow{هـ و}$  خطٌ تماثلٍ لشكل (١)؟ ولماذا؟ **لا**: لأنه لا يقسم الشكل إلى جزئين متطابقين عند الطي
- ٣- هل  $\overleftrightarrow{ا ج}$  خطٌ تماثلٍ لشكل (١)؟ ولماذا؟ **لا**: لأنه لا يقسم الشكل إلى جزئين متطابقين عند الطي
- ٤- هل يوجد خط تماثل يشبه المنحرف  $س ص ع ل$ ؟ **لا**: لأنه لا يقسم الشكل إلى جزئين متطابقين عند الطي

ثُمَّ سَبِقْ نَجِدْ أَنْ:

شبه المنحرف المتساوي الساقين له خطٌ تماثلٍ واحد وهو المستقيمُ المارٌّ بمنتصفي قاعدتيه.



سؤال؟

١- هل محور تماثل شبه المنحرف المتساوي الساقين عمودى على قاعدتيه؟  
..... (تحقق بالقياس).

٢- فى شكل (١): هل الشكلى ا م ن ب يطابق الشكل د م ن ج؟ ولماذا؟  
.....

(ج) انقل شكل (٢) على ورقة شفافة وتحقق بالطى من أنه لا يوجد أى خط تماثل لشبه المنحرف غير المتساوي الساقين.

---

## الأنماطُ البصرية

## سؤال؟

ما هو النمط؟

النمط هو تتابع من أعدادٍ أو رموزٍ أو أشكالٍ وفقاً لنظامٍ مُعينٍ (أو لقاعدةٍ مُعينة).

أمثلة:

- (١) ١، ٥، ٩، ١٣، .... الخ (وصفُ النمطِ: كلُّ عددٍ يزيدُ ٤ عن السابقِ له)
- (٢) س ص ع س ص ع س ص ع .... الخ (وصفُ النمطِ: تكررُ س ص ع)
- (٣) + - + + - + + .... الخ (وصفُ النمطِ: تكررُ + + -)
- (٤) □ △ □ □ △ □ □ .... الخ (وصفُ النمطِ: تكررُ □ □ △)

مثال ١

اكتشفِ النمطَ ثمَّ أكمل:

- ١-١ ا ب ج ا ب ج ا ب ج ..... (وصفُ النمطِ: .....)
- ٢-٢ ▽ △ ▽ △ ▽ △ ..... (وصفُ النمطِ: .....)
- ٣-٣ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ..... (وصفُ النمطِ: .....)
- ٤-٤ ..... ، ..... ، ..... ، ٨٠ ، ٩٠ ، ١٠٠ ، ..... (وصفُ النمطِ: .....)

الحل:

- ١-١ تكرر ا ب ج
- ٢-٢ تكرر ▽ △
- ٣-٣ تكرر □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
- ٤-٤ كل عدد ينقص ١٠ عن السابق له

# الوحدة الثالثة

# القياس

- السعة.
- الوزن.
- الوقت.




## الدرس الأول

## السعة




## تمهيد

نتعاملُ في كثيرٍ من مواقف الحياة مع السعة، فهذه عبوة سعتها لترٌ "واحد"، وهذه سعتها ٢ لتر، وتلك سعتها ٢٥٠ مليلتراً، وهذه حُقنة يأمرُ بها طبيبٌ لمرريضٍ سعتها ٢ مليلتر ... إلخ، فما هو اللتر؟ وما هو المليلتر؟



المِليلتر هو سعةُ عبوةٍ على شكلِ مكعبٍ طولُ ضلعيه ١ سم



الترُّ هو سعةُ عبوةٍ على شكلِ مكعبٍ طولُ ضلعيه ١٠ سم

سؤال؟ ما العلاقة بين اللتر والمِليلتر؟

الترُّ = ١٠٠٠ مِليلترٍ



سؤال؟ أيهما أصغرُ: اللتر أم المليلتر؟

التر = ١ ديسمتر<sup>٣</sup> ، المليلتر = ١ سم<sup>٣</sup>

ملحوظة

الديسمتر المكعب يرمز له بالرمز ١ ديسم<sup>٣</sup>  
والستيمتر المكعب يرمز له بالرمز ١ سم<sup>٣</sup>

مثال ١

اكتب وحدة القياس المناسبة لكل مما يلي:

- (١) مقدار جرعة من دواءٍ نصَحَ بها طبيبٌ لمريضٍ. (.....)
- (ب) مقدار ما يملأُ عُبَّةَ عَصِيرٍ من الحجم العائلي. (.....)
- (ج) مقدار المياه التي يستهلكها شخصٌ في الاستحمام. (.....)
- (د) كمية المياه التي يذوبُ بها دواءٌ في شكلِ بودرة. (.....)
- (هـ) مقدار ما يملأُ كوبًا من الماء. (.....)
- (و) مقدار ما يملأُ زجاجة مياه معدنية. (.....)

الحل: (أ) مليلتر (ب) لتر (ج) لتر (د) سم<sup>٣</sup> (هـ) سم<sup>٣</sup> (و) لتر

مثال ٢

اختر الإجابة الأقرب إلى الصواب مما بين القوسين:


- (١) اشترت إيمان زجاجة دواءٍ سَعَتْها ..... (  $\frac{1}{9}$  لتر ، ٢ لتر ، ١٠٠٠ مليلتر )
- (ب) استخَمْتُ اليومَ بكميةٍ من المياه بلغت تقريباً ..... ( ٥٠ لترًا ،  $\frac{1}{4}$  لتر ، ١٠ لترات )
- (ج) عندنا خزانٌ للمياه سَعَتْه ..... ( ٢٠٠ مليلتر ، ٥٠ لترًا ، ٣٠٠٠ مليلتر )
- (د) أخذتُ حُقنةً عندما كنتُ مريضًا مقدارها ..... ( ١ مليلتر ،  $\frac{1}{4}$  لتر ، ١٠ مليلترات )

الحل: (أ)  $\frac{1}{9}$  لتر (ب) ١٠ لتر (ج) ٥٠ لتر (د) ١ مليلتر

مثال ٣

أكمل ما يلي:

(١) ٢ لتر = ..... مليلتر  
 (ب) ٧,٧٥ لتر = ..... مليلتر  
 (ج) ٨٥٠٠ مليلتر = ..... لتر  
 (د) ٣٠٠٠ مليلتر = ..... لتر  
 (هـ) ٩٧٥٠ مليلترًا = ..... لتر



الحل: (١) ٢٠٠ (ب) ٧٧٥٠ (ج) ٨,٥ (د) ٣ (هـ) ٩,٧٥

مثال ٤

صِلْ كُلَّ صُورَةٍ لِشَكْلِ بِالسَّعَةِ الْأَكْثَرِ مَنَاسِبَةً لَمَلِنِهِ، ثُمَّ رَتِّبْ أَسْمَاءَ الْأَشْيَاءِ طَبَقًا لِسِعَتِهَا تَصَاعِدِيًّا:

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| زجاجة دواء  | حقنة  | دلو ماء   | زجاجة مياه معدنية  | سخان مياه   |
| ٣ مليلترات  | ٣٠ لترًا  | ٩٠٠٠ مليلتر   | ٣٠ مليلترًا  | ١٠ لترات  |

الترتيبُ تصاعديًّا: .....

## الدَّرْسُ الثَّانِي

# الْوَزْنُ



قياسُ الوزنِ:

## تَمَهِّدٌ

نتعاملُ كثيراً في المواقفِ الحياتيةِ المختلفةِ مع الأوزانِ، فالطفلُ عندما يذهبُ إلى طبيبٍ، فإنَّهُ يتعرَّفُ عادةً على وزنه (لماذا؟). والأبُ أو الأمُّ عندما تشتري أشياءً للمنزلِ كالأرزِ أو السكرِ أو اللحمِ أو ... إلخ، فإنَّهُ (أو إنها) يتعاملُ مع الوزنِ ... إلخ. **فما هي وحداتُ قياسِ الوزنِ؟**

■ درستَ من هذه الوحداتِ فيما سبقَ وَحَدَّتِي: الجرامِ والكيلوجرامِ، وَعَلِمْتَ أَنَّ:

الكيلوجرام = ١٠٠٠ جرام

وفي هذا الدرسِ سيضافُ إلى معلوماتِكَ وحدةٌ جديدةٌ لقياسِ الوزنِ، وهي الطُّنُّ:

الطن = ١٠٠٠ كجم

سؤال؟

كم جراماً في الطن؟

الطن = ١٠٠٠ كجم = ١٠٠٠ × ١٠٠٠ جرام = ..... جرام

أي أن:

الطن = مليون جرام


مثال ١

رتب الوحدات التالية تصاعدياً ثم تنازلياً: كجم ، جم ، طن

تصاعدياً: جم ، كجم ، طن      تنازلياً: طن ، كجم ، جم

مثال ٢

- أكمل:
- (١) ٣ كجم = ..... جم
  - (ج) ٢ طن = ..... كجم
  - (هـ) ٥ أطنان = ..... كجم = ..... جم
  - (ب) ٧٥٠٠ جرام = ..... كجم
  - (د) ٤٧٥٠ كجم = ..... طن
- (و)



الحل:

- (١) ٣٠٠
- (ج) ٧,٥
- (هـ) ٥٠٠٠ كجم. ٥٠٠٠,٠٠٠ جم
- (ب) ٢٠٠٠
- (د) ٤,٧٥
- (و)



### مثال ٣

اختر الإجابة الأقرب إلى الصواب مما بين القوسين:

- (أ) اشترت حنان أسورة من الذهب وزنها ..... (٢ طن ، ١٠ جرامات ، ٢ كجم)  
 (ب) وزن حقيبة الكتب التي أحملها يوميًا ..... (٣ أطنان ، ٣ جرامات ، ٣ كجم)  
 (ج) تبلغ حمولة سيارة نقل ..... (٢ طن ، ٢٠ كجم ، ٣٥٠٠ جم)  
 (د) يبلغ وزن والدي ..... (طنًا واحدًا ، ٩٥ كجم ، ٨٠ جم)

الحل:

- (أ) ١٠ جرام  
 (ب) ٣ كجم  
 (ج) ٢ طن  
 (د) ٩٥ كجم

### نشاط

اختر وحدة القياس المناسبة لكل مما يلي:

- (أ) قياس (تحديد) الأوزان في لعبة رفع الأثقال. (طن ، جم ، كجم)  
 (ب) شراء هدية من محل بيع الذهب. (طن ، جم ، كجم)  
 (ج) شراء فاكهة من بائع الفاكهة. (طن ، جم ، كجم)  
 (د) أقصى حمولة لكوبرى يُقام على ترعة. (طن ، جم ، كجم)

## الوقت



## تمهيد

في مُعْظَمِ المواقِفِ الحياتِيَّةِ نتعاملُ مع الوقتِ (الزمن)، فَأَنْتَ تذهبُ إلى مدرستِكَ في وقتٍ محددٍ، وينتهي موعدها في وقتٍ محددٍ. ويذهبُ والدُكَ إلى عمله في وقتٍ محددٍ، ويعودُ منه في وقتٍ محددٍ. ونُصَلِّي في أوقاتٍ محددةٍ، ونُشاهدُ مُبارياتِ الكُرَةِ (مسابقاتِ الدُورِي والكأس) في مواعيدٍ محددةٍ ... إلخ.

سؤال؟ كيف يُقاسُ الوقتُ؟ وما هي وَحَدَاتُ قياسِهِ؟

## مثال ١

درستَ فيما سبقَ وَحَدَتَيْنِ من وَحَدَاتِ قياسِ الوقتِ وهما السَّاعَةُ والدَّقِيقَةُ، أكملْ ما يلي (للمراجعة):

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ساعة = (ب) الدقيقة                 | (أ) ساعة = دقيقة                |
| ساعة = (د) ١٢٠ دقيقة               | (ج) ٣ ساعات = دقيقة             |
| دقيقة = (و) $\frac{1}{4}$ ساعة     | (هـ) $\frac{1}{6}$ ساعة = دقيقة |
| دقيقة = (ح) ساعة وثُلثُ السَّاعَةِ | (ز) $\frac{1}{3}$ ساعة = دقيقة  |
| دقيقة = (ي) ٩٠ ثانية               | (ط) ١٥٠ دقيقة = ساعة            |

الحل:

|                        |                            |                       |                         |
|------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| ساعة $\frac{1}{60}$ =  | (ب) الدقيقة                | دقيقة 60 =            | (أ) ساعة                |
| ساعة 6 =               | (د) 120 دقيقة              | دقيقة 180 =           | (ج) 3 ساعات             |
| دقيقة 15 =             | (و) ساعة $\frac{1}{4}$     | دقيقة 30 =            | (هـ) ساعة $\frac{1}{2}$ |
| دقيقة 80 =             | (ح) ساعة وتُثلثُ السَّاعةِ | دقيقة 20 =            | (ز) ساعة $\frac{1}{3}$  |
| دقيقة $1\frac{1}{6}$ = | (ى) 90 ثانية               | ساعة $2\frac{1}{6}$ = | (ط) 150 دقيقة           |

مثال ٢

في هذا التدریبِ سنتعرّفُ على وَحدةٍ جديدةٍ لقياسِ الوقتِ وهى الثانيةُ. فَمَا الْعَلَاقَةُ بَيْنَ الدَّقِيقَةِ وَالثَّانِيَةِ؟

الدَّقِيقَةُ = 60 ثَانِيَةً

أكمل:

|             |   |               |             |   |                  |
|-------------|---|---------------|-------------|---|------------------|
| ثانية ..... | = | (ب) 4 دقائق   | ثانية ..... | = | (أ) 3 دقائق      |
| دقيقة ..... | = | (د) 120 ثانية | دقائق ..... | = | (ج) 240 ثانية    |
| ثانية ..... | = | × ثانية       | دقيقة ..... | = | (هـ) ساعة        |
|             |   |               |             | = | أى أن: السَّاعةُ |

الحل:

|              |               |             |                  |
|--------------|---------------|-------------|------------------|
| ثانية 240 =  | (ب) 4 دقائق   | ثانية 180 = | (أ) 3 دقائق      |
| دقيقة 2 =    | (د) 120 ثانية | دقائق 4 =   | (ج) 240 ثانية    |
| ثانية 3600 = | 10 × 10 ثانية | دقيقة 60 =  | (هـ) ساعة        |
|              |               |             | أى أن: السَّاعةُ |

## مثال ٣

في هذا التدريب سنتعرفُ وحدةً أُخرى لقياسِ الوقتِ وهي اليومُ. فما العلاقةُ بينَ اليومِ والسَّاعةِ؟

أكمل:

اليومُ = ٢٤ ساعةً

|        |   |                        |        |   |                        |
|--------|---|------------------------|--------|---|------------------------|
| ساعةً  | = | (ب) يومٌ               | ساعةً  | = | (١) يومانِ             |
| ساعاتِ | = | (د) $\frac{1}{4}$ يومٍ | ساعاتِ | = | (ج) $\frac{1}{3}$ يومٍ |
| ساعةً  | = | (و) ٤ أيامٍ            | ساعةً  | = | (هـ) ٣ أيامٍ           |
| يومٍ   | = | (ح) ٨٤ ساعةً           | أيامٍ  | = | (ز) ٧٢ ساعةً           |

الحل:

|        |   |                        |        |   |                        |
|--------|---|------------------------|--------|---|------------------------|
| ساعةً  | = | (ب) يومٌ               | ساعةً  | = | (١) يومانِ             |
| ساعاتِ | = | (د) $\frac{1}{4}$ يومٍ | ساعاتِ | = | (ج) $\frac{1}{3}$ يومٍ |
| ساعةً  | = | (و) ٤ أيامٍ            | ساعةً  | = | (هـ) ٣ أيامٍ           |
| يومٍ   | = | (ح) ٨٤ ساعةً           | أيامٍ  | = | (ز) ٧٢ ساعةً           |

## مثال ٤

رتب ما يلي تصاعدياً: ١٤٤٠ دقيقة، ٣٦٠٠ ثانية،  $\frac{1}{3}$  يومٍ،  $\frac{1}{8}$  يومٍ

الترتيب التصاعدي: ، ، ، ،

الحل:

$$١٤٤٠ \text{ دقيقة} = ١٤٤٠ \times ٦٠ = ٨٦٤٠٠ \text{ ثانية}$$

$$\frac{1}{3} \text{ يوم} = ٨ \text{ ساعات} = ٦٠ \times ٨ = ٤٨٠ \text{ دقيقة} = ٦٠ \times ٦٠ \times ٨ = ٢٨٨٠٠ \text{ ثانية}$$

$$\frac{1}{8} \text{ يوم} = ٣ \text{ ساعات} = ٦٠ \times ٣ = ١٨٠٠ \text{ دقيقة} = ٦٠ \times ٦٠ \times ٣ = ١٠٨٠٠ \text{ ثانية}$$


$$\text{وحيث أن } ٨٦٤٠٠ > ٢٨٨٠٠ > ١٠٨٠٠ > ٣٦٠٠$$

فإن الترتيب التصاعدي هو ٣٦٠٠ ثانية  $\frac{1}{8}$  يوم،  $\frac{1}{3}$  يوم، ١٤٤٠ دقيقة



مثال ٤

لاحظ المخطط التالي:



مثال ٥

اختر الإجابة الأقرب إلى الصواب مما بين القوسين:

- (أ) استغرق عمل الواجب المدرسي بالأمس .....  
 (  $\frac{1}{4}$  يوم ، ٣ ساعات ، ٣ دقائق ، ٣ ثوانٍ )
- (ب) جلستُ أمام التلفزيون لمشاهدة مباراة كرة قدم استمرت .....  
 ( ٩٠٠ دقيقة ، ١٠٠ دقيقة ، ٣ ساعات ،  $\frac{1}{4}$  يوم )
- (ج) تستغرق فترة إعداد وتجهيز طعام الإفطار يوم الجمعة .....  
 (  $\frac{1}{4}$  يوم ،  $\frac{1}{4}$  ساعة ، ٣٠ ثانية )
- (د) تبلغ فترة النوم للشخص العادي حوالي .....  
 ( ٥٠٠ ثانية ، ٥٠٠ دقيقة ، ١٠٠ دقيقة )
- (هـ) تبلغ فترة العمل اليومي لموظف .....  
 ( ٤٨ دقيقة ،  $\frac{1}{4}$  يوم ، ٣٦٠ ثانية )

(ب) ١٠٠ دقيقة

(د) ٥٠٠ دقيقة

(أ) ٣ ساعات

(ج)  $\frac{1}{4}$  ساعة

(هـ)  $\frac{1}{4}$  يوم

# الوحدة الرابعة

## الإحصاء والاحتمال

- جمع البيانات وعرضها وتمثيلها .
- الاحتمال .
- تدريبات عامة على الوحدة .



## الدَّرْسُ الأولُ

## جمع البيانات وعرضها وتمثيلها

## جمع البيانات:

يحتاج الإنسان البيانات حتى يفهم ما يحيط به ويتخذ قراراته. ومن أساليب جمع البيانات: الملاحظة والتجارب والدراسات الميدانية.

## أولاً - الملاحظة:



## نشاط ١

سجّل عدد التلاميذ المترددين على مقصف المدرسة (الكانتين) في فترة الراحة (الفسحة) يومياً لمدة أسبوع دراسي.

| أيام الأسبوع | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس |
|--------------|-------|---------|----------|----------|--------|
| عدد التلاميذ | ..... | .....   | .....    | .....    | .....  |

من ملاحظتك السابقة، استنتج ما يلي:

- ما اليوم الذي يتردد فيه أكبر أو أقل عدد من التلاميذ؟ وما تفسيرك لذلك؟
- ما عدد التلاميذ الذين لا يترددون على المقصف (الذين يحضرون طعامهم وشرابهم من منازلهم)؟
- استمر في ذكر أسئلة أخرى.. (وقد تحتاج للإجابة عن هذه الأسئلة إلى القيام بملاحظات أخرى أو بجمع بيانات أخرى)....


## نشاط ٢

قِسْ درجات الحرارة في الصباح الباكر والظهر والمساءً لمدة أسبوع، وكتب تقريراً عن درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع (مع الأخذ في الاعتبار أن درجة الحرارة المعتدلة حوالي ٢٢°).

- هل درجات الحرارة معتدلة أم منخفضة أم عالية؟
- ما نوع الملابس المناسبة للارتداء في هذا الأسبوع؟
- استمر في ذكر أسئلة أخرى.



## نشاط ٣




قس طول شجرة في أزمنة مختلفة (كل شهرين مثلاً)، وسجل ملاحظاتك عن نموها.

لاحظ أنك في الحالتين (٢ ، ٣) استخدمت أدوات للقياس، وأدوات القياس هي أمور لازمة لملاحظة بعض الأشياء.

## ثانياً - التجريب:

التجريب من الأمور الأساسية التي تمكّننا من المعرفة الجديدة، ومن الإلمام بكثير من الوقائع (الحقائق) في الكون، والتعرف على بيانات لم تكن معروفة لدينا من قبل.

## نشاط



■ خذ أصيصين (١ ، ٢) بكل منهما نبات أخضر مورق،

أحدهما بغطاء معتم وليكن الأصيص (ب)، بحيث لا يصل إليه ضوء الشمس.

■ زود كلاهما بالماء والسّماد مع تعريضهما للهواء.

■ اترك الأصيصين لمدة أسبوع.

■ لاحظ ما يطرأ على النبات في كل من الأصيصين في

نهاية الأسبوع.

**نلاحظ أن:** النبات يذبل، وتصفّر أوراقه الخضراء عندما لا يصل إليه الضوء، فلا يستطيع أن يكون غذاءه. وهذه معلومة جديدة حصلنا عليها عن طريق التجريب.



### ثالثاً- الدراسات الميدانية:

كثيراً ما نحتاج إلى معرفة رأي الناس في شيء ما، وذلك حتى نتخذ قراراتنا في ضوء هذه المعرفة. فمثلاً كثيراً ما تسأل محطات التلفزيون مُشاهديها - أو بصورة أدق عينة منهم - عن البرامج المفضلة لديهم (مسلسلات - أفلام - برامج دينية - برامج الأطفال - الأخبار - برامج الرأي - منوعات .... الخ)، وقد تستطرد في سؤالهم عن المواعيد المناسبة لإذاعة كل من هذه البرامج، (والرأي في مقدمتها ... وهكذا).

### عرض البيانات وتمثيلها واستنتاج معلومات منها

#### مثال ١

سأل معلم الفصل تلاميذه أن يذكروا له عدد الكتب التي قرءوها خلال العطلة الصيفية. وأمكن تسجيل إجاباتهم على النحو التالي:

| عدد التلاميذ | تسجيل عدد التلاميذ | عدد الكتب    |
|--------------|--------------------|--------------|
| ١٧           |                    | من ٠ إلى ٤   |
| ٩            |                    | من ٥ إلى ٩   |
| ١١           |                    | من ١٠ إلى ١٤ |
| ٤            |                    | من ١٥ إلى ١٩ |
| ٢            |                    | من ٢٠ إلى ٢٤ |
| ١            |                    | من ٢٥ فأكثر  |

لاحظ أننا نظمنا هذه البيانات في مجموعات (كل منها تتكون من ٥)، أكمل الجدول السابق، ثم أجب:


- ما عدد تلاميذ هذا الفصل؟
- رتب مجموعات الكتب التي يقرؤها تلاميذ هذا الفصل تنازلياً (في جدول).
- أوجد أكبر عدد للتلاميذ في الجدول. وكم من الكتب يقرأ كل منهم.
- بين كيف يُستفاد من البيانات السابقة في تجهيز كتب مناسبة بمكتبة المدرسة.

## تمثيل البيانات بالأعمدة والأعمدة المزدوجة

## مثال ٢

يُبيِّن الجدول التالي عدد المُشتركين في الأنشطة المدرسية من تلاميذ الصفِّ الرَّابِع الابتدائيِّ بإحدى المدارس الابتدائية:

| النشاط       | رياضي | اجتماعي | فني | ثقافي |
|--------------|-------|---------|-----|-------|
| عدد التلاميذ | ٤٥    | ٢٥      | ٣٠  | ١٥    |



(١) أكمل تمثيل هذه البيانات بالأعمدة.

(ب) ما مقترحاتك لتشجيع الطلاب على الاشتراك في الأنشطة المدرسية؟

## الدرس الثاني

## الاحتمال

## فرصة حدوث حدث معين (محدد):

سبق أن درسنا أن الأحداث إما أن تكون مؤكدة الحدوث أو مستحيلة أو مُمكنة، وأن الاحتمال يُعبّر عن فرصة وقوع الحدث. فإذا افترضنا أن احتمال وقوع الحدث المؤكّد ١، واحتمال وقوع الحدث المستحيل صفر؛ فإن احتمال وقوع الحدث المُمكن يتراوح بين ٠ ، ١ .

## تدريب ١

لاحظ ثم أكمل واختر الإجابة الصحيحة (بوضع علامة ✓ عليها)، مسترشداً بالمثال:

| الحدث                             | درجة الاحتمال | احتمال وقوع الحدث         |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------|
| مثال: تشرق الشمس من الشرق         | مؤكّد         | صفر أو ١ ✓ أو (بين ٠ ، ١) |
| يذهب التلميذ بالدراجة إلى المدرسة | ممكن          | صفر أو ١ أو (بين ٠ ، ١)   |
| تذهب الأسرة إلى المصيف كل عام     | .....         | صفر أو ١ أو (بين ٠ ، ١)   |
| يحيا الإنسان في الأرض إلى الأبد   | مستحيل        | صفر أو ١ أو (بين ٠ ، ١)   |
| يظهر النهار بعد الليل             | .....         | صفر أو ١ أو (بين ٠ ، ١)   |
| تكون الشمس ساطعة غداً             | .....         | صفر أو ١ أو (بين ٠ ، ١)   |

## تدريب ٢

تنبأت مصلحة الأرصاد الجوية أنه توجد فرصة غداً لأن تكون الشمس ساطعة بنسبة ٠,٨، وأن هذه الفرصة بعد الغد ستكون  $\frac{3}{4}$ . في أيّ اليومين يكون احتمال سطوع الشمس أكبر: غداً أم بعد غدٍ؟



ملحوظة

$$0,75 = \frac{75}{100} = \frac{3}{4} \quad , \quad 0,80 = 0,8$$

أكمل: ..... ستكون الفرصة أكبر لسطوع الشمس

## حساب الاحتمال

مثال ١



ألقي كمال قطعاً نقود ١٠٠ مرة، فظهر له صورة ٤٥ مرة، ما احتمال أن تظهر صورة وما احتمال أن تظهر كتابة كما وجد في التجربة؟

الحل:

الأحداث الممكنة هي: إما أن تظهر صورة أو كتابة

$$0,45 = \frac{45}{100} = \text{احتمال أن تظهر صورة كما وجد بالتجربة}$$

$$\text{عدد المرات التي ظهر فيها كتابة} = 100 - 45 = 55 \text{ مرة}$$



$$0,55 = \frac{55}{100} = \text{احتمال أن يظهر كتابة كما وجد في التجربة (أكمل)}$$

$$1 = \frac{100}{100} = \frac{55+45}{100} = \frac{55}{100} + \frac{45}{100}$$

ماذا تلاحظ؟

أي أن: مجموع الاحتمالات لكل الأحداث الممكنة = ١

مثال ٢

شيرين معها علبة دبابيس بها ١٠٠ دبوس، وقعت جميعها على الأرض. فظهر بعضها مستنداً على قاعدة  وظهر بعضها مائلاً . فإذا كان عدد الدبابيس المائلة ٣٥ دبوساً. احسب احتمال أن يظهر الدبوس مستنداً إلى قاعدة.



## الحل: (أكمل)

الأحداث الممكنة هي: إما أن يظهر الدبوس مستنداً إلى قاعدته، أو أن يظهر مائلاً.

$$\text{احتمال أن يظهر الدبوس مائلاً كما وُجِدَ بالتجربة} = \frac{35}{100} = 0,35$$

عدد المرات التي ظهر فيها الدبوس مستنداً إلى قاعدته كما وُجِدَ بالتجربة

$$= 100 - 35 = 65 \text{ مرة}$$

$$\text{احتمال أن يظهر الدبوس مستنداً إلى قاعدته كما وُجِدَ بالتجربة} = \frac{65}{100} = 0,65$$

## حل آخر:

الأحداث الممكنة هي: إما أن يظهر الدبوس مستنداً إلى قاعدته، أو أن يظهر مائلاً.

$$\text{احتمال أن يظهر الدبوس مائلاً كما وُجِدَ بالتجربة} = \frac{35}{100} = 0,35$$

$$\text{احتمال أن يظهر الدبوس مستنداً إلى قاعدته كما وُجِدَ بالتجربة} = 1 - 0,35 = 0,65$$

## المواصفات الفنية:

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| مقاس الكتاب:         | $\frac{1}{8}$ (٨٢ × ٥٧) سم |
| طبـع المتـن:         | ٤ لون                      |
| طبـع الغـلاف:        | ٤ لون                      |
| ورق المتـن:          | ٨٠ جم أبيض                 |
| ورق الغـلاف:         | ٢٠٠ جم كوشيه               |
| عدد الصفحات بالغلاف: | ١٤٤ صفحة                   |

جميع حقوق الطبع محفوظة لوزارة التربية والتعليم داخل جمهورية مصر العربية