




وزارة التربية

الرياضيات

كرّاسة التمارين



الفصل الدراسي الثاني
الصف العاشر



وزارة التربية

الرياضيات

الصف العاشر
الفصل الدراسي الثاني

كرّاسة التمارين

اللجنة الإشرافية لدراسة ومواءمة سلسلة كتب الرياضيات

أ. إبراهيم حسين القحطان (رئيساً)

أ. فتحية محمود أبو زور

أ. حصة يونس محمد علي

الطبعة الثانية

١٤٣٩ - ١٤٣٨ هـ

٢٠١٨ - ٢٠١٧ م

فريق عمل دراسة ومواءمة كتب الرياضيات للصف العاشر

أ. رضيّة ناصر القحطان (رئيساً)

أ. نجوى محمد وسيم

أ. السعيد فوزي إبراهيم

أ. منيرة علي العدوانى

أ. مجدي محمد الكواوى

دار التَّرْبَوِيَّون House of Education ش.م.م . وبيرسون إديوكيشن ٢٠١٢

© جَمِيعُ الْحَقُوقِ مَحْفُوظَةً : لَا يَجُوزُ نَسْرَأَيْ جُزْءَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ أَوْ تَصْوِيرِهِ أَوْ تَخْزِينِهِ أَوْ تَسْجِيلِهِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ دُونَ مُوَافَقَةِ خَطِيَّةٍ مِنَ النَّاشرِ .

الطبعة الأولى ٢٠١٢ م

الطبعة الثانية ٢٠١٤ م

٢٠١٦ م

٢٠١٧ م



صَاحِبُ الْسَّمْوَاتِ الشَّيْخُ صَبَّاجُ الْأَحْمَادُ الْجَابِرُ الصَّبَّاجُ
أَمِيرُ دُولَةِ الْكُوَيْتِ



سُمْوَ الشَّيْخْ نَوَافُ الْأَحْمَدُ الْجَاَبِرُ الصَّبَّاجُ

فِي عَهْدِ دُوَلَةِ الْكُوَيْتِ

المحتويات

الوحدة السادسة: هندسة الدائرة

| | |
|----------|-----------------------|
| ٩ | تمرين ١-٦ |
| ١٣ | تمرين ٢-٦ |
| ١٦ | تمرين ٣-٦ |
| ٢١ | تمرين ٤-٦ |
| ٢٥ | مراجعة الوحدة السادسة |
| ٢٨ | تمارين إثرائية |

الوحدة السابعة: المصفوفات

| | |
|----------|-----------------------|
| ٣٠ | تمرين ١-٧ |
| ٣٤ | تمرين ٢-٧ |
| ٣٩ | تمرين ٣-٧ |
| ٤٥ | تمرين ٤-٧ |
| ٤٩ | تمرين ٥-٧ |
| ٥٢ | مراجعة الوحدة السابعة |
| ٥٦ | تمارين إثرائية |

الوحدة الثامنة: حساب المثلثات (٢)

| | |
|----------|-----------|
| ٥٨ | تمرين ١-٨ |
| ٦٢ | تمرين ٢-٨ |
| ٦٥ | تمرين ٣-٨ |

| | |
|----|-----------------------------|
| ٦٨ | مراجعة الوحدة الثامنة |
| ٧٠ | تمارين إثرائية |

الوحدة التاسعة: الهندسة التحليلية

| | |
|----|-----------------------------|
| ٧٣ | ١-٩ تَمَرْنٌ |
| ٧٦ | ٢-٩ تَمَرْنٌ |
| ٧٨ | ٣-٩ (٤) تَمَرْنٌ |
| ٨٤ | ٣-٩ (ب) تَمَرْنٌ |
| ٨٧ | ٤-٩ تَمَرْنٌ |
| ٨٩ | ٥-٩ تَمَرْنٌ |
| ٩٢ | مراجعة الوحدة التاسعة |
| ٩٤ | تمارين إثرائية |

الوحدة العاشرة: الإحصاء والاحتمال

| | |
|-----|-----------------------------|
| ٩٦ | ١-١٠ تَمَرْنٌ |
| ١٠٢ | ٢-١٠ تَمَرْنٌ |
| ١٠٦ | ٣-١٠ تَمَرْنٌ |
| ١١١ | ٤-١٠ تَمَرْنٌ |
| ١١٤ | ٥-١٠ تَمَرْنٌ |
| ١١٩ | مراجعة الوحدة العاشرة |
| ١٢٢ | تمارين إثرائية |


مماض الدائرة

Tangent of The Circle


المجموعة ١ تمارين أساسية

في التمرينين (١-٢)، القطع المستقيمة تماس الدوائر، امر كز كل دائرة. أوجد قيمة س.

(٢)




(١)




في التمرينين (٣-٤)، حدد ما إذا كان المستقيم مماساً للدائرة التي مر كزها و.

(٤)




(٣)




في التمرينين (٥-٦)، حدد ما إذا كانت الدائرة محاطة بمضلعين (داخلة) أو محاطة بمضلعين (خارجية).


(٦)



(٥)




في التمرين (٧)، يحيط المضلع بدائرة. أوجد محيط المضلع.




(٧)

في التمرينين (٨-٩)، ب ج مماس للدائرة. أوجد قيمة س.

(٩)



(٨)




* (١٠) التحديّ: يبيّن الشكل دائرتين مركزيهما $م_١$ ، $م_٢$.

$م_١$ ت \perp $ت_١$ ، $م_٢$ ت \perp $ت_٢$ مماسان للدائرة التي مركزها $م$.

$م_١$ \perp $ل_١$ ، $م_٢$ \perp $ل_٢$ مماسان للدائرة التي مركزها $م$.


أثبت أن $ت_١ \parallel ت_٢$.




* (١١) التحديّ: ب د تمس الدائرة التي مركزها $م$ $ب د = 15$ سم، $ب م = 17$ سم.

(أ) أوجد طول نصف قطر الدائرة.


(ب) أوجد مساحة المثلث $ب ك د$.




المجموعة ب تمارين تعزيزية




(١) المستقيم $\overleftrightarrow{بـ جـ}$ في الشكل المقابل ماس للدائرة، أوجد قيمة س.



(٢) حدد ما إذا كان المستقيم $\overleftrightarrow{بـ جـ}$ ماس للدائرة.




(٣) حدد ما إذا كانت الدائرة محاطة بمثلث (داخلة) أو محيدة بمثلث (خارجية).



(٤) يبيّن الشكل ٤ قطع ماسية من نقطة مشتركة A إلى ٣ دوائر.

ما الذي يمكنك استنتاجه حول أطوال القطع الأربع؟ فسر.




(٥) $\overleftrightarrow{بـ دـ}$ د ماسان للدائرة.

(أ) أوجد قيمة س.

(ب) أوجد محيط الشكل الرباعي $BACD$.

(ج) أوجد $بـ جـ$.


في التمارين (٦-٧)، ايجاد مماس للدائرة في ١ ، $\hat{s}(1) = 70^\circ$.
 (٦) أوجد $\hat{s}(4)$.



(٧) إذا كان $\hat{s}(1) = s$ ، فأوجد $\hat{s}(4)$ بمعنوية س.

في التمارين (٨-١١)، اختار الإجابة الصحيحة:

(٨) إذا كان دب، دج مماسان للدائرة. فإن س =




(د) ١١٤

(ج) ٦٦

(ب) ٥٧

(أ) ٢٦

(٩) إذا كان دب مماس للدائرة. فإن س =




(د) ٤٠

(ج) ٣٤

(ب) ٢٨

(أ) ٢٢

(١٠) إذا كان دب مماس للدائرة. فإن س =




(د) ١٧

(ج) ١٥

(ب) ٩

(أ) ٨

(١١) إذا كان جب مماس للدائرة. فإن س =



(د) ٥

(ج) ٤

(ب) ٣


(أ) ٢

الأوتار والأقواس


Chords and Arcs

المجموعة ١ تمارين أساسية


(١) أوجد قيمة س في الأشكال التالية:



(ج)




(ب)




(أ)

(٢) في الشكل المقابل إذا كان:


\overline{AB} قطر الدائرة، $\overline{AB} \perp \overline{CD}$. ماذا تستنتج؟




(٣) أوجد قيمة س في الأشكال التالية:




(ج)




(ب)



(أ)



(٤) تحليل الخطأ: نظر سلطان إلى الشكل المقابل واستنتج أن $\overline{AB} \cong \overline{CD}$. ما الخطأ في استنتاجه؟



(٥) أ، ب مراكز دائرتين متطابقتين. \overline{CD} وتر مشترك للدائرتين.

(أ) إذا كان $\overline{AB} = 8$ سم، $\overline{CD} = 6$ سم. فما طول نصف القطر؟


(ب) إذا كان $\overline{AB} = 24$ سم، نصف القطر = 13 سم. فما طول \overline{CD} ؟

(٦) تفكير ناقد: طول قطر دائرة يساوي ٢٠ سم، وطولاً وتران موازيان لهذا القطر ٦ سم و ١٦ سم.
أوجد المسافة بين الوتران لأقرب جزء من عشرة من المستيمتر.

(أ) إذا كان الوتران في جهة واحدة من المركز.

(ب) إذا كان الوتران في جهتين مختلفتين من المركز.

(٧) البعد بين مركز الدائرة ووتر طوله ٩ سم يساوي ١١ سم تقريرياً.
أوجد طول نصف قطر الدائرة لأقرب عدد كلي.



(٨) دائرتان مركبتان على الترتيب أ^1 ، ب^1 تتقاطعان بالنقاطين ج ، د .
وطول نصف قطر كل دائرة ٦ سم.
أوجد طول $\text{ج}\text{د}$ إذا كان طول أب يساوي ٨ سم.

في التمرينين (٩ - ١٠)، اختر الإجابة الصحيحة:


(٩) إذا كان طول قطر دائرة يساوي ٢٥ سم وطول أحد أوتارها ١٦ سم فإن البعد بين مركز الدائرة والوتر هو تقريرياً:

(د) ١٩,٢ سم

(ج) ١٨ سم

(ب) ٩,٦ سم

(أ) ٩ سم



(١٠) في الشكل المقابل العبارة الخاطئة فيما يلي هي:

(ب) $\text{ج} = \text{ب}$


(أ) $\text{ج} = \text{د}$

(د) $\text{ه} = \text{د}$


(ج) $\text{ج}^2 + \text{ه}^2 = \text{ب}^2$

المجموعة ب تمارين تعزيزية


(١) أوجد قيمة س في الأشكال التالية:




(ج)



(ب)



(أ)




(٢) مستخدماً الشكل المقابل، املأ الفراغ بما هو مناسب.


$$\therefore \text{أب} \leftrightarrow \text{منصف عمودي لـ جـدـ} .$$

$$\therefore \text{يمـرـ أـبـ بـ} \dots$$


(٣) أوجد قيمة س في كل من الأشكال التالية:




(ج)



(ب)



(أ)




(٤) في الشكل المقابل، أوجد قيمة س إلى أقرب جزء من عشرة.

(٥) طول نصف قطر دائرة يساوي ١٠، ٨ سم، وطول الوتر ١٢ سم.

ما البعد بين مركز الدائرة والوتر؟

(٦) في الشكل المقابل م، ن مركزاً دائرتين متطابقتين. طول نصف قطر كل دائرة يساوي ١٣ سم، لـ كـ وتر مشترك للدائرةتين، حيث $L ك = 24$ سم.



أوجد طول MN علماً بأن القطعة $L ك \cap M = \{و\}$.

الزوايا المركزية والزوايا المحيطية


Central Angles and Inscribed Angles

المجموعة ١ تمارين أساسية


(١) أوجد قيمة المجهول في كل من الأشكال التالية:




(ج)




(ب)



(أ)




(هـ)




(د)


(٢) أوجد قيمة المجهول في كل من الأشكال التالية بمعلومية أن الشعاع في كل رسم يمثل مماساً للدائرة.




(ج)



(ب)




(أ)



(٣) أوجد قياسات الزوايا والأقواس التالية مستخدماً الرسم المقابل:

(أ) $\angle(\hat{A})$.(ب) $\angle(\widehat{جـ})$.(ج) $\angle(\hat{جـ})$.(د) $\angle(\hat{ابـهـ})$.




(٤) في الشكل المقابل، أوجد قياس كل من:

(أ) القوس الأصغر \widehat{BG} .


(ب) $m(\widehat{B})$.

(ج) $m(\widehat{BGD})$.




(٥) في الشكل المقابل فيه الوتر AB .


أثبت أن: $m(\widehat{AC}) \cong m(\widehat{BD})$.



(٧) في الشكل المقابل أوجد $m(\widehat{CDB})$.



(٨) في الشكل المقابل، أوجد قياس القوس الأصغر \widehat{AB} .



* (٩) مستخدماً معطيات الشكل، حيث O هي مركز الدائرة،

$m(\widehat{NH}) = 2$ سم ، $m(\widehat{NO}) = 3$ سم.


أوجد:

(أ) $m(\widehat{HN})$.

(ب) $m(\widehat{L})$.

(١٠) في الشكل المقابل إذا كان \overrightarrow{AD} منصف الزاوية \hat{A} .

(أ) أثبت أن المثلث BGD متطابق الضلعين.




(ب) ماذا يمكننا أن نقول عن $\triangle BGD$ إذا كان $\triangle ABG$ قائم الزاوية في؟

(١١) مستخدماً معطيات الشكل المقابل حيث و مركز الدائرة:

(أ) ما نوع المثلث RLT ؟


(ب) أوجد $\angle RLT$.

(ج) أوجد محيط TRL بدلالة r .




(١٢) \overline{AB} قطر في دائرة مركزها O . \overline{JB} , \overline{JT} ماسان للدائرة يتقاطعان في J .

أثبت أن $\overline{AT} \parallel \overline{JG}$. (إرشاد: صل WT أو BT).



(١٣) في الشكل المقابل، $AB = 16$ سم، $WS = 6$. أوجد:


(أ) طول نصف قطر الدائرة؟




(ب) قياس القوس الصغير AMB .

المجموعة ب تمارين تعزيزية


(١) أوجد قياسات الزوايا والأقواس المجهولة في كل من الأشكال الهندسية التالية:




(ب)



(أ)




(د)




(ج)


(٢) أوجد قيمة المجهول في كل من الأشكال التالية بمعلومية أن الشعاع في كل شكل يمثل مماساً للدائرة.



(ب)




(أ)




(٣) في الشكل المقابل، أوجد قياس القوس الأصغر \widehat{AB} .

(٤) $\triangle ABC$ دائري (محوط بدائرة). $m(\hat{A}) = 70^\circ$, $m(\hat{B}) = 130^\circ$.
أوجد $m(\hat{C})$, $m(\hat{D})$.




(٥) $\triangle ABC$ متطابق الأضلاع تحيط به دائرة.

أثبت أن المماسات على الدائرة في النقاط A, B, C تشكل مثلثاً متطابقاً للأضلاع.




(٦) في الشكل المقابل، إذا كان $m(\hat{A}) = 72^\circ$, $m(\hat{B}) = 51^\circ$.
فإن قياس القوس EH =



- (أ) ٣٠ (ب) ١٠٢ (ج) ٧٢ (د) ٦٨

(٧) في الشكل المقابل، إذا كان $m(\hat{D}) = 140^\circ$ ، فإن $m(\hat{A}BC)$ =




- (أ) ٧٠ (ب) ٥٠ (ج) ٥٦ (د) ١٢٤

(٨) في الشكل المقابل، قيمة كل من س، ص على الترتيب هما:

- (أ) ٢٨٠، ١٤٠ (ب) ٧٠، ٣٥


(ج) ١٤٠، ٤٠ (د) ١٤٠، ٧٠




الدائرة: الأوتار المتقاطعة، الماس

Circle: Intersecting Chords and Tangent


المجموعة ١ تمارين أساسية




- (٢) في الشكل المقابل:
لـ كـ ماس الدائرة
 $لـ كـ = ٨$ ؛ $لـ مـ = ٤$.
أوجد: مـ نـ.





- (١) في الشكل المقابل:
 $جـ جـ = ٢٠$ ، $بـ جـ = ١٥$
 $هـ هـ = ٢٥$.
أوجد: دـ هـ.





في التمارين (٣-٤)، أوجد قيمة كل متغير.




في التمارين (٦-٥)، أوجد طول قطر كل دائرة.



في التمارين (٧-٨)، استخدم معطيات الشكل لإيجاد قيمة كل من سـ، صـ.






(٩) تحليل الخطأ: لإيجاد قيمة س كتب أحد الطلاب المعادلة التالية:

٥٧ × ٦ = س٢ . فما الخطأ الذي وقع به؟

(١١) في الشكل أدناه:

۳۸ = ج ۵، ۴۰ = د ۹، ۱۹ = پ


أوجد هب.




(١٠) \leftrightarrow مماس للدائرة عند ج

هـ متصرف الوتر مـ لـ

أثبت أن: $\overline{ML} // \overline{AP}$.




(١٢) قيمة س.



(١٣) في الشكل المقابل: \overleftarrow{AB} مماس للدائرة.


. ۱۲ = ج، ۱۰ = ه، ۸ = م

أو جد ج د.




(ب) أوجادا.


المجموعة ب تمارين تعزيزية




(٢) في الشكل أدناه:
 \overline{AB} مماس للدائرة
 $\angle A = 6$ ، $\angle B = 5$
أوجد $\angle A$ ، $\angle D$.



(١) في الشكل أدناه:
 $\angle BOD = 4$ ، $\angle AOB = 5$ ، $\angle AOD = 6$.
أوجد $\angle B$.




(٤)




(٣)

في التمرينين (٣-٤)، أوجد قيمة كل من س ، ص.




* (٥) أوجد طول قطر الدائرة،

استخدم الشكل المقابل للإجابة.



(٦) في الشكل المقابل، إذا كان $\angle AKE = 14$ ، $\angle BKE = 7$ ، $\angle ACF = 17$.
فأوجد $\angle DKC$.



(٧) في الشكل المقابل،
 \overline{AB} مماس للدائرة. $\angle ACD = 12$ ، $\angle BCD = 32$.
أوجد $\angle A$.


(٨) في الشكل المقابل، $\overline{بـهـ}$ ، $\overline{دـجـ}$ يتقاطعان في $ل$.

$\overleftarrow{جـبـ} \leftrightarrow \overleftarrow{هـدـ}$ يتقاطعان في $م$.

أثبت أن:


(أ) $لـجـ = لـهـ$ ، علماً بأن: $لـدـ = لـبـ$.

(ب) $بـجـ = دـهـ$ علماً بأن: $ابـ = دـ$ *




مراجعة الوحدة السادسة

في التمرينين (١-٢)، لنفرض أن الخطوط التي تبدو مماسة هي مماس للدائرة، أوجد قيمة س.




(٢)




(١)

في التمرينين (٣-٤)، أوجد قيمة س.




(٤)




(٣)


في التمرينين (٥-٦)، أوجد قياس القوس \widehat{AB} .




(٦)



(٥)




(٧) في الشكل المقابل، أوجد قيمة ز.




(٨) وتر في دائرة طوله ٢ ، ٤ سم ويبعد ٨ سم عن مركز الدائرة.
فما طول نصف قطر الدائرة؟


في التمارين (٩-١٢)، الخط الذي يبدو مماس هو مماس للدائرة أوجد قيمتي س، ص في كل مما يلي:



(٩)




(١٠)




(١١)


(١٢)




(١٣) في الشكل المقابل، أوجد قيمة س.




(١٤) في الشكل المقابل، أوجد قيمة $\widehat{B}\widehat{C}$.



(١٥) في الشكل المقابل، أوجد قيمة س.



(١٦) أوجد محيط المثلث $\triangle ABC$.



(١٧) أوجد $r(\hat{n})$.

(١٨) في الشكل المقابل، $\triangle ABC$ متطابق الأضلاع.

أوجد:

$r(\hat{M}AB)$.

$r(\hat{B}MC)$.

$r(\hat{M}CB)$.

$r(\hat{M}BG)$.

تمارين إثرائية


(١) (د)، (د') دائتان لهما نقطة ماس خارجية.

\leftrightarrow جـ قاطع يمر بالنقطة مـ ويقطع الدائرة (د)

بالنقطة بـ ويقطع الدائرة (د') بالنقطة جـ.

أثبت أن الماس من النقطة بـ للدائرة (د) موازٍ للماس


من النقطة جـ للدائرة (د').



(٢) (د)، (د')، (د'') ثلات دوائر متطابقة ومركزاها على الترتيب مـ، بـ، جـ.

تقاطع الدوائر الثلاث في النقطة المشتركة هـ.

ماذا تمثل النقطة هـ بالنسبة إلى المثلث مـبـجـ؟ اشرح.




(٣) $\triangle ABC$ مثلث. H مركز الدائرة المحيطة بالمثلث $\triangle ABC$

(نقطة تقاطع منصفات الزوايا الداخلية في المثلث $\triangle ABC$).


$$\angle BHC = 135^\circ.$$

أثبت أن المثلث $\triangle ABC$ قائم الزاوية في $\angle A$.




(٤) A, B, C, D نقاط على الدائرة مركزها O ، حيث $\angle AOB = \angle COD$.

أثبت أن: $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$.



(٥) في الشكل المقابل $\triangle ABC$ شبه منحرف متطابق الضلعين.

أثبت أنه رباعي دائري.



تنظيم البيانات في مصفوفات

Organising Data in Matrices

المجموعة ١ تمارين أساسية

في التمرينين (١-٢)، اذكر رتبة كل مصفوفة.

$$(1) \quad [5\ 7\ 2]$$

$$(2) \quad \begin{bmatrix} 2 & 2- & 4 \\ 1 & 4 & 1 \\ 7- & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

حدّد ما إذا كان زوج المصفوفات متساوياً أم لا. علّل إجابتك.

$$(3) \quad [647 \ 6- \ 167] , \begin{bmatrix} 4 \\ 6- \\ 8 \end{bmatrix}$$

اذكر رتبة (أبعاد) المصفوفة، مع ذكر العنصر $\underset{32}{\text{_____}}$.

$$(4) \quad \begin{bmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 7- & 3- & 2 \\ 9 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \underline{\underline{\text{_____}}}$$

(٥) أي زوج من المقادير التالية يحقق ما يلي: $[2 \ \text{س} \ \text{ص}] = [4 \ \text{ب}]$

$$\text{(ب)} \quad \text{س} = \frac{1}{2} + \text{ب} \quad \text{ص} = \frac{1}{2} - \text{ب}$$

$$\text{(أ)} \quad \text{س} = 42 \ , \ \text{ص} = \frac{1}{2} - \text{ب}$$

$$\text{(د)} \quad \text{س} = 42 \ , \ \text{ص} = \frac{1}{2} + \text{ب}$$


$$\text{(ج)} \quad \text{س} = \frac{1}{2} + \text{ب} \ , \ \text{ص} = \frac{1}{2} - \text{ب}$$

في التمرين (٦)، أوجد قيم كل من س، ص.

$$(6) \quad \begin{bmatrix} 4 & 9 \\ 5 & 2- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & \text{س}^2 \\ \text{ص}^2 & 2- \end{bmatrix}$$

(٧) يوضّح التمثيل البياني المبيعات في شهر أغسطس لإحدى المكتبات.

(أ) سجّل البيانات في جدول.



(ب) اعرض البيانات في مصفوفة. ماذا تمثل الأعمدة؟ والصفوف؟

$$(٨) تحليل الخطأ: حدد أحد الطلاب أن العنصر \begin{pmatrix} 4,5 & 2,5 & 3 \\ 3- & 5 & 1,5 \\ 1,5 & 4,5 & 4 \end{pmatrix} \text{ هو } -3 \text{ في المصفوفة: } \begin{pmatrix} 3 & 12 \\ 19+4\text{ص} & 5 \end{pmatrix} \text{ ما خطأ الطالب؟}$$

في التمرينين (٩-١٠)، أوجد قيم المتغيرات بحيث تكون المصفوفتان متساويتين.

$$\begin{bmatrix} 3 & 12 \\ 19+4\text{ص} & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 5-\text{ص} \\ 10+\text{ص} & 5 \end{bmatrix} \quad (٩)$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 5-\text{ص} \\ 10+\text{ص} & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5-\text{ص} & 4\text{ص}-2 \\ 2-\text{ص} & 3-\text{ص} \\ 15 & 10-\text{ص} \end{bmatrix} \quad (١٠)$$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

في التمرينين (١-٢)، اذكر رتبة كل مصفوفة مما يلي:

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 9- \\ 5 \end{bmatrix} \quad (٢)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3- & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (١)$$

في التمرينين (٣-٤)، حدد ما إذا كان كل زوج من المصفوفات التالية متساوياً أم لا. علّل إجابتك.

$$\begin{bmatrix} (1, 5)2 & (1-2) \\ (0)2 & (2, 5)2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2- \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \quad (٣)$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 4- & 3- & 2- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2- & 4 \\ 4- & 3- \end{bmatrix} \quad (٤)$$

في التمرينين (٥-٦)، اذكر رتبة (أبعاد) كل مصفوفة، مع ذكر قيمة العنصر الموضّح.

$$_{٢١} \begin{bmatrix} 3- & 1 & 4- \\ 0 & 1- & 2 \end{bmatrix} = \underline{\underline{B}} \quad (٦)$$

$$_{٢٣} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \underline{\underline{P}} \quad (٥)$$

في التمرينين (٧-٨)، استخدم الجدول أدناه.

عدد التليفزيونات المستخدمة في إحدى الدول بالمليون

| النوع / السنة | ١٩٩٣ | ١٩٩٠ | ١٩٨٧ | ١٩٨٤ | ١٩٨٢ | ١٩٨٠ |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| مليون | ٩٨ | ٩٦ | ٩٣ | ٨٨ | ٨٥ | ٨٢ |
| أبيض وأسود | ٢٠ | ٣١ | ٣٦ | ٤٣ | ٤٧ | ٥١ |

(٧) وضّح البيانات في صورة مصفوفة حيث الصفوف تمثل نوع التليفزيون، والأعمدة تمثل السنوات.

وأوجد $P_{٣٢}$. ماذا يمثل؟

(٨) اعرض البيانات في مصفوفة بصفوف تمثل السنوات، وأعمدة تمثل نوع التليفزيون.
أوجد $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ ، ووضح ماذا يمثل.

(٩) أوجد قيم كل من س، ص.

$$\begin{bmatrix} 4s - 6 & 4s + 5 \\ 4s + 5 & 4s + 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}$$

في التمرينين (١٠-١١)، أوجد قيم المتغيرات بحيث تكون المصفوفتان متساويتين.

$$\begin{bmatrix} 2s - 4 & 4 \\ 15 + 4k & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5s + 4 & s - 2 \\ 5 - 2k & 6 + l \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 - 2k & 11 \\ 3 & 2 & 8 - \\ 1 & 2 - m^3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4l & 3 - & 2 + 4s \\ 3 & 2 & -4s \\ 1 & 14 - & 1 - 2n \end{bmatrix} \quad (11)$$

جمع وطرح المصفوفات

Adding And Subtracting Matrices

المجموعة ١ تمارين أساسية

في التمرينين (١-٢)، أوجد ناتج كل مما يلي:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \quad (2)$$

في التمرينين (٣-٤)، استخدم الحساب الذهني أو الورقة والقلم أو الآلة الحاسبة لإيجاد الناتج:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 10 & 11 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 9 & 6 \\ 7 & 5 & 8 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 2 & 3 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 6 & 3 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \\ 7 & 6 \end{bmatrix} \quad (4)$$

في التمارين (٥-٩)، اذكر ما إذا كان الجمع أو الطرح ممكناً أو غير ممكן مع تفسير إجابتك:

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 0,33 \\ 0,15 & 7 \end{bmatrix} = \underline{\text{ب}} \quad , \quad \begin{bmatrix} 5 & 4 & \frac{1}{2} & 1 \\ 9 & 8 & \frac{3}{5} & 2 \end{bmatrix} = \underline{\text{پ}}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{11}{2} & \frac{7}{8} & 4 & 2 \\ \frac{10}{11} & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \underline{\text{د}} \quad , \quad \begin{bmatrix} 44 & 3 \\ 0 & 1 \\ 23,3 & 14 \end{bmatrix} = \underline{\text{ج}}$$

د + پ (٥)

$$\underline{\underline{ج}} + \underline{\underline{ب}} \quad (6)$$

$$\underline{\underline{ب}} + \underline{\underline{ج}} \quad (7)$$

$$\underline{\underline{ج}} - \underline{\underline{د}} \quad (8)$$

$$\underline{\underline{ب}} + \underline{\underline{ج}} \quad (9)$$

في التمارين (١٠-١٣)، أوجد س في كل مما يلي:

$$\begin{bmatrix} 8 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 6- \end{bmatrix} = \underline{\underline{s}} + \begin{bmatrix} 3- & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$\begin{bmatrix} 50 & 5 \\ 10- & 50 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 & 4 \\ 1- & 75 \end{bmatrix} - \underline{\underline{s}} \quad (11)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 5- \\ 2 & 0 & 2 \\ 3- & 5 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 9 & 5 & 0 \\ 3- & 8 & 12 \end{bmatrix} + \underline{\underline{s}} \quad (12)$$

$$\begin{bmatrix} 5 & 24 & 13 \\ 1 & 17- & 6- \end{bmatrix} - \underline{\underline{s}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 24- & 4 & 2 \end{bmatrix} \quad (13)$$

(١٤) تخليل البيانات: استخدم المعلومات في الجدول المقابل:

(أ) ضع البيانات في مصفوفتين. وميّز كل مصفوفة.

الشباب المختار لممارسة

الأنشطة في مركزين مختلفين

| عدد الإناث في المركز | عدد الذكور في المركز | |
|----------------------|----------------------|-----------------|
| ٥٧ | ٥٣ | الحاسوب |
| ٥٨ | ٥٤ | الأعمال اليدوية |
| ٢٩ | ٣٩ | رياضة بدنية |
| ٦٠ | ٤١ | سباحة |

(ب) استخدم الفقرة (أ) لإيجاد عدد الشباب (الذكور والإناث) المشترك في كل نشاط بجمع المصفوفتين.

(ج) أوجد عدد الذكور - عدد الإناث المشتركين في كل نشاط.

المجموعة ب تمارين تعزيزية

الحساب الذهني: في التمارين (١-٤)، أوجد ناتج كل مما يلي:

$$\begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & 3- & 2 \\ 7- & 6 & 5 \end{bmatrix} \quad (١)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 6 & 2- & 1 \end{bmatrix} \quad (٢)$$

$$\begin{bmatrix} 5- & \cdot \\ 2- & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & \cdot \\ 2 & 1- \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \quad (٣)$$

$$\begin{bmatrix} ٩,٥ & ٠,٥ \\ ٥,٥ & ٣,٥- \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} ٩,٥ & ٠,٥ \\ ٥,٥ & ٣,٥- \end{bmatrix} \quad (٤)$$

(٥) التصنيع: يوضح الجدول عدد كرات الشاطئ المنتجة في مصنعين ومستويات الإنتاج لفترة عمل واحدة. المصنع الأول يعمل فترتين كل يوم، والمصنع الثاني يعمل ثلاثة فترات.

| المصنع الثاني | | المصنع الأول | | |
|---------------|---------|--------------|---------|-------------|
| مطاط | بلاستيك | مطاط | بلاستيك | |
| ١٢٠٠ | ٤٠٠ | ٧٠٠ | ٥٠٠ | لون واحد |
| ١٦٠٠ | ٦٠٠ | ١٩٠٠ | ١٣٠٠ | ثلاثة ألوان |

(أ) اكتب مصفوفات تمثل الإنتاج اليومي لكُلّ مصنع.

(ب) استخدم النتائج من الفقرة (أ). أوجد ناتج طرح المنتج الكلي في المصنوع الثاني من المنتج الكلي في المصنوع الأول.

في التمارين (٦-٨)، استخدم الحساب الذهني أو الورقة والقلم لإيجاد ناتج كلٍّ مما يلي:

$$\begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 5 & 9 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$\begin{bmatrix} 6 & 2- & 0 \\ 6- & 5 & 5- \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5- & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 6 \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5- & 10 \\ 9- & 1 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 8 & 7- & 9 \\ 4- & 3- & 6 \end{bmatrix} \quad (8)$$

(٩) السؤال المفتوح: صنف موقفاً يتطلب جمع أو طرح معلومات مخزنة على صورة مصفوفات.

في التمارين (١٠-١٢)، اختر الحساب الذهني أو الورقة والقلم أو الآلة الحاسبة لإيجاد ناتج كلٍّ مما يلي:

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 5 & 4- & 3 \\ 2- & 0 & 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2- \\ 5 & 4- & 1 \\ 10- & 0 & 7 \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & 8 \\ 7 & 6- & 5 \\ 1- & 2 & 2- \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 1 & 9- \\ 9- & 0 & 5- \\ 3 & 2- & 2 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad (12)$$

في التمارين (١٣-١٦)، اذكر ما إذا كان الجمع أو الطرح ممكناً أو غير ممكناً:

$$\begin{bmatrix} 2- & 1 \\ 4 & 0,33 \\ 0,10 & 7- \end{bmatrix} = \underline{\underline{ب}} , \quad \begin{bmatrix} 0 & 4 & \frac{1}{2} & 1 \\ 9 & 8 & \frac{3}{5} & 2 \end{bmatrix} = \underline{\underline{ب}}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{11}{2} & \frac{7}{8} & 4- & 2- \\ \frac{10}{11}- & 1- & 2 & 3 \end{bmatrix} = \underline{\underline{د}} , \quad \begin{bmatrix} 44 & 3 \\ 0 & 1 \\ 23,3 & 14 \end{bmatrix} = \underline{\underline{ج}}$$

(١٣) $\underline{\underline{ب}} - \underline{\underline{ج}}$

(١٤) $\underline{\underline{د}} + \underline{\underline{ب}}$

(١٥) $\underline{\underline{ج}} + \underline{\underline{ب}} + \underline{\underline{ج}}$

(١٦) $\underline{\underline{د}} + (\underline{\underline{ج}} - \underline{\underline{د}})$

في التمارين (١٧-٢٠)، أوجد s في كل مما يلي:

$$\begin{bmatrix} 6- & 5 \\ 0 & 1 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} = \underline{\underline{s}} + \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 4 & 3- \end{bmatrix} \quad (١٧)$$

$$\begin{bmatrix} 13- & 3 & 11 \\ 8 & 9- & 15 \end{bmatrix} = \underline{\underline{s}} - \begin{bmatrix} 1- & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad (١٨)$$

$$\begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 2- & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 2- & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \underline{\underline{s}} \quad (١٩)$$

$$\begin{bmatrix} 20 & 14 \\ 0 & 5- \\ 19- & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 12 \\ 28 & 17 \\ 2 & 3- \end{bmatrix} + \underline{\underline{s}} \quad (٢٠)$$

ضرب المصفوفات

Matrices Multiplication

المجموعة ١ تمارين أساسية

في التمارين (١-٣)، أوجد ناتج ضرب كلّ مما يلي:

$$\begin{array}{c} \text{_____} \\ \left[\begin{array}{cc} 0 & 1 \\ -3 & 2 \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} 4 & -3 \\ 2 & 5 \end{array} \right] \end{array} \quad (1)$$

$$\begin{array}{c} \text{_____} \\ \left[\begin{array}{c} -3 \\ 5 \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} 0 & -3 \end{array} \right] \end{array} \quad (2)$$

$$\begin{array}{c} \text{_____} \\ \left[\begin{array}{cc} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} 0 & -1 \\ 5 & -1 \\ 3 & 0 \end{array} \right] \end{array} \quad (3)$$

(٤) أوجد رتبة مصفوفة الضرب، ثم أوجد الناتج.

$$\begin{array}{c} \text{_____} \\ \left[\begin{array}{cc} -1 & 2 \\ 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{array} \right] \left[\begin{array}{ccc} 2 & 7 & 5 \\ 6 & 3 & \frac{4}{5} \\ 4 & \frac{2}{3} & 0 \end{array} \right] \end{array}$$

في التمارين (٥-٩)، حدد ما إذا كان الضرب معروفاً أم لا.

$$\left[\begin{array}{cc} 7 & 0 \end{array} \right] = \underline{\text{د}} \quad \left[\begin{array}{c} 5 \\ 6 \end{array} \right] = \underline{\text{ج}} \quad \left[\begin{array}{cc} 6 & -3 \\ 4 & 2 \end{array} \right] = \underline{\text{ب}} \quad \left[\begin{array}{cc} 3 & 2 \\ 9 & 6 \end{array} \right] = \underline{\text{ه}}$$

$$\underline{\text{ه}} \times \underline{\text{ب}} \quad (5)$$

$$\underline{\text{ج}} \times \underline{\text{ب}} \quad (6)$$

$$\underline{\text{ج}} \times \underline{\text{ب}} \quad (7)$$

$$\underline{\text{د}} \times \underline{\text{ب}} \quad (8)$$

$$\underline{\text{د}} \times \underline{\text{ج}} \quad (9)$$

في التمارين (١٠-١٢)، أوجد ناتج ضرب كلّ مما يلي:

$$\begin{bmatrix} 4 & 1- \\ 5 & 2 \end{bmatrix}^2 \quad (10)$$

$$\begin{bmatrix} 14 & 3 \\ 4- & 7 \end{bmatrix} \cdot , 5 \quad (11)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1- \\ 1- & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1- & 0 \end{bmatrix} \quad (12)$$

(١٣) الاختيار من متعدد: تبيّن الأعمدة في المصفوفة \underline{M} بالترتيب، عدد الماحي وعدد الأقلام المباعة. وتبيّن الصفوف بالترتيب الأعداد المباعة يومي الاثنين والثلاثاء.

تبّين المصفوفة \underline{B} = $\begin{bmatrix} 0,050 \\ 0,025 \end{bmatrix}$ ، كلفة كل من الممحاة والقلم. ناتج $\underline{M} \times \underline{B}$ يمثل:

(أ) ثمن كل الماحي المباعة يومي الاثنين والثلاثاء، وثمن الأقلام في هذين اليومين.

(ب) مجموع ثمن الماحي والأقلام يوم الاثنين، ومجموع ثمنها يوم الثلاثاء.

(ج) مجموع ثمن الأقلام والماحي.

(د) ثمن قلم واحد وممحاة واحدة

في التمارين (١٤-١٧)، استخدم المصفوفات \underline{D} ، \underline{W} ، \underline{F} .نفذ العمليات المطلوبة إذا كانت معروفة. وإذا كانت إحدى العمليات غير معروفة فاكتب «غير معروفة».

$$\begin{bmatrix} 2 & 3- \\ 1 & 5- \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \underline{F}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 5- & 2 \\ 2- & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \underline{W}, \quad \begin{bmatrix} 1- & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2- & 1- & 2 \end{bmatrix} = \underline{D} \quad (14) \underline{D} \times \underline{W}$$

(١٥) $(\underline{D} \times \underline{W}) \times \underline{F}$

$$(16) \underline{d} - 2 \times \underline{w}$$

$$(17) \underline{(d \times 2) \times 3} = \underline{f}$$

(18) تعرّض شركة تبيع الخردوات في محلاتها الأسعار في مصفوفة من الرتبة 3×3 ومبيعات المحال الثلاثة اليومية في مصفوفة من الرتبة 3×3 .

| المحل ج | المحل ب | المحل أ | مطرقة | منبه ضوئي | قنديل | مطرقة | منبه ضوئي | قنديل |
|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| ٨ | ٩ | ١٠ | | | | | | |
| ٦ | ١٤ | ٣ | منبه ضوئي | ٥٠٠ دينار | ٧٠٠ دينار | ٣٠٠ دينار | ٠ دينار | ٠ دينار |
| ٧ | ٥ | ٢ | قنديل | | | | | |

(أ) أوجد ناتج ضرب المصفوفتين. اشرح ما الذي يمثله.

(ب) كيف يمكن إيجاد المبيع العام في المحال الثلاثة؟

(ج) أوجد مبيع المنبهات الضوئية في المحال الثلاثة.

(19) السؤال المفتوح: اكتب مصفوفتين S ، C من الرتبة 2×2 ليست كل العناصر متساوية بحيث يكون $S \times C = C \times S$.

$$(20) \text{ أوجد قيمة كل من } S \text{ ، } C: \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -C & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2^S \end{bmatrix}$$

في التمارين (٢١)، استخدم المصفوفات $\underline{ب}$ ، $\underline{ج}$ ، $\underline{ب} + \underline{ج}$ ، حدد ما إذا كان التعبيران في الزوج التالي متساوين.

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2- \end{bmatrix} = \underline{ج}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1- \\ 2- & 2 \end{bmatrix} = \underline{ب}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \underline{ب} + \underline{ج}$$

(٢١) $\underline{ب} + \underline{ج} = \underline{ب} \times \underline{ج} + \underline{ب} \times \underline{ج}$.

(٢٢) إذا كانت $\underline{م} \times \underline{n} = \underline{n} \times \underline{م}$ ؟ فسر.

(٢٣) أي ضرب مما يلي غير معروف؟

$$[2 \ 1-] \begin{bmatrix} 2 & 1- \\ 2 & 1- \end{bmatrix} \text{(ب)}$$

$$[2 \ 1-] \begin{bmatrix} 1- \\ 2 \end{bmatrix} \text{(أ)}$$

$$\begin{bmatrix} 1- \\ 2 \end{bmatrix} [2 \ 1-] \text{(د)}$$

$$\begin{bmatrix} 1- & 2 \\ 1- & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1- \\ 2 & 1- \end{bmatrix} \text{(ج)}$$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

في التمارين (١-٤)، أوجد ناتج ضرب كل مما يلي:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4- \end{bmatrix} \text{(١)}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 3- \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 3- \end{bmatrix} \text{(٢)}$$

$$\begin{bmatrix} 4- & 7- & 9 \\ 3 & 2- & 8- \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1- \end{bmatrix} \text{(٣)}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1- \\ 1 & 1- & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1- \\ 1- & 0 \end{bmatrix} \text{(٤)}$$

في التمارين (٥-٩)، حدد ما إذا كان الضرب معرفاً أم لا مع تفسير إجابتك.

$$\begin{bmatrix} 7 & 0 \end{bmatrix} = \underline{d} \quad \begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix} = \underline{ج} \quad \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \underline{ب} \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} = \underline{م}$$

$$\underline{م} \times \underline{ب} \quad (5)$$

$$\underline{م} \times \underline{ج} \quad (6)$$

$$\underline{ب} \times \underline{ج} \quad (7)$$

$$\underline{م} \times \underline{د} \quad (8)$$

$$\underline{ج} \times \underline{د} \quad (9)$$

في التمارين (١٠-١٣)، استخدم المصفوفات \underline{d} ، $\underline{و}$ ، \underline{n} ثم نفذ العمليات المطلوبة إذا كانت معرفة. وإذا كانت إحدى العمليات غير معرفة فاكتب «غير معرفة».

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} = \underline{n} \quad \begin{bmatrix} 0 & 5 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \underline{و} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \underline{م}$$

$$(11) \underline{d} \times (\underline{و} \times \underline{n}) \quad (10) \underline{م} \times \underline{ن} \times \underline{و}$$

$$(13) (\underline{د} \times \underline{م}) \times \underline{و} \quad (12) (\underline{م} - \underline{د}) \times \underline{n}$$

(١٤) الكتابة في الرياضيات: لنفرض أن المصفوفة $\underline{م}$ هي من الرتبة 2×3 والمصفوفة $\underline{ب}$ من الرتبة 3×2 . هل $\underline{م} \times \underline{ب}$ ، $\underline{ب} \times \underline{م}$ متساويان؟ اشرح تفكيرك.

(١٥) اكتب مصفوفة تمثل العائد اليومي للبطاقات المباعة مستخدماً الجدولين التاليين:

| درجة ٣ | درجة ٢ | درجة ١ | أسعار البطاقات بالدينار |
|--------|--------|--------|----------------------------|
| ٥ | ٦ | ٧ | |

| الخميس | الأربعاء | الثلاثاء | |
|--------|----------|----------|-----------------------------|
| ١٦٠ | ١٣٠ | ١٥٠ | عدد البطاقات المباعة درجة ١ |
| ١٧٥ | ١٣٠ | ١٢٥ | عدد البطاقات المباعة درجة ٢ |
| ٨٠ | ٥٢ | ٦٠ | عدد البطاقات المباعة درجة ٣ |

(١٦) أوجد قيمة كل من s ، c إذا كانت:

$$\begin{bmatrix} 9 & 4 \\ 6 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 2s & -c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & s^2 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

في التمرين (١٧)، استخدم المصفوفات A ، B ، H لتبيّن صحة العبارة.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = H \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = B \quad \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = A$$

$$A + B = H \times A + B \times H$$

مصفوفات الوحدة والنظير الضريبي (المعكوس)**Identity Matrices and Inverse Matrix****المجموعة ١ تمارين أساسية**

في التمارين (١-٢)، بين أن كل مصفوفة هي نظير ضريبي للمصفوفة الأخرى.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{1}{10} & \frac{1}{5} \\ \frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

في التمارين (٣-٥)، أوجد محدد كل مصفوفة.

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 2 & -6 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{5} \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

في التمارين (٦-٩)، أوجد النظير الضريبي لكل مصفوفة إن وجد، وإذا لم يوجد فاكتبه «لا يوجد نظير ضريبي» مع ذكر السبب.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6)$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 4 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$\begin{bmatrix} 8- & 6 \\ 4 & 3- \end{bmatrix} \quad (9)$$

في التمارين (١٠-١٢)، حل كل معادلة في س. وإذا كان من غير الممكن حلها، فاكتب السبب.

$$\begin{bmatrix} 1- & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = \underline{s} \times \begin{bmatrix} 7 & 12 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 4 \end{bmatrix} = \underline{s} \times \begin{bmatrix} 4- & 0 \\ 1- & 0 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$\begin{bmatrix} 16 & 31 \\ 12 & 27 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 7 \end{bmatrix} \times \underline{s} \quad (12)$$

في التمارين (١٣-١٥)، أوجد قيمة كل محدد.

$$\begin{vmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 4- \end{vmatrix} \quad (13)$$

$$\begin{vmatrix} 2 & \frac{1}{2}- \\ 8 & 2- \end{vmatrix} \quad (14)$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \quad (15)$$

في التمارين (١٦-١٧)، هل كل مصفوفة هي نظير ضربي للمصفوفة الأخرى؟ اشرح إجابتك.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2- \\ 4- & 10 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0, 5 & 2 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1- \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 & 3- \\ 8- & 6 \end{bmatrix} \quad (17)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 2- \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 4 & 3- \end{bmatrix} + \underline{s} \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} : (18) \text{ أوجد المصفوفة } s :$$

$$\begin{bmatrix} 27- & 19 \\ 24- & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3- & 0 \\ 4- & 5 \end{bmatrix} + \underline{s} \times \begin{bmatrix} 3- & 0 \\ 4- & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2- \\ 1- & 0 \end{bmatrix} : (19) \text{ حل المعادلة: } 2-$$

$$(20) \text{ إذا كانت } s \in \mathbb{C} \text{، فما قيمة } s \text{؟} \quad \begin{bmatrix} 2- & 1- \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \text{ ونظيرها الضري: } s \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1- & 3- \end{bmatrix} =$$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

بيان أن كل مصفوفة هي نظير ضربي للمصفوفة الأخرى.

$$\begin{bmatrix} 7 & 5- \\ 3 & 2- \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 & 3- \\ 5 & 2- \end{bmatrix} : (1)$$

في التمارين (٢-٤)، أوجد محدد كل مصفوفة.

$$\begin{bmatrix} 0 & 2- \\ 1- & 2 \end{bmatrix} : (4)$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1- \\ 2 & 5 \end{bmatrix} : (3)$$

$$\begin{bmatrix} 0,5 & 0 \\ 2 & 1,5 \end{bmatrix} : (2)$$

في التمارين (٥-٨)، أوجد النظير الضري لكل مصفوفة إذا وجد، وإذا لم يوجد فاكتبه «لا يوجد نظير ضري».

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} : (5)$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1,5- \\ 0,5- & 2,5 \end{bmatrix} : (6)$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$\begin{bmatrix} 2- & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix} = \underline{s} \times \begin{bmatrix} 3- & 5 \\ 2- & 4 \end{bmatrix} : \quad (9) \text{ أوجد } \underline{s} :$$

في التمرينين (١٠-١١)، أوجد قيمة كل محدد.

$$\begin{vmatrix} 10 & 3- \\ 20 & 6 \end{vmatrix} \quad (10)$$

$$\begin{vmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 3 \end{vmatrix} \quad (11)$$

(١٢) هل كل مصفوفة هي نظير ضربي للمصفوفة الأخرى؟ اشرح.

$$\begin{bmatrix} 2 & 2, 5- \\ 1- & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5- & 2- \\ 4- & 2- \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 3- & 4 \end{bmatrix} + \underline{s} \times \begin{bmatrix} 9- & 7- \\ 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 1 \\ 6- & 6 \end{bmatrix} : \quad (13) \text{ أوجد } \underline{s} :$$

(١٤) حل المعادلة:

$$\begin{bmatrix} 25 & 3 \\ 24 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26- & 2 \\ 18- & 3 \end{bmatrix} - \underline{s} \times \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6- & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

حل نظام من معادلتين خطيتين

Solving System of Two Linear Equations

المجموعة ١ تمارين أساسية

في التمرينين (١-٢)، اكتب نظام المعادلات التالية على شكل معادلة مصفوفية محددةً مصفوفة المعاملات ومصفوفة المتغيرات ومصفوفة الشوابت.

$$(1) \left\{ \begin{array}{l} س + ص = ٥ \\ س - ٢ ص = -٤ \end{array} \right.$$

$$(2) \left\{ \begin{array}{l} ٢ س + ٥ ص = ٠ \\ س + ص = ٢ \end{array} \right.$$

في التمرينين (٣-٤)، اكتب المعادلات المصفوفية التالية على شكل نظام معادلات.

$$(3) \left[\begin{array}{c} ١- \\ ٣ \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} س \\ ص \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{cc} ١ & ٣ \\ ٤ & ٢ \end{array} \right]$$

$$(4) \left[\begin{array}{c} ٥ \\ ٢- \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} س \\ ص \end{array} \right] \times \left[\begin{array}{cc} ٤ & ٢ \\ ٢- & ١- \end{array} \right]$$

في التمرينين (٥-٦)، استخدم النظير الضريبي للمصفوفة لحل نظام معادلات.

$$(5) \left\{ \begin{array}{l} س + ٣ ص = ٥ \\ س + ٤ ص = ٦ \end{array} \right.$$

$$(6) \left\{ \begin{array}{l} س - ٣ ص = ١- \\ ٥ س + ١٦ ص = ٥ \end{array} \right.$$

في التمارين (٦-٧)، بين ما إذا كان لنظام معادلات حلًّا وحيدًا أم لا.

$$\left. \begin{array}{l} ٢٤٠ = ٥س + ٢ص \\ ٠ = ٢٠س + ٣ص \end{array} \right\} \quad (٧)$$

$$\left. \begin{array}{l} ١٠ = ٣س + ٢ص \\ ١٦ = ٤س + ٦ص \end{array} \right\} \quad (٨)$$

$$\left. \begin{array}{l} ص = \frac{٢}{٣}س - ٣ \\ ٧ = س - ٣ص \end{array} \right\} \quad (٩)$$

في التمارين (١٠-١٢)، استخدم قاعدة كرامر لحل نظام معادلات.

$$\left. \begin{array}{l} ٤ = ٢س + ص \\ ٦ = ٣س - ص \end{array} \right\} \quad (١٠)$$

$$\left. \begin{array}{l} ٧ = ٢س + ص \\ ١ = ٥س + ٢ص \end{array} \right\} \quad (١١)$$

$$\left. \begin{array}{l} ص = \frac{س}{٤} + \frac{٢}{٤}س \\ ٢ = \frac{س}{٤} - \frac{٣}{٨}ص \end{array} \right\} \quad (١٢)$$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

في التمارين (١-٢)، اكتب نظام المعادلات التالية على شكل معادلة مصفوفية، محددًا مصفوفة المعاملات ومصفوفة المتغيرات ومصفوفة الثوابت.

$$\left. \begin{array}{l} ٧ = ٣س - ص \\ ٢ = ص \end{array} \right\} \quad (١)$$

$$\left. \begin{array}{l} ١١ = س + ٢ ص \\ ١٨ = س + ٣ ص \end{array} \right\} \quad (٢)$$

في التمرينين (٤-٣)، استخدم النظير الضريبي للمصفوفة لحل نظام المعادلات.

$$\left. \begin{array}{l} ١٢ = س + ٣ ص \\ ٧ = س + ٢ ص \end{array} \right\} \quad (٣)$$

$$\left. \begin{array}{l} ٥ = س + ٣ ص \\ ٦ = س + ٢ ص \end{array} \right\} \quad (٤)$$

في التمرينين (٥-٦)، حل المعادلة المصفوفية إن أمكن:

$$\left[\begin{array}{c} ٨ \\ ١٠ \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} س \\ ص \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} ١ & ١ \\ ٢ & ١ \end{array} \right] \quad (٥)$$

$$\left[\begin{array}{c} ١ \\ ٢ \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} س \\ ص \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} ٣- & ٢ \\ ٦ & ٤- \end{array} \right] \quad (٦)$$

في التمرينين (٧-٨)، استخدم قاعدة كرامر لحل نظام معادلات.

$$\left. \begin{array}{l} ٧ = س + ٥ , ٥ + ص \\ ٩- = س - ٥ , ٥ - ص \end{array} \right\} \quad (٧)$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{س}{٥} - \frac{ص}{٥} = ٤ \\ \frac{س}{٥} - \frac{ص}{٥} = ٢ \end{array} \right\} \quad (٨)$$

- (٩) ينتج أحد المصانع أقلام رصاص ومحاجي. يبلغ ثمن علبة تحتوي على ٥ محاجي وقلمي رصاص ١٥٠٠ فلس. ويبلغ ثمن علبة أخرى تحتوي على ٧ محاجي و٥ أقلام ٢٦٥٠ فلسًا. أوجد ثمن المحاجة وثمن القلم مستخدماً النظير الضريبي للمصفوفة.

مراجعة الوحدة السابعة

(١) يبيّن الجدول درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة في ست مناطق.

| المنطقة | الدرجة العظمى | الدرجة الصغرى |
|---------|---------------|---------------|
| ١ | ٥٣٠ | ٥٣٧- |
| ٢ | ٥٤٠ | ٥٣٣- |
| ٣ | ٥٤٢ | ٥١٤- |
| ٤ | ٥٣٧ | ٥١- |
| ٥ | ٥٣٩ | ٥٢٨- |
| ٦ | ٥٤٤ | ٥٢- |

(أ) اعرض البيانات في مصفوفة (في كل صف الدرجة العظمى والدرجة الصغرى لمنطقة). ما أبعاد هذه المصفوفة؟

(ب) حدد Δ_{24}

في التمرينين (٢-٣)، أوجد الناتج.

$$\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 9 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} \quad (٢)$$

$$\begin{bmatrix} 18 & 7 & 22 \\ 11 & 15 & 5 \\ 17 & 14 & 12 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 16 & 13 & 1 \\ 19 & 3 & 24 \\ 20 & 10 & 9 \end{bmatrix} \quad (٣)$$

في التمارين (٤-٧)، أوجد ناتج ضرب كل مما يأتي إن أمكن مع ذكر السبب.

$$\left[\begin{array}{cc} 4 & 2 \\ 6 & 1 \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 4 & 7 \end{array} \right] \quad (4)$$

$$\left[\begin{array}{cc} 10 & 3 \\ 4- & 21 \end{array} \right] \quad (5)$$

$$\left[\begin{array}{ccc} 0 & 4 & 2 \\ 8 & 0 & 5- \end{array} \right] \left[\begin{array}{ccc} 6 & 15 & 9 \\ 7 & 2 & 8- \\ 1 & 8- & 63 \end{array} \right] \quad (6)$$

$$\left[\begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{array} \right] \left[\begin{array}{cc} 2 & 3 \\ 0 & 0 \end{array} \right] \quad (7)$$

في التمارين (٨-٩)، أوجد محدد كل مصفوفة.

$$\left[\begin{array}{cc} 7- & 6- \\ 8 & 5 \end{array} \right] \quad (8)$$

$$\left[\begin{array}{cc} 5- & 1 \\ 9 & 2- \end{array} \right] \quad (9)$$

في التمارين (١٠-١١)، أوجد النظير الضريبي لكل مصفوفة إن أمكن مع ذكر السبب.

$$\left[\begin{array}{cc} 2 & 6 \\ 2 & 3 \end{array} \right] \quad (10)$$

$$\left[\begin{array}{cc} 8 & 7 \\ 16- & 14- \end{array} \right] \quad (11)$$

في التمارين (١٢-١٧)، حل في س.

$$\left[\begin{array}{c} 3 \\ 2 \end{array} \right] = \underline{s} \times \left[\begin{array}{cc} 4 & 3 \\ 1- & 1- \end{array} \right] \quad (12)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \underline{s} - \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 8 \\ 1 & 3 & 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} + \underline{s} \quad (14)$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} = \underline{s} \times \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (15)$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 10 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}^3 + \underline{s}^4 \quad (16)$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 8 & 8 \end{bmatrix} \frac{1}{4} = \underline{s}^2 \quad (17)$$

$$(18) \text{ حل النظام: } \begin{cases} 2s - c = 2 \\ 2s - 2c = 4 \end{cases} \text{ مستخدماً النظير الضري.}$$

$$(19) \text{ حل النظام: } \begin{cases} -3s + 5c = 4 \\ s - 3c = 4 \end{cases} \text{ مستخدماً طريقة كرامر.}$$

(20) اكتب مصفوفتين A، B كل منها من الرتبة 2×2 .

أثبت أن ضرب المصفوفات هو غير إيدالي.

(21) هل كل مصفوفة مما يلي هي النظير الضري للأخرى؟

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

(٢٢) اشتريت ١٠ قرنفلات و ٥ أقحوانات بمبلغ ١٢,٥٠٠ ديناراً. وبعد ظهر اليوم نفسه اشتريت ٥ قرنفلات و ٨ أقحوانات بمبلغ ١١,٧٥٠ ديناراً.
فما سعر القرنفلة الواحدة والأقحوانة الواحدة باستخدام المصفوفات؟

تمارين إثرائية

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} = \underline{B}, \quad \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \underline{M} \text{ لنتعرف}$$

(أ) هل للمصفوفات: \underline{M} , \underline{B} , $\underline{M} + \underline{B}$ نظير ضربي؟

(ب) أوجد \underline{M}^{-1} , \underline{B}^{-1} , $(\underline{M} + \underline{B})^{-1}$.

(ج) وضح ما إذا كانت العبارة التالية صحيحة:

إذا كانت \underline{M} , \underline{B} مصفوفتان ذات نظير ضريبي، $\underline{M} + \underline{B}$ هي مصفوفة ذات نظير ضريبي فإن:

$$\underline{M} + \underline{B} = \underline{B} + \underline{M}.$$

(د) أعط مثلاً عن مصفوفتين ذات نظير ضريبي شرط ألا يكون لمصفوفة مجموعهما نظيرًا ضريبيًا.

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = \underline{B}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \underline{M} \text{ لنتعرف}$$

(أ) أوجد $\underline{M} + \underline{B}$, ثم $(\underline{M} + \underline{B})^{-1}$.

(ب) أوجد $\underline{M}^{-1} \times \underline{B}$, $\underline{B}^{-1} \times \underline{M}$. قارن بين إجابتك في (ب)، (أ).

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \underline{B} \text{ طبق الخطوتين (أ)، (ب) باستخدام } \underline{B}$$

(٣) إذا طرحتنا ثلاثة أمثال عمر ربيع من مثلي عمر جاد نحصل على ٥. أما إذا طرحتنا ثلاثة أمثال عمر جاد من خمسة

أمثال عمر ربيع نحصل على -٢.

(أ) مثل المسألة أعلاه على شكل نظام معادلتين من متغيرين.

(ب) اكتب نظام معادلات على شكل معادلة مصفوفية: $\underline{M} \times \underline{s} = \underline{b}$,

حيث \underline{M} هي مصفوفة مربعة من الرتبة 2×2 ، \underline{s} = $\begin{bmatrix} s \\ \underline{c} \end{bmatrix}$ ، \underline{b} من الرتبة 2×1 .

(ج) أوجد محدد المصفوفة \underline{M} . هل للمصفوفة \underline{M} نظير ضربي؟ إذا كان لها نظيرًا ضربيًا فأوجد \underline{M}^{-1} .

(د) أوجد قيم s ، c باستخدام \underline{M}^{-1} .

(هـ) حل نظام معادلات مستخدماً قاعدة كرامر.

(٤) لنأخذ المصفوفات التالية:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & : \\ 0 & : & 0 \end{bmatrix} = \underline{M}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & : \end{bmatrix} = \underline{W}$$

(أ) احسب \underline{M}^2 ، \underline{M}^3 .

(ب) لكل عدد حقيقي s ، تعتبر المصفوفة $M(s)$ ، حيث إنّ:

$$M(s) = W + s M - \frac{s}{2} M^2.$$

$$\begin{bmatrix} \frac{s}{2} & s & 1 \\ s & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = M(s).$$

1. تتحقق من أنّ: $M(s) =$

2. احسب: $M(0)$ ، $M(4)$.

3. s ، c عدادان حقيقيان، احسب $M(s) \times M(c)$.

4. برهن أنّ: $M(s) \times M(c) = M(s+c)$.

(٥) التفكير الناقد: لتكن \underline{A} ج د ب أ ما هي قيم العناصر A ، B ، C ، D عندما يكون النظير الضري

لل一趟وفة \underline{M} هو \underline{M}^{-1} ؟ (مساعدة: هناك أكثر من إجابة صحيحة واحدة).

دائرة الوحدة في المستوى الإحداثي

The Unit Circle in the Coordinate Plane

المجموعة ١ تمارين أساسية

(١) أكمل الجدول أدناه.

| القياس بالراديان | القياس بالدرجات |
|------------------|-----------------|
| | ٥٤٥ |
| $\frac{\pi}{4}$ | |
| $\pi -$ | |
| | ١٥٠- |
| | ٢٢٥- |
| $\frac{\pi}{6}$ | |

(٢) اذكر النقطة المثلثية للزاوية التي قياسها 30° ، ثم أوجد كلاً من:

(أ) جا 30°


(ب) جتا 30°

(ج) ظا 30°


(د) ظتا 30°

(هـ) قا 30°


(و) قتا 30°



في التمارين (٣-٤)، باستخدام دائرة الوحدة أوجد جيب تمام الزاوية وجيب الزاوية لكل من:



٠٢٢٥ (٤)



٠٦٠ - (٣)

في التمارين (٥-٧)، بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد جيب تمام، جيب، ظل الزاوية على الترتيب لكلّ من الزوايا التالية:

$\frac{\pi}{4}$ (٥)

٠٦٠ (٦)

٠٠ (٧)

في التمارين (٨-١١)، في أيّ ربع أو على أيّ محور يقع الضلع النهائي لكلّ من الزوايا التالية:


٠١٥٠ (٨)

$\pi -$ (٩)

٠٦٠ - (١٠)

$\frac{\pi\sqrt{3}}{6}$ (١١)

(١٢) (أ) أكمل الفراغ في الرسم أدناه.



(ب) افترض أن جتا θ سالبة جا θ موجبة. يقع الضلع النهائي للزاوية θ في:

- (أ) الربع الأول (ب) الربع الثاني (ج) الربع الثالث (د) الربع الرابع

(١٣) الكتابة في الرياضيات: فسر كيفية إيجاد حيب، حيب تمام الزوايا التالية: ${}^{\circ}360$, ${}^{\circ}270$, ${}^{\circ}180$, ${}^{\circ}90$ بدون استخدام الآلة الحاسبة.

في التمارين (١٤-١٧)، ارسم كلاً من الزوايا الموجهة التالية في وضع قياسي، ثم عين زاوية الإسناد وأوجد قياسها.

$$\frac{\pi}{3}$$
 (١٥)

$${}^{\circ}210$$
 (١٤)

$$\frac{7\pi}{3}$$
 (١٧)

$${}^{\circ}170$$
 (١٦)

في التمرينين (١٨-١٩)، اختر الإجابة الصحيحة:

(١٨) الزاوية التي في الوضع القياسي وقياس زاوية إسنادها تختلف عن الزوايا الأخرى هي:

(أ) ${}^{\circ}190$ (ب) ${}^{\circ}170$

(ج) ${}^{\circ}350$ (د) ${}^{\circ}110$

(١٩) الزاوية التي في الوضع القياسي وضلوعها النهائي يمر بالنقطة M $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ التي تقع على دائرة الوحدة هي:

(أ) ${}^{\circ}45$ (ب) ${}^{\circ}225$

(ج) ${}^{\circ}135$ (د) ${}^{\circ}330$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

في التمارين (١-٤)، إذا كانت العبارة صحيحة ظلل **أ** وإذا كانت خاطئة ظلل **ب**.

- | | |
|----------|----------|
| ب | أ |

$$(1) \text{ جتا}(-^{\circ}300) = \frac{1}{2}$$

$$(2) \text{ جا}(-^{\circ}120) = \frac{1}{2}$$

$$(3) \text{ ظا}(-^{\circ}150) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$(4) \text{ قا}(-^{\circ}315) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

في التمارين (٥-٩)، اختر الإجابة الصحيحة:

(٥) الزاوية التي يقع ضلعها النهائي في الربع الرابع في ما يلي هي:

$$(ب) ^{\circ}270 - (أ) ^{\circ}320$$

$$(د) \frac{\pi}{9} - (ج) \frac{\pi}{3}$$

(٦) الزاوية التي في الوضع القياسي وقياس زاوية إسنادها مختلف عن الزوايا الأخرى هي:

$$(ب) ^{\circ}135 - (أ) \frac{\pi}{4}$$

$$(د) ^{\circ}210 - (ج) \frac{\pi}{4}$$

(٧) الزاوية التي في الوضع القياسي وقياس زاوية إسنادها $\frac{\pi}{3}$ هي:

$$(ب) ^{\circ}255 - (أ) \frac{\pi}{6}$$

$$(د) \frac{\pi}{3} - (ج) \frac{\pi}{8}$$

(٨) زاوية في الوضع القياسي قياسها يساوي $-^{\circ}225$. فإن النقطة المثلثية التي يمكن أن تقع على الضلع النهائي لهذه

الزاوية هي:

$$(ب) \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$(د) (-1, 1)$$

$$(أ) \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$(ج) \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$(٩) [جا(-^{\circ}135)] + [جتا(-^{\circ}135)] =$$

$$(ب) \frac{1}{2}$$

$$(د) صفر$$

$$(أ) 1$$

$$(ج) \frac{1}{4}$$

العلاقات بين الدوال المثلثية (١)

Relations Between Trigonometric Functions (1)

المجموعة ١ تمارين أساسية

(١) اكتب النسب المثلثية التالية بدلالة إحدى النسب المثلثية الأساسية للزاوية θ .

(أ) $\sin(\theta + \pi)$

(ب) $\sin(\theta - \pi)$

(ج) $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)$

(د) $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)$

(٢) اكتب النسب المثلثية بدلالة إحدى النسب المثلثية الأساسية للزاوية s .

(أ) $\sin(180^\circ - s)$

(ب) $\sin(180^\circ + s)$

(ج) $\sin(-s)$

(٣) استخدم ما تعلمته لكتابة النسب المثلثية التالية بدلالة إحدى النسب المثلثية الأساسية للزاوية θ .

(أ) $\sin(\theta + \pi)$

(ب) $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)$

(ج) $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)$

(د) $\sin(-\theta)$

(٤) أوجد قيمة النسب المثلثية التالية بدون استخدام الآلة الحاسبة.

(أ) $\text{جا } 150^\circ$

(ب) $\text{ظا}(0225)$

(ج) $\text{جتا}(0135)$

(٥) أوجد قيمة النسب المثلثية التالية بدون استخدام الآلة الحاسبة.

(أ) $\frac{\pi\sqrt{3}}{6}$

(ب) $\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2}\right)$

(ج) $\frac{\pi\sqrt{11}}{6}$

(٦) أوجد قيمة النسب المثلثية التالية بدون استخدام الآلة الحاسبة.

(أ) $\text{جا } 390^\circ$

(ب) $\text{قتا } 450^\circ$

(ج) $\frac{\pi\sqrt{17}}{4}$

في التمارين (١٠-٧)، ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة أو (ب) إذا كانت خاطئة.

(٧) إذا كانت $\text{جا } \theta = 2$ فإن $\text{جا}(\theta + \pi) = 0$

(٨) إذا كانت $\theta = \frac{2}{3}\pi$ فإن $\text{قا } \theta = \frac{3}{2}$

(٩) إذا كانت $\text{ظا } \theta = 3$ فإن $\text{ظا}(\theta + \pi) = 3$

(١٠) إذا كانت $\text{جا } \theta = \frac{1}{5}$ فإن $\text{قنا}(\theta + \pi) = 5$

(١١) بسط التعبيرات التالية لأبسط صورة:

(أ) $\text{جتا}(\pi - \theta) - \text{جتا}(-\theta) + \text{جا}(\theta + \pi) + \text{جا}(\theta - \pi)$

(ب) $\text{جا}(\pi + \theta) - \text{جتا}(\theta + \pi) + \text{جا}(\pi - \theta) + \text{جتا}(\theta - \pi)$

(١٢) حل المعادلات التالية:

(أ) جتا س = $\frac{1}{2}$

(ب) ظtas = $\sqrt[3]{7}$

(ج) ٢ جاس = $\sqrt[2]{7} +$

(د) جا(٤س) = $\frac{\sqrt[3]{7}}{2}$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) ظلل أ إذا كانت العبارة صحيحة أو ب إذا كانت خاطئة.

ب أ $\frac{3}{2} - = جاتا(-٠٩٦٠ + ٠١٢٣٠ - ٠٢٢٥)$

ب أ $٢ = \left(\frac{\pi}{6} \right) - جاتا \left(\frac{\pi}{3} + جا \right) - \left(\frac{\pi}{6} \right) - قاتا$

ب أ $١ = \left(\frac{\pi}{6} \right) - جاتا \left(\frac{\pi}{3} + جا \right) - \left(\frac{\pi}{6} \right) - ظاتا$

ب أ $٢٧ = جاتا(-٠٨٥٥ + ٠٥٨٥)$

(٢) ظلل أ إذا كانت العبارة صحيحة أو ب إذا كانت خاطئة.

ب أ $\text{إذا كان جاس} = \sqrt[3]{7} \quad \text{فإن مجموعة الحل} = \emptyset$

ب أ $\text{إذا كان جتس} = \frac{1}{2} \quad \text{فإن س} = \frac{\pi}{3}$

ب أ $\text{إذا كانت س} = \frac{1}{2} \quad \text{فإن جاس} = \frac{\pi}{6}$

ب أ $\text{مجموعة حل قاس} = ٣٠^\circ \text{ هي} \emptyset$

ب أ $\text{ظا}(\pi/15) = \text{صفر}$

في التمارين (٣-٥)، اختر الإجابة الصحيحة:

(٣) النسبة المثلثية في ما يلي التي قيمتها $\frac{1}{2}$ هي:

(أ) جا(-٠٣٣٠) (ب) جتا(-٠٢٤٠) (ج) ظتا(-٠١٥٠٠) (د) ظا(-٠٧٦٥)

(٤) النسبة المثلثية في ما يلي التي قيمتها $-\frac{\sqrt[3]{7}}{2}$:

(أ) جتا $\frac{\pi}{6}$ (ب) جا $\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{5} \right)$ (ج) ظا $\left(\frac{\pi}{6} \right)$ (د) قا $\frac{\pi}{3}$

(٥) إن قيمة المقدار $(\theta - \pi/2) - \text{قاتا}(\theta + \frac{\pi}{2}) + \text{جا}(\theta)$ هي:

(أ) ١ (ب) صفر (ج) $\frac{1}{2}$ (د) ١

العلاقات بين الدوال المثلثية (٢)

Relations Between Trigonometric Functions (2)

المجموعة ١ تمارين أساسية

(١) إذا كانت $\cot \theta = \frac{1}{5}$ ، $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.

فأوجد قيمة النسب المثلثية الأخرى للزاوية θ .

(٢) إذا كانت $\tan \theta = \sqrt{7}$ ، $0 < \tan \theta < \infty$.

أوجد $\cot \theta$ ، $\sin \theta$ ، $\cos \theta$.

(٣) إذا كانت $\sin \theta = \frac{1}{3}$ ، $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.

أوجد $\cot \theta$ ، $\tan \theta$.

في التمارين (٤-٧)، أوجد قيمة كلّ ما يلي:

$$(4) (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta)^2 - 2 \sin^2 \theta.$$

$$(5) (\tan^2 \theta + 1) \cos^2 \theta.$$

$$(6) 1 + \tan^2(\theta) - \sec^2 \theta.$$

$$(7) \frac{4}{\sec^2 \theta} - 5 \tan^2 \theta - \csc^2 \theta$$

في التمارين (٨-١١)، أثبت صحة المطابقات التالية:

$$(8) 1 + \cot^2(\theta) = \csc^2 \theta.$$

$$(9) \sec^2 \theta - \csc^2 \theta = \tan^2 \theta + \cot^2 \theta.$$

$$(10) 1 - \csc^2 \theta = (\sec^2 \theta)(1 + \cot^2 \theta).$$

$$(11) 3 \csc^2 \theta + 4 \sec^2 \theta = 3 \csc^2 \theta + \csc^2(3\theta).$$

المجموعة ب تمارين تعزيزية

في التمارين (٦-١)، ظلل **أ** إذا كانت العبارة صحيحة أو **ب** إذا كانت خاطئة.

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| <input type="radio"/> ب | <input type="radio"/> أ |
| <input type="radio"/> ب | <input type="radio"/> أ |
| <input type="radio"/> ب | <input type="radio"/> أ |
| <input type="radio"/> ب | <input type="radio"/> أ |
| <input type="radio"/> ب | <input type="radio"/> أ |
| <input type="radio"/> ب | <input type="radio"/> أ |

$$(١) \cot \theta \times \tan \theta - \tan \theta = 0$$

$$(٢) \tan^2(\theta) - \cot^2(\theta) = 1$$

$$(٣) (\cot \theta + \tan \theta)(\cot \theta - \tan \theta) = 1$$

$$(٤) \tan \theta - \cot^2 \theta - \tan^2 \theta = 0$$

$$(٥) \frac{\tan^2 \theta}{1 - \tan^2 \theta} - \frac{1}{\tan^2 \theta} = 1$$

$$(٦) \tan \theta + \cot \theta - \tan \theta \cot \theta = 0$$

في التمارين (٧-٨)، اختر الإجابة الصحيحة:

$$(٧) إذا كانت \tan \theta = -\frac{5}{7} ، \theta \text{ تقع في الربع الثالث. فإن } \cot \theta =$$

$$\frac{\sqrt{72}}{7} \quad (ب)$$

$$\frac{7}{\sqrt{72}} \quad (أ)$$

$$\frac{7}{\sqrt{72}} \quad (د)$$

$$\frac{\sqrt{72} - 7}{7} \quad (ج)$$

$$(٨) إذا كانت \cot \theta = \frac{3}{2} ، \theta \text{ تقع في الربع الرابع. فإن } \tan \theta =$$

$$\frac{2}{\sqrt{5}} \quad (ب)$$

$$\frac{\sqrt{5} - 2}{2} \quad (أ)$$

$$\frac{\sqrt{5} - 2}{2} \quad (د)$$

$$\frac{2 - \sqrt{5}}{2} \quad (ج)$$

في التمارين (٩-١٠)، أثبتت صحة المطابقات التالية:

$$(٩) \cot \theta (\tan \theta + \cot \theta) = \tan \theta$$

$$(١٠) \frac{1}{\tan \theta - \cot \theta} = \frac{\cot \theta}{\cot \theta - \tan \theta}$$

مراجعة الوحدة الثامنة

(١) في أيّ ربع أو على أيّ محور يقع الضلع النهائي لـ θ في الحالات التالية:

(أ) $\text{جا} \theta = \frac{1}{3}$.

(ب) $\text{قا} \theta = 1 -$.

(ج) $\text{ظا} \theta = 3 -$.

(د) $\text{جتا} \theta = \frac{7}{8} -$.

(٢) إذا كان $\text{ظا} \theta = 4$ فأوجد:

(أ) $\text{قا}^2 \theta$.

(ب) $\text{ظتا} \theta$.

(ج) $\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)$.

(د) $\text{قتا}^2 \theta$.

(٣) إذا كان $\text{جا} 8 \approx 0.38$ ، بدون استخدام الآلة الحاسبة بطريقة مباشرةً أوجد قيمة كل من:

(أ) $\text{جتا} 8 \approx$.

(ب) $\text{جا}(-0.52)$.

(ج) $\text{ظا}(142^\circ) - \text{جتا}(218^\circ) + \text{ظتا}(-0.38)$.

(٤) أوجد قيمة كل مما يلي:

(أ) $\text{قا}(-0.60) + \text{ظا}(0.60) - \text{ظتا}(0.210) + \text{قتا}(0.30)$.

(ب) $\text{جتا}\left(\frac{\pi\sqrt{3}}{2} + 2\right) + \text{جا}\left(\frac{\pi\sqrt{7}}{2} - \right)$.

(٥) أثبت صحة ما يلي:

$$(أ) \ cot^2 \theta - 2 \tan^2 \theta = \frac{1}{\tan^2(\theta - \alpha)}$$

$$(ب) \ \tan^2 \theta + \cot^2 \theta = \frac{\tan^2 \theta}{\cot^2 \theta} + 1$$

(٦) أثبت صحة المطابقات التالية:

$$(أ) \ \tan^4 \theta - \tan^2 \theta = \tan^2 \theta - \cot^2 \theta$$

$$(ب) \ \tan \theta (\cot \theta + \tan \theta) = \cot \theta$$

(٧) أوجد مجموعة حل المعادلات المثلثية التالية:

$$(أ) \ \tan s = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$(ب) \ 2 \tan s - \sqrt{3} = 0$$

$$(ج) \ \cot s = 1$$

تمارين إثرائية

(١) تفكير ناقد: افترض أن θ زاوية في الوضع القياسي،

$$\text{حيث } \text{جتا } \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \text{ جا } \theta = \frac{1}{2}.$$

هل من الممكن أن تكون $\theta = 60^\circ$ أو $\theta = 120^\circ$ ؟

(٢) أوجد قيمة كل مما يلي:

$$(أ) \text{ جا } 135^\circ + \text{جتا } 225^\circ - \text{ظا } (-225^\circ) + \text{جا } 330^\circ.$$

$$(ب) \text{ ظتا } 30^\circ + \text{ظا } 120^\circ - \text{ظا } 210^\circ + \text{ظتا } (-330^\circ).$$

$$(ج) \text{ جتا } \left(\frac{\pi 25}{3} \right) + \text{جتا } \left(\frac{\pi 15}{6} \right) + \text{جا } \left(\frac{\pi 17}{3} \right)$$

$$(د) \text{ ظا } \left(\frac{\pi 5}{4} \right) + \text{ظتا } \left(\frac{\pi 17}{4} \right) + \text{قتا } \left(\frac{\pi 19}{4} \right)$$

(٣) أوجد قيمة:

$$(أ) \text{ جا } 1^\circ + \text{جا } 2^\circ + \text{جا } 3^\circ + \dots + \text{جا } 358^\circ + \text{جا } 359^\circ.$$

$$(ب) \text{ جتا } 1^\circ + \text{جتا } 2^\circ + \text{جتا } 3^\circ + \dots + \text{جتا } 358^\circ + \text{جتا } 359^\circ.$$

(٤) حل المعادلات التالية:

$$(أ) \operatorname{جتا}(\frac{\pi}{4} + \operatorname{س}) = \operatorname{جتا}(\frac{\pi}{4} - \operatorname{س})$$

$$(ب) \operatorname{جا}(\frac{\pi}{6} - \operatorname{س}) = \operatorname{جا}(\frac{\pi}{3} - \operatorname{س})$$

$$(ج) \operatorname{جتا}(\operatorname{س} + \frac{\pi}{8}) = 1$$

$$(د) \operatorname{ظا}(\frac{\pi}{3} + 2\operatorname{س}) = \operatorname{ظنا}(2\operatorname{س})$$

(٥) أثبت صحة المتطابقة التالية:

$$\operatorname{جتا}(\theta_1 - \operatorname{جا}(\theta_2)) = \frac{\operatorname{جتا}\theta_1}{\operatorname{جتا}\theta_2} + \frac{\operatorname{جتا}\theta_2}{\operatorname{جتا}\theta_1}$$

(٦) أوجد مجموعة حل المعادلة المثلثية التالية، ثم مثّلها على دائرة الوحدة، حيث $\theta \in [0, \pi/2]$.

$$\operatorname{جا}^2 \theta = 4 - 7\operatorname{جا} \theta.$$

في التمارين (٧-٨)، أثبت صحة المتطابقات التالية:

$$(7) \operatorname{جتا}(\theta_1 + \operatorname{جتا}\theta_2) = \frac{\operatorname{جتا}\theta_1 + \operatorname{جتا}\theta_2}{\operatorname{جتا}\theta_1 \operatorname{جتا}\theta_2}$$

$$(8) \operatorname{جتا}(\theta_1 - \operatorname{جا}^2 \theta_2) = \frac{\operatorname{جتا}\theta_1 - \operatorname{جا}^2 \theta_2}{1 - \operatorname{ظا}^2 \theta_2}$$

في التمارين (٩-١٠)، حل المعادلات المثلثية التالية:

$$(9) \operatorname{ظنا}^2 \operatorname{س} + \operatorname{ظنا} \operatorname{س} = 0$$

$$(10) \operatorname{قا}^2 \operatorname{س} = 3\operatorname{قا} \operatorname{س} - 2$$

في التمارين (١١-١٥)، حل المعادلات التالية حيث $\theta \in (0, \pi/2)$ حيث المقام ≠ ٠ :

$$\text{ظا}^z = \frac{\theta}{\text{جتا}} \quad (11) *$$

$$\theta \text{ظا}^z \times \text{قا} = \frac{\theta}{\text{جتا}} \quad (12) *$$

$$\theta \text{قا} - \text{قتا} = \frac{\theta}{\text{ظتنا}} \quad (13) *$$

$$\theta \text{جتا}^2 + \text{جتا} \theta - 1 = 0 \quad \text{حيث جتا} > 0 \quad (14) *$$

$$1 = \theta \text{ظتا}^z \quad (15) *$$

المستوى الإحداثي Coordinate Plane

المجموعة ٤ تمارين أساسية

في التمرينين (١-٢)، أوجد المسافة بين كل زوج من النقاط التالية.

(١) (٩، ٧)، (٣، ٢)

(٢) (٧، ٢)، (٧، ٢)

في التمرينين (٣-٤)، أوجد إحداثي نقطة المتصل لكل من القطع المستقيمة التالية، بمعلومية إحداثيات طرفي القطعة المستقيمة.

(٣) (٥، ٢)، ب(٧، ٠)



(٤) س(٣، ١٤)، ص(١، ١٠)

في التمرينين (٥-٦)، أوجد أطوال أضلاع كل من المثلثات التالية بمعلومية إحداثيات رؤوسها. قرب الإجابة إلى أقرب جزء من عشرة.

(٥) م(٢، ٢)، ب(٦، ٣)، ج(٥، ٦)

(٦) م(١، ٥)، ن(٤، ٤)، ك(٢، ١)

- (٧) يقع منزل فيصل ٤ شرق ٢ شمال، ويقع نادي الرماية الذي ينتمي إليه فيصل ٢ غرب ٣ جنوب.
- (أ) عين على المستوى الإحداثي موقع منزل فيصل وموقع نادي الرماية.



كل وحدة طول على المحاور
تساوي ٢,٥ كيلومتر

- (ب) أوجد إحداثي نقطة المنتصف بين النادي ومنزل فيصل.

- (ج) أوجد المسافة بين منزل فيصل والنادي.

- (٨) تفكير ناقد. إذا كانت نقطة الأصل هي منتصف قطعة مستقيمة، فما هي الصفة التي سوف تتمتع بها إحداثيات طرف القطعة المستقيمة؟

- (٩) (أ) ما المسافة بين نقطة الأصل والنقطة (٤، ٣)؟


- (ب) أوجد ثلث نقاط أخرى تكون على المسافة نفسها من نقطة الأصل.

المجموعة ب تمارين تعزيزية

في التمارين (١-٥)، اختر من القائمة الأولى ما يناسب في القائمة الثانية لتحصل على عبارة صحيحة.

| القائمة الثانية | القائمة الأولى |
|-----------------|---------------------------------------|
| ٢ (أ) | المسافة بين النقطتين بالوحدات الطولية |
| ٣ (ب) | (١) (٣،٠)، (٤،٠) هي: |
| ٤ (ج) | (٢) (-٢،٠)، (٤،٢) هي: |
| ٥ (د) | (٣) (-٦،٣)، (٥،٦) هي: |


| القائمة الثانية | القائمة الأولى |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| (أ) $\left(5\frac{1}{2}, 5\right)$ | نقطة المنتصف \overline{AD} حيث |
| (ب) $\left(5\frac{1}{2}, -5\right)$ | (٤) (٩،-٢)، ب(-٢،١٢) هي: |
| (ج) $\left(5\frac{1}{2}, 7\right)$ | (٥) (١١،٢)، ب(٢،١٢) هي: |
| (د) $\left(5\frac{1}{2}, -7\right)$ | |



(٦) في الشكل المقابل أوجد طول \overline{AB} مقرّباً الإجابة إلى أقرب جزء من عشرة.

(٧) هندسة: في الشكل المقابل، $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ شبه منحرف.

(أ) أوجد إحداثيات نقاط المنتصف لكل من \overline{AB} ، \overline{CD} بحيث تكون على الترتيب م، ن.



(ب) أوجد طول \overline{MN} وطول \overline{PQ} وطول \overline{AD} .

ثم قارن بين طول \overline{MN} والمتوسط الحسابي لطولي \overline{PQ} ، \overline{AD} .

تقسيم قطعة مستقيمة

Dividing Line Segment

المجموعة ٤ تمارين أساسية

(١) أوجد إحداثي النقطة N التي تقسم \overline{AB} من الداخل من جهة A إذا علم أن:

(أ) $(4, -7), (5, -5)$ ، بـ $(8, -5)$ ونسبة التقسيم $1 : 2$.

(ب) $(6, -6), (2, -1)$ ونسبة التقسيم $1 : 3$.

(٢) أوجد إحداثي النقطة M التي تقسم \overline{AB} من الخارج من جهة B إذا علم أن:


(أ) $(2, -2), (5, -4)$ ، بـ $(2, -4)$ ونسبة التقسيم $2 : 5$.

(ب) $(1, -8), (3, -5)$ ، بـ $(1, -3)$ ونسبة التقسيم $1 : 3$.

(٣) بـ ج مثلث فيه: $A(-3, 3), B(3, 5), C(1, 7)$ أوجد:

(أ) إحداثيات متصفات أضلاع المثلث.

(ب) إحداثيا نقطة تقاطع متوسطاته.




المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) أوجد إحداثي النقطة N التي تقسم \overline{AB} من الخارج من جهة B إذا علم أن:

(أ) $(4, -6), (2, -3)$ ، بـ $(2, -4)$ ونسبة التقسيم $1 : 2$.

(ب) $(10, -10), (6, -10)$ ، بـ $(10, -6)$ ونسبة التقسيم $1 : 5$.




(٢) المستقيم الموضح بالشكل يقطع محوري الإحداثيات في النقطتين A ، B

على الترتيب. أوجد إحداثي م التي تقسم \overline{AB} من الداخل من جهة A بنسبة $2 : 1$.

(٣) A ، B ، C ، D أربع نقاط على الشكل التالي:

$A(1, 0)$ ، $B(4, 2)$ ، $C(6, 4)$ ، $D(4, 1)$.


(أ) أثبت أن $\triangle ABC$ متوازي الأضلاع.



(ب) أوجد إحداثي النقطة N ، حيث نقطة تقاطع القطرين في متوازي الأضلاع

ABC .

(ج) أوجد إحداثيات النقاط S ، C ، U ، L . حيث S ، C ، U ، L متوازي أضلاع له المركز نفسه « N » وأطوال أضلاعه تساوي $\frac{1}{2}$ أطوال أضلاع متوازي الأضلاع ABC ، حيث S ، C ، U ، L تتبع قطري متوازي الأضلاع ABC .



(٤) $\triangle ABC$ مثلث فيه $A(5, 2)$ ، $B(1, 3)$ ، $C(4, 1)$.

(أ) أوجد إحداثي النقطة N التي تقسم \overline{AB} من الداخل من جهة A بنسبة $1 : 3$.


(ب) أوجد إحداثي النقطة K التي تقسم \overline{BC} من الداخل من جهة B بنسبة $1 : 2$.

مِيل الخط المستقيم

Slope of a Straight Line

المجموعة ١ تمارين أساسية





(١) إن معدل التغير في الجدول أو الرسم أدناه ثابت. أوجد معدل التغير، وفسّر ماذا يعني كل معدل تغير في كل حالة مماثلٍ:



| الوقت (ساعة) | درجة الحرارة (مئوية) |
|--------------|----------------------|
| ١ | ١٩ |
| ٤ | ١٤ |
| ٧ | ٩ |
| ١٠ | ٤ |
| ١٣ | ١ |

(أ)

في التمارين (٢-٥)، أوجد ميل كل مستقيم إن أمكن مماثلٍ:



في التمارين (٦-٩)، أوجد ميل المستقيم إن أمكن المار بكل من أزواج النقاط التالية:

(٦) (٢،٣)، (٥،٢)

(٧) (٥،٦)، (٣،٢)

(٨) (٤،٣)، (٤،٣)

(٩) (٤،٣)، (٣،٤)

(١٠) أوجد ميل المستقيم الذي يصنع زاوية قياسها 60° مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.

(١١) أثبت أن المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية موجبة قياسها 45° يوازي المستقيم:

$y = x + 7$.

في التمارين (١٢-١٣)، أوجد نسبة التغير في كل حالة.



(١٢) يبلغ طول الرضيع ٤٥ سم بعد شهر من الولادة و٦٩ سم عندما يبلغ شهره العاشر.

(١٣) بلغ ثمن ٤ تذاكر للسينما ١٠ دنانير و ١٠ تذاكر ١٩ ديناراً.

في التمارين (١٤-١٥)، ارسم المستقيم المار بالنقطة المعطاة وميله المعطى كالتالي:

(١٥) ب (٢،٥)، الميل = $\frac{1}{2}$

(١٤) (٣،٥)، الميل = ٢



(١٦) أوجد نقطتين تقعان على مستقيم ميله $\frac{3}{4}$. ويمر بنقطة الأصل.


في التمارين (١٧-١٩)، أوجد قيمة كل من س، ص إذا كانت النقطتان على المستقيم مع المعطيات التالية:

(١٧) (س، ٣)، (٨، ٢)، الميل = $\frac{٥}{٢}$.

(١٨) (-٤، ص)، (٢، ٤)، الميل = ٦.

(١٩) (٣، ٥)، (٢، س)، الميل غير معرف.

(٢٠) هندسة: أوجد ميل كل ضلع في الشكل المقابل إن أمكن.



في التمارين (٢٤-٢٦)، ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة و (ب) إذا كانت العبارة خطأ.

(٢١) من الممكن أن يكون لستقيمين مختلفين الميل نفسه.

أ

ب

(٢٢) إن ميل المستقيم الذي يمر بالربع الثالث ونقطة الأصل هو دائمًا سالب.

أ

ب

(٢٣) لا يمر المستقيم الذي ميله يساوي صفرًا بنقطة الأصل.

أ

ب

(٢٤) نقطتين لديهما الإحداثي السيني نفسه، فإنها يتتميان إلى المستقيم الرأسى نفسه.

(٢٥) تخليل الخطأ: وجد سالم أن ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين (١، ٧)، (٩، ٣) يساوي: $\frac{١ - ٣}{٩ - ٧}$.

ما هو خطأ سالم؟

(٢٦) أوجد ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين (س، -ص)، (-س، -ص).

في التمارين (٢٧-٢٨)، حدد إن كانت مجموعة النقاط التالية تقع على استقامة واحدة.

(٢٧) (١، ٣)، ب(٤، ٢)، ج(-٤، ٢).

(٢٨) (٠، -١)، ب(٠، ٢)، ج(١، ٢).

(٢٩) أثبت أن المستقيم المار بال نقطتين $(-1, -1)$ ، $(-4, 5)$ عمودي على المستقيم المار بال نقطتين $(1, 0)$ ، $(4, 3)$.


المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) (أ) أوجد ميل المستقيم المار بال نقطتين $(4, -3)$ ، $(1, -5)$ مستخدماً $(س، ص)$ ، $ب(س، ص)$.

(ب) أوجد ميل المستقيم في (أ) مستخدماً $(س، ص)$ ، $ب(س، ص)$.

(ج) ماذا تلاحظ؟



(٢) إذا كان معدل التغير في الجدول أو الرسم أدناه ثابتاً. أوجد معدل التغير وفسّر ماذا يعني كل معدل تغير في كل حالة مما يلي:



(أ)

| سعر الوجبة (بالدينار) | عدد الأشخاص |
|-----------------------|-------------|
| ٤ | ٢ |
| ٦ | ٣ |
| ٨ | ٤ |
| ١٠ | ٥ |
| ١٢ | ٦ |

في التمرينين (٣-٤)، أوجد ميل كل مستقيم مما يلي:



في التمارين (٦-٥)، أوجد ميل المستقيم المار بكل من أزواج النقاط التالية:

$$(5) (-4, 4), (2, 5)$$


$$(6) (2, 1), (1, 2)$$

(7) أوجد ميل مستقيم موازٍ لمحور السينات.

(8) أوجد ميل مستقيم يصنع مع محور السينات زاوية قياسها 45° ويمر بنقطة الأصل.

في التمارين (٩-١١)، حدد ما إذا كان ميل المستقيم \overleftrightarrow{AB} يساوي صفرًا أم هو غير معرف.

(9)



$$(10) \left(\frac{1}{2}, 5 \right), \text{ ب } (3, 5)$$

$$(11) (1, 5), \text{ ب } (-1, 4)$$

(12) أوجد نقطتين تقعان على مستقيم ميله $-\frac{1}{3}$ ، ويمر بنقطة الأصل.

في التمارين (١٣-١٥)، أوجد قيمة س إذا مر المستقيم المعطى ميله بالنقطتين.


$$(13) (2, 4), (س, 8), \text{ الميل} = 2.$$

$$(14) (2, 4), (س, 8), \text{ الميل} = -\frac{1}{2}.$$

$$(15) (3, 4), (س, 7), \text{ الميل} = 2.$$

(16) هندسة: في الشكل المقابل أوجد ميل كل ضلع.

$$\begin{array}{c|c} \text{ميل } \overline{B\bar{J}} & \text{ميل } \overline{A\bar{B}} \\ = & = \\ \text{ميل } \overline{A\bar{D}} & \text{ميل } \overline{J\bar{D}} \\ = & = \end{array}$$



في التمارين (١٧-١٩)، ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة وظلل (ب) إذا كانت العبارة خطأ.

(ب)

(أ)

(ب)

(أ)

(ب)

(أ)

(١٧) معدل التغير دائماً موجباً أو يساوي صفر.


(١٨) كل المستقيمات الأفقية لها الميل نفسه.

(١٩) المستقيم الذي ميله يساوي ١ دائمًا يمر بنقطة الأصل.

(٢٠) يمثل الشكل المقابل رسم تأجير الأفلام نسبة إلى مدة التأجير.

(أ) أوجد ميل المستقيم. ماذا يمثل هذا العدد؟

(ب) أوجد المبلغ الذي سيدفعه الشخص لاستئجار فيلم مدة عشرة أيام.



(٢١) أوجد ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين (-س، ص)، (٣س، -ص)

في التمارين (٢٢-٢٣)، هل النقاط المعطاة تقع على استقامة واحدة؟

(٢٢) (٤، ٢)، ب(-٣، ٢)، ج(٢، ٥).

(٢٣) (١، ١)، ب(-٢، ١)، ج(٤، ٥).

(٢٤) أوجد ميل مستقيم متعمد مع المستقيم الذي يصنع زاوية قياسها 60° مع الاتجاه الموجب لمحور السينات.

معادلة الخط المستقيم

Equation of a Straight Line

المجموعة ١ تمارين أساسية


(١) أوجد معادلة الخط المستقيم إذا علم:

(أ) يمر بالنقطة $(5, 2)$ وميله $= 3$.


(ب) يمر بالنقطة $(-4, 2)$ وميله $= -2$.

(ج) يمر بالنقطة $(1, -1)$ وميله $= \frac{2}{3}$.


(٢) أوجد الصورة العامة لمعادلة المستقيم في كل من الأشكال التالية:



(ج)



(ب)



(أ)

(٣) أوجد الصورة العامة لمعادلة المستقيم الذي يمرّ بالنقطتين في كل من:

(أ) $(3, 5), (4, 7)$.

(ب) $(3, -4), (1, 7)$.

(٤) أوجد معادلة الخط المستقيم المار بالنقطة $(7, -1)$ والعمودي على الخط المستقيم: $3s + 2t = 1$.


(٥) أوجد معادلة المستقيم المتعامد مع المستقيم: $t = -2s + 4$ ويمر بالنقطة $(-3, 2)$.

(٦) أوجد معادلة المستقيم المتوازي مع المستقيم: $s = -\frac{1}{4}t + 17$ ويمر ب نقطة الأصل.


(٧) أوجد معادلة الخط المستقيم العمودي على المستقيم: $2s + c = 0$ ويمر بالنقطة (-١، ١).

المجموعة ب تمارين تعزيزية


(١) أوجد معادلة الخط المستقيم المرسوم في ما يلي:



(ج)




(ب)




(أ)

في التمارين (٢-٥)، أوجد معادلة كل مستقيم، ثم ارسمه:


(٢) مستقيم يمر بالنقطة (-٢، ١) وموازي للمستقيم: $c = -3s + 1$.




(٣) مستقيم يمر بالنقطة (-٣، -١) وعمودي على المستقيم: $c = -\frac{2}{5}s + 1$.



(٤) مستقيم أفقي يمر بالنقطة (١٠، ٧).



(٥) مستقيم رأسي يمر بالنقطة $\left(1, \frac{2}{7}\right)$.



(٦) أوجد معادلة المستقيم الذي يمرّ بال نقطتين: (٥، ٢)، (٠، ٣).

(٧) أوجد معادلة الخط المستقيم في كل ما يلي:

(أ) يمر ب نقطة الأصل و ميله ٧.

(ب) يمر ب نقطة الأصل و ب النقطة (٣، -٤).

(ج) يقطع من الجزء الموجب لمحور السينات جزءاً طوله ٣ وحدات، ومن الجزء الموجب لمحور الصادات جزءاً طوله ٥ وحدات.

(٨) أوجد الصورة العامة لمعادلة الخط المستقيم المار ب النقطة (٥، ٧) والموازي للمستقيم المار ب النقطتين (٣، ٤)، (٠، ٢).

البعد بين نقطة ومستقيم

Distance Between a Point and a Straight Line

المجموعة ٤ تمارين أساسية

في التمارين (٤-١)، معادلة المستقيم L : $2s - c + 3 = 0$

بيان ما إذا كانت النقطة تتبع إلى المستقيم L أم لا.

(٢) ب(٠،٠-٢)

(١) م(٠،٢-١)

(٤) د(١-٢،٠)

(٣) ج(٠،٤)

(٥) أوجد البعد بين النقطة ج(١،٢) والمستقيم: $3s - c - 1 = 0$

(٦) أوجد البعد بين نقطة الأصل والمستقيم: $2c - 3s = 0$

(٧) أوجد طول نصف قطر الدائرة التي مركزها و(١،٢) إذا كان المستقيم: $3s - 4c + 7 = 0$ يماس لها.

(٨) أوجد طول العمود المرسوم من النقطة (٣،٢) على المستقيم: $-2s + c - 4 = 0$

(٩) أوجد طول العمود المرسوم من النقطة (٧،٤) على المستقيم: $c - 5s + 1 = 0$

(١٠) أوجد طول العمود المرسوم من نقطة الأصل على المستقيم المار بال نقطتين (١،٥)، (٣،٧)

المجموعة ب تمارين تعزيزية

في التمارين (١-٣)، معادلة المستقيم ل: $ص - س + ١ = ٠$

بيّن ما إذا كانت النقطة تنتمي إلى المستقيم أم لا.

(١) (٣، ٣)

(٢) (٠، ٢)

(٣) (١، ٤)

(٤) أوجد طول العمود المرسوم من النقطة (٤، ٥) على المستقيم: $٣س + ٤ص = ٠$

(٥) أوجد طول العمود المرسوم من النقطة (٨، ٠) على المستقيم: $٥س + ١٢ص = ٠$

(٦) أوجد طول العمود المرسوم من النقطة (٢، ٧) على المستقيم المار بال نقطتين: (٣، ١)، (٥، ٣).

(٧) أوجد بعد النقطة (٤، ٤) عن المستقيم المار بنقطة الأصل وميله $\frac{٣}{٤}$.

(٨) أوجد أقصر مسافة من النقطة (٤، ٤) إلى المستقيم المار بال نقطتين (٢، ٠)، (٢، ٠).

معادلة الدائرة

Equation of a Circle

المجموعة ١ تمارين أساسية

(١) حدد ما إذا كانت المعادلات التالية، معادلة دائرة أم لا.

(أ) $x^2 + y^2 = 4$

(ب) $(x - 1)^2 + (y + 4)^2 = 0$

(ج) $x^2 + y^2 - 2x - 8 = 0$

(د) $x^2 + y^2 - 2x + 7 = 0$


(٢) أوجد معادلة كل من الدوائر الآتية إذا علم:

(أ) المركز $(0, 0)$ وطول نصف القطر = ٣.


(ب) المركز $(4, 5)$ وطول نصف القطر = ٢.

(٣) اكتب معادلة كل دائرة في كل من الأشكال التالية:

(ب)




(أ)




(٤) أوجد طول نصف قطر كل من الدوائر الآتية، وكذلك إحداثي مركز كل دائرة:

(ب)



(أ)



(٥) محور السينات هو مماس للدائرة عند النقطة $(-3, 0)$ ، ومركز الدائرة هو $(-3, 4)$. أوجد معادلة هذه الدائرة.

في التمارين (٦-٨)، أوجد مركز وطول نصف قطر كل من الدوائر ذات المعادلات التالية:

$$(6) \quad س^2 + ص^2 - 8س + 2ص - 8 = 0.$$

$$(7) \quad س^2 + ص^2 - 16س - 17 = 0.$$

$$(8) \quad 5س^2 + 5ص^2 - 20س - 30 = 0.$$


(٩) أوجد معادلة مماس دائرة، معادلتها: $(س - 2)^2 + ص^2 = 8$ عند النقطة $(0, 2)$.

(١٠) أوجد معادلة الدائرة التي مركزها $(3, 2)$ وتتساوى معادلتها عند النقطة $(2, 0)$.


المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) أوجد طول نصف قطر كل من الدوائر التالية:


(ج)



(ب)



(أ)




(٢) أوجد معادلة كل من الدوائر التالية إذا علم:

(أ) المركز $(0, 3)$ وطول نصف القطر = 7


(ب) المركز $(-4, 0)$ وطول نصف القطر = 3

(٣) اكتب معادلة كل دائرة في كل من الأشكال التالية:


(ج)



(ب)



(أ)



(٤) اكتب معادلة كل دائرة حيث:

(أ) المركز $(0, 4)$ وتمرّ بالنقطة $(3, 4)$.

(ب) المركز $(5, 1)$ وتمرّ بالنقطة $(1, 6)$.

في التمرينين (٥-٦)، أوجد مركز وطول نصف قطر كل من الدوائر التالية:

$$(٥) 2s^2 + 2c^2 - 4s - 8c = 0$$

$$(٦) s^2 + c^2 + 2s - 2c - 16 = 0$$

(٧) أوجد معادلة مماس دائرتها $(s - 1)^2 + (c + 2)^2 = 10$ عند النقطة $(1, 2)$.

(٨) طول قطر الدائرة التي معادلتها $(s - 1)^2 + (c + 1)^2 = 4$ هو:

(د) ١٦


(ج) ٤

(ب) ٢


(أ) ١

(٩) أوجد مركز الدائرة المارة ببرؤوس المثلث $\triangle ABC$.

(ب)



(أ)



مراجعة الوحدة التاسعة

(١) أوجد قيمة ص إذا كانت النقطة (١، ص) تبعد وحدة واحدة عن النقطة (٠، ١).

(٢) أوجد النقاط (١، ص) التي تبعد $\sqrt{17}$ وحدة عن النقطة (٠، ١).

(٣) إذا كان المستقيمان: $4s - 4c = 6$ ، حيث ثابت، $6s + 3c + 2 = 0$ متعامدين. فما هي قيمة c ؟

(٤) يمر مستقيم بال نقطتين: (-٣، ٩)، (٤، ٤) ومستقيم آخر بال نقطتين: (٩، -١)، (٤، -٨). هل المستقيمان متوازيان أم متعامدان؟

(٥) إذا كان المستقيم $2s - 3c = 10$ يماس دائرة مركزها (-٢، ٤). أوجد معادلة هذه الدائرة.

(٦) أب ج مثلث فيه (٢، ٣)، ب (٧، ٨)، ج (-٢، ٥). د يقسم ب ج من الداخل من جهة ب بنسبة ١ : ٢.

(أ) أوجد إحداثي د.

(ب) أوجد معادلة د.

(٧) لتكن معادلة أب هي: $s - c = ٥$ ، اختر نقطة تقع على أب ولتكن ج (٢، ٠).

أوجد معادلة المستقيم العمودي على أب ويمر بالنقطة ج.

(٨) أب ج مثلث فيه (٤، ٣)، ب (٨، ٥)، ج يوازي محور السينات، أب يوازي محور الصادات.

(أ) أوجد إحداثي النقطة ج.

(ب) في السؤال (أ)، أثبت أن Δ أب ج قائم الزاوية في ج.

(٩) \overline{ab} ج مثلث، إحداثيات رؤوسه على الترتيب هي: (٨، ١٢)، (١١، ٥)، (٣، ٥)، ق متصرف \overline{ab} ،
ك متصرف \overline{aj} .

(أ) أوجد إحداثيات ق، ك.

(ب) أثبت أن $\overline{cq} \perp \overline{bj}$.

(ج) أثبت أن $cq = \frac{1}{2}bj$.

(د) أثبت أن \overline{ab} ليس عمودياً على \overline{bj} .

تمارين إثرائية


(١) لنأخذ النقاط و $(٠, ٠)$ ، $(٣, ١)$ ، $(٣, -٣)$ أوجد:

(أ) معادلة المنصف العمودي لـ \overline{AB} .

(ب) معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط A ، B ، C .

(ج) معادلة المماس على الدائرة في النقطة B .

(٢) د دائرة معادلتها: $x^2 + y^2 - 6x - 15 = 0$ م مستقيم معادلته: $4x + 3y = 0$



(أ) ارسم الدائرة والمستقيم في المستوى الإحداثي نفسه.

(ب) ارسم المماسين m_1 ، m_2 للدائرة D المتوازيان مع المستقيم m .

(ج) أوجد معادلة المستقيم m_3 الذي يمر بمركز الدائرة D ومتعمد مع المستقيم m .

(د) أوجد إحداثيات نقاط التقاطع A ، B للدائرة D والمستقيم m_3 .

(هـ) أوجد معادلتي المماسين m_1 ، m_2 .

(٣) أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل وتقس المستقيم: $3x + 4y = 0$.

(٤) أوجد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة $(-1, 3)$ وتقس المستقيم: $3x - 6y = 0$.

(٥) أوجد معادلة الدائرة التي مركزها $(2, 0)$ وتقس المستقيم الذي معادلته $y = -\frac{3}{4}x + \frac{11}{4}$.

(٦) أوجد معادلة الدائرة التي تمس المستقيمين: $s = 2$, $c = -1$ و طول نصف قطرها وحدتان.

(٧) أثبت أن المستقيمين $as + b$ $cs + d = 0$, $ds + b$ $cs + d = 0$ متوازيان، حيث ($d \neq 0$).

(٨)* لتجطية أحد التجمعات الرياضية من الجو، حلقت طوافتان تابعتان لمحطتي تلغزة على الارتفاع نفسه. بحيث موقع الطوافة A على بعد ٢٠ كم غرب التجمع وموقع الطوافة B على بعد ١٥ كم جنوب التجمع و ١٥ كم شرق التجمع.

أوجد المسافة بين الطوافتين حيث نقطة التجمع تمثل نقطة الأصل.

تحليل البيانات

Data Analysis


المجموعة ١ تمارين أساسية

(١) يبيّن الجدول التالي التوزيع التكراري لأوزان ٣٠ طالبًا.

| الفئة | -٧٦ | -٧٢ | -٦٨ | -٦٤ | -٦٠ | -٥٦ |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| النكرار | ٣ | ٤ | ٩ | ٣ | ٨ | ٣ |


(أ) أوجد المتوسط الحسابي لهذه الأوزان.

(ب) أوجد الوسيط لهذه الأوزان باستخدام منحني التكرار المتجمع الصاعد.




| الفئة | النكرار | أقل من الحدود العليا للفئة | النكرار المتجمع الصاعد |
|-------|---------|----------------------------|------------------------|
| -٥٦ | ٣ | -٥٦ | |
| -٦٠ | ٨ | -٦٠ | |
| -٦٤ | ٣ | -٦٤ | |
| -٦٨ | ٩ | -٦٨ | |
| -٧٢ | ٤ | -٧٢ | |
| -٧٦ | ٣ | -٧٦ | |

(ج) أوجد الوسيط لهذه الأوزان باستخدام منحنى التكرار المتجمع النازل.



| الفئة | التكرار | الحد الأدنى للفئة فأكثـر | التكرار المتجمع النازل |
|-------|---------|--------------------------|------------------------|
| -56 | 3 | | |
| -60 | 8 | | |
| -64 | 3 | | |
| -68 | 9 | | |
| -72 | 4 | | |
| -76 | 3 | | |


(د) أوجد الوسيط لهذه الأوزان باستخدام منحنى التكرار المتجمع الصاعد ومنحنى التكرار المتجمع النازل.



| الفئة | النكرار | أقل من الحدود العليا للفئة | النكرار المتجمع الصاعد | الحد الأدنى للفئة فأكثـر | النكرار المتجمع النازل |
|-------|---------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| -56 | 3 | | | | |
| -60 | 8 | | | | |
| -64 | 3 | | | | |
| -68 | 9 | | | | |
| -72 | 4 | | | | |
| -76 | 3 | | | | |

(هـ) أوجد المنوال لهذه الأوزان باستخدام قانون الرافعة.

(و) أوجد المنوال لهذه الأوزان باستخدام المدرج التكراري.



(٢) يبيّن الجدول التالي ٥ فئات تمثل توزيع المصروف اليومي لـ ٣٠ عائلة بالدينار.

| الفئة | -١٠٠ | -٨٠ | -٦٠ | -٤٠ | -٢٠ |
|---------|------|-----|-----|-----|-----|
| التكرار | ٣ | ٥ | ٩ | ٦ | ٧ |

(أ) أوجد المنوال لمصروف العائلات اليومي باستخدام قانون الرافعة.



(ب) أوجد المنوال لمصروف العائلات اليومي باستخدام المدرج التكراري.

في التمارين (٣-٦)، ظلّل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة وظلّل (ب) إذا كانت العبارة خاطئة.

(٣) الوسيط لمجموعة القيم ٦، ٢، ٤، ٥، ٧ يساوي $\frac{1}{5}$

(٤) إذا كان المتوسط الحسابي لمجموعة القيم ٣، ٩، ٧، ٠، س يساوي ٦ فإن س = ٥

(٥) لأي توزيع تكراري يكون المنوال أكبر من المتوسط الحسابي.

(٦) للmfيردات ٣، ٥، ٧، ٨، ٣ منوالان.

في التمارين (٦-٩)، اختر الإجابة الصحيحة.

(٧) في التوزيع التكراري المنوال يمكن أن يساوي:

| الفئة | -٢٨ | -٢٤ | -٢٠ | -١٦ | -١٢ |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| النوع | ٤ | ٥ | ٨ | ١٠ | ٣ |

(٨) ٢٨ (د)

(ج) ٢٤

(ب) ١٩

(أ) ١٠

(٩) في التوزيع التكراري فإن ترتيب الوسيط يساوي:

| الفئة | -٢٠ | -١٥ | -١٠ | -٥ |
|-------|-----|-----|-----|----|
| النوع | ٣ | ٨ | ٥ | ٤ |

(١٠) ٢٠ (د)

(ج) ١٠

(ب) ٨

(أ) ٥

(١١) في البيانات: ٣، ٤، ٦، ٨، س، ٥، ٧ إذا كان المتوسط الحسابي يساوي ٦، فإن س =

(١٢) ٩ (د)

(ج) ٦

(ب) ٥

(أ) ٧

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) يبيّن الجدول التالي التوزيع التكراري لأهداف الفرق في مباريات كأس العالم لسنة ٢٠٠٦.

| الأهداف | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ |
|---------|---|---|----|----|----|----|---|
| النوع | ٢ | ٢ | ١٠ | ١٢ | ١٨ | ١٣ | ٧ |


أوجد المتوسط الحسابي للأهداف.

(٢) يبيّن الجدول التالي التوزيع التكراري على فئات لقياسات أرجل ٥٠ رياضيًّا في أحد النوادي.

| الفئة | -٤٤ | -٤٢ | -٤٠ | -٣٨ |
|-------|-----|-----|-----|-----|
| النوع | ٦ | ١٧ | ١٦ | ١١ |


(أ) أوجد المتوسط الحسابي للقياسات.

(ب) أوجد الوسيط لهذه الأوزان باستخدام منحنى التكرار المجتمع الصاعد.




| الفئة | النكرار | أقل من الحدود العلية لفئة | التكرار المجتمع الصاعد |
|-------|---------|---------------------------|------------------------|
| -38 | 11 | | |
| -40 | 16 | | |
| -42 | 17 | | |
| -44 | 6 | | |

(ج) أوجد الوسيط لهذه الأوزان باستخدام منحنى التكرار المجتمع النازل.



| الفئة | النكرار | الحد الأدنى للفئة فأكثر | التكرار المجتمع النازل |
|-------|---------|-------------------------|------------------------|
| -38 | 11 | | |
| -40 | 16 | | |
| -42 | 17 | | |
| -44 | 6 | | |


(د) أوجد الوسيط لهذه الأوزان باستخدام منحنى التكرار المجتمع الصاعد ومنحنى التكرار المجتمع النازل معاً.



| الفئة | النكرار | أقل من الحدود العلية لفئة | النكرار المجتمع الصاعد | الحد الأدنى للفئة فأكثر | النكرار المجتمع النازل |
|-------|---------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| -38 | 11 | | | | |
| -40 | 16 | | | | |
| -42 | 17 | | | | |
| -44 | 6 | | | | |

(هـ) أوجد المنوال لهذه القياسات باستخدام قانون الرافعة .

(و) أوجد المنوال لهذه القياسات باستخدام المدرج التكراري .



الأرباعيات

Quartiles

المجموعة ١ تمارين أساسية


(١) أوجد المدى لقيم البيانات التالية:

(أ) ٧، ٤، ٥، ٩، ٨، ٦، ٤، ٣.

(ب) ٢٠، ١٧، ١٢، ١٩، ١٨، ١٥، ٢٣، ١١، ٢٠، ١٦.

(٢) أوجد مجمل الأعداد الخمسة للبيانات: ٥٢، ٥٤، ٥٠، ٦٤، ٦٦، ٦٥، ٥٩، ٩٥، ٦٢.


(٣) (أ) أوجد مجمل الأعداد الخمسة للقيم التالية التي تمثل أوزان أكياس من الأرز: ١١، ١٢، ١٣، ١٧، ٢٣. (ب) ماذا تستنتج؟ اشرح.



(٤) يبيّن الجدول التالي تواريХ وأطوال الأعاصير التي اجتاحت إحدى المدن في سنة ١٩٩٥.

| التاريخ | ٤/١٧ | ٤/١٨ | ٤/١٩ | ٥/٦ | ٥/٧ | ٦/٨ | ٦/٩ |
|--------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| طول الإعصار (بالكيلومتر) | ٣ | ٧ | ١١ | ٢٠ | ١٠ | ٨ | ٩ |

رسم مخطط الصندوق ذي العارضتين. وفسّر النتائج.



في التمارين (٥-٧)، ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة وظلل (ب) إذا كانت العبارة خاطئة.

(٥) إذا كان المدى لمجموعة من القيم يساوي ١٠ وكانت أصغر قيمة من هذه

القيم هي ٢ فإن أكبر قيمة تساوي ١٢ .

(٦) إذا كان المدى لمجموعة القيم ٣، ٧، ٨، ٢، س يساوي ١٥ فإن س = ١٣ .

(٧) للقيم $51, 40, 33, 24, 22, 25, 17, 24, 14$ يكون الأربعى الأعلى لا يساوى $\frac{1}{36}$. (ب)

في التمارين (٨-١٠)، اختر الإجابة الصحيحة.

(٨) في البيانات: ١٧، ٣٠، ٢٥، ١٥، ١٢، ٢٨، ٢٠، ٢٤، الأربعى الأدنى هو:

۲۲ (د) ۱۵ (ج) ۱۶ (س) ۱۷ (أ)

۱۵ (ج) ۱۶ (ب)

۱۷ (۱)

في السنانات: ١٨، ٣٠، ١٤، ٢٦، ١٢، ٢٨، ٢٠، ٢٤، المدى الأربعاني، هو:

17 (z) 18 (z) 11 (f)

$$(17, 14, 11, 6 \frac{1}{2}, 4) \quad (17, 14 \frac{1}{2}, 11, 7, 4)$$

$$(ج) (١٧، ١٤، ١١، ٧، ٤) \quad (د) (١٧، ١٤، ١١، ٦، \frac{1}{٢})$$

(د) $(17, 14 \frac{1}{2}, 11, 7 \frac{1}{2}, 4)$

(۱۷، ۱۴ $\frac{۱}{۲}$ ، ۱۱، ۷، ۳) (۱)

(ج) (٤، ٧، ١١، ١٤، ١٧، ١٨)

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) أوجد مجمل الأعداد الخمسة للبيانات التالية:

(أ) ٤٩، ٥٨، ٦٤، ٦٧، ٧٧، ٨٠.

(ب) ١٠٠، ١٠١، ١٠٢، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٩، ١١٠.


(ج) ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٩، ١٩، ٢٠.

(٢) يبيّن الجدول التالي عدد أكبر الزلازل التي حدثت في العالم حيث قوتها تخطت ٧ درجات على مقياس ريختر وذلك بين ١٩٨٥ و١٩٩٤.

| السنة | عدد الزلازل |
|-------|-------------|
| ١٩٩٤ | ١٤ |
| ١٩٩٣ | ١٥ |
| ١٩٩٢ | ٣٣ |
| ١٩٩١ | ١١ |
| ١٩٩٠ | ١٣ |
| ١٩٨٩ | ٧ |
| ١٩٨٨ | ٨ |
| ١٩٨٧ | ١١ |
| ١٩٨٦ | ٦ |
| ١٩٨٥ | ١٤ |

(أ) أوجد مجمل الأعداد الخمسة لقيم هذه البيانات.

(ب) ارسم خطوط الصندوق ذي العارضتين لقيم هذه البيانات بدون القيمة المتطرفة.



(٣) يبيّن الجدول التالي معدل دخل الفرد السنوي في بعض الدول العربية بالدولار الأميركي بحسب البنك الدولي (أعداد تقريرية).

| الدولة | المملكة العربية السعودية | الإمارات العربية المتحدة | دولـة الكويت | سلطنة عمان | دولـة قطر | لـبنان | الأـردن | تونـس | سورـية | مـملـكة الـبـحـرـين |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|------------|-----------|--------|---------|-------|--------|---------------------|
| معدل الدخل بـالـاف الـدوـلـاـت | ٢٤ | ١٠ | ٢٢ | ٩ | ٢٩ | ٦ | ٢ | ٣ | ١ | ١٤ |

(أ) أوجـدـ مجـمـلـ الأـعـدـادـ الخـمـسـةـ لـقـيمـ هـذـهـ الـبـيـانـاتـ.

(ب) ارسم خطوط الصندوق ذي العارضتين لقيم هذه البيانات. ماذا تستنتج؟ اشرح.



الانحراف المعياري Standard Deviation

المجموعة ١ تمارين أساسية

(١) أوجد الانحراف المعياري لقيم البيانات التالية (يمكن استخدام الآلة الحاسبة):

. ٦٦، ٧٠، ٥٤، ٦٣، ٥٢.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

. ١٥، ١٠، ٨، ١٥، ١٢، ١٧، ٢، ١

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(٢) يبيّن الجدول التالي الطاقة الكهربائية المستهلكة بالميغاواط / ساعة خلال خال خمسة أيام متتالية في إحدى المدن.

| اليوم | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ |
|------------------|------|------|------|------|------|
| الطاقة المستهلكة | ٤٩,٩ | ٤٦,٦ | ٥٢,٣ | ٥٣,٢ | ٤٨,٠ |

أوجد التباين والانحراف المعياري لقيم هذه البيانات.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(٣) يمثل الجدول التالي الاستهلاك الأسبوعي من البنزين لعينة مكونة من ٥٠ سيارة لأقرب لتر.

| الفئة | -٤٥ | -٤٠ | -٣٥ | -٣٠ | -٢٥ | -٢٠ |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| عدد السيارات | ٦ | ١٤ | ١٠ | ٨ | ٦ | ٦ |

أوجد المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لاستهلاك السيارات من البنزين.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(٤) يبيّن الجدول التالي التوزيع التكراري لدرجات ٢٠ طالبًا في أحد الاختبارات حيث النهاية العظمى ٢٠ درجة.

| الفئة | -١٦ | -١٢ | -٨ | -٤ |
|------------|-----|-----|----|----|
| التكرار | ٢ | ٦ | ٧ | ٥ |
| مركز الفئة | ١٨ | ١٤ | ١٠ | ٦ |

أوجد الانحراف المعياري لدرجات الطلاب.

في التمرينين (٥-٦)، ظلل (أ) إذا كانت العبارة صحيحة وظلل (ب) إذا كانت العبارة خاطئة.

- (٥) مجموع انحرافات مجموعة من القيم عن متوسطها الحسابي يساوي صفرًا.
أ (أ) إذا كان الانحراف المعياري لمجموعة قيم يساوي ٣ وكان مجموع مربعات
انحرافات هذه القيم عن متوسطها الحسابي يساوي ١٨٠ فإن عدد القيم هو ٦.
ب (ب)

في التمرينين (٧-٨)، اختر الإجابة الصحيحة.

(٧) في البيانات: ١٠، ١٢، ٧، ٩، ١٣، ١٥ الانحراف المعياري هو:

- (أ) ٧ (ب) ٦ (ج) ٧٧
(د) ليس أيًّا مما سبق

(٨) إذا كان الانحراف المعياري لمجموعة قيم بيانات يساوي ٤ ومجموع مربعات انحرافات قيم البيانات عن متوسطها الحسابي يساوي ١٩٢ فإن عدد قيم هذه البيانات هو:

- (أ) ١٦ (ب) ٤٨ (ج) ١٢
(د) ليس أيًّا مما سبق

المجموعة ب تمارين تعزيزية

(١) أوجد الانحراف المعياري لقيم البيانات التالية، ماذا تستنتج؟

- (أ) .٣، ٩، ٨، ٤، ٦، ٧، ٥

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

.٣٩، ٤٤، ٤٣، ٣٦، ٤٢، ٣٧، ٤٥، ٣٤ (ب)

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

(٢) يبيّن الجدول التالي التوزيع التكراري لاستهلاك الطاقة الكهربائية بالميغاواط/ساعة طيلة شهر أغسطس في إحدى المدن:

| الكمية | ٣٣ | ٣٦ | ٣٩ | ٤٠ | ٤١ | ٤٢ |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| التكرار | ٨ | ٢ | ٦ | ٦ | ٤ | ٥ |

(أ) أوجد المتوسط الحسابي.

(ب) أوجد التباين والانحراف المعياري لقيم هذه البيانات باستخدام الآلة الحاسبة.

(٣) يبيّن الجدول التالي التوزيع التكراري لكمية المياه بالستيلتر الموجودة في ١٠٠ عبوة.
سعة العبوة الواحدة المفترضة ١٠٠ سنتيلتر.

| الفترة | -٨٦ | -٩٠ | -٩٤ | -٩٨ | -١٠٢ | -١٠٦ |
|---------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| التكرار | ٥ | ١٠ | ٣٩ | ٣٢ | ٩ | ٥ |

أوجد المتوسط الحسابي، التباين، الانحراف المعياري لقيم هذه البيانات.

طرق العد

Methods of Counting

المجموعة ١ تمارين أساسية

في التمارين (١-٣)، اكتب قائمة بكل الإمكانيات أو ارسم شجرة بيانية للإجابة عن الأسئلة التالية:

(١) كلمات مكونة من ثلاثة حروف: ما عدد الكلمات المختلفة التي تستطيع تكوينها من بين ثلاثة حروف: ع، ل، م دون تكرارها (دون الاهتمام بالمعنى)؟

(٢) الطرق الممكنة: توجد ثلاثة طرق ممكنة تصل بين القرية ١ والقرية ب، وتوجد أربعة طرق ممكنة تصل بين القرية ب والقرية ج. كم عدد الطرق المختلفة من القرية ١ إلى القرية ج مروراً بالقرية ب؟

(٣) الرئيس ونائب الرئيس: يوجد ثلاثة مرشحين لمنصب الرئيس وأربعة مرشحين لمنصب نائب الرئيس. كم عدد الأزواج التي يمكن أن تكون من رئيس ونائب رئيس؟

في التمارين (٤-٦)، استخدم مبدأ العد الأساسي.

(٤) أرقام الهاتف: كم عدد أرقام الهاتف التي يمكن أن تكونها من سبعة أرقام علىًّا بأنه لا يمكن أن يبدأ الرقم من اليسار بـ ٠ أو ١ ، لماذا؟

(٥) لوحات الترخيص: كم عدد لوحات الترخيص التي يمكن أن تكونها من رقمين يتبعهما حرفان ثم ثلاثة أرقام بدون أن تكرر أي حروف أو أرقام؟

(٦) رمي حجر نرد: عند رمي حجري نرد أحدهما أحمر والثاني أخضر معًا ولاحظة الوجه العلوي لكل منها. كم عدد النواتج الممكنة؟

في التمارين (١٠-٧)، أوجد قيمة كلّ ما يلي:

(٧) Δ^8

(٨) 12^{Δ}

(٩) 14^{Δ}

(١٠) 48^{Δ}

في التمارين (١١-١٣)، حل المسائل التالية:

(١١) تكوين اللجان: سوف يتم انتخاب لجنة مكونة من ٣ سيدات من بين ٢٥ سيدة. كم عدد اللجان المختلفة التي يمكن انتخابها؟

(١٢) شراء أقراص حاسوب مدججة: لدى جيهان نقود تكفي لشراء ثلاثة أقراص حاسوب مدججة فقط من بين ٤٨ قرصاً. كم عدد مجموعة أقراص الحاسوب التي يمكن شراؤها؟

(١٣) يجري مدير شؤون الموظفين مقابلات شخصية مع ثانية أشخاص مرشحين لثلاث وظائف شاغرة. كم عدد المجموعات المكونة من ثلاثة أشخاص التي يمكن توظيفها؟

المجموعة ب تمارين تعزيزية

في التمارين (١-٣)، اكتب قائمة بكل الإمكانيات أو ارسم شجرة بيانية للإجابة عن الأسئلة التالية:

(١) **كلمات مكونة من ثلاثة حروف:** ما عدد الكلمات المختلفة التي تستطيع تكوينها من ثلاثة حروف دون تكرارها من بين ٤ حروف ل، ع، ب، ه؟

(٢) **الطرق الممكنة:** توجد ثلاثة طرق ممكنة تصل بين القرية أ والقرية ب، وتوجد أربعة طرق ممكنة تصل بين القرية ب والقرية ج.

كم عدد الطرق المختلفة من القرية أ إلى القرية ج والرجوع إلى القرية أ مروراً بالقرية ب في كل اتجاه؟

(٣) **تذاكر الطيران:** عندما تطلب تذكرة طيران يمكنك أن تحجز في الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية. يمكنك أيضاً أن تختار مكانك إلى جانب نافذة الطائرة أو في الممر أو في الكرسي الأوسط، إلا في حالة عدم وجود كرسي الأوسط كما هو الحال في الدرجة الأولى حيث يوجد كرسياً فقط.

كم عدد الطرق المختلفة التي يمكن أن تحجز بها مكانك على متن الطائرة؟

الاحتمال المشروط

Conditional Probability

المجموعة ٤ تمارين أساسية

في التمارين (١-٣)، عند رمي حجر نرد أحمر اللون وحجر نرد أخضر اللون معاً وملاحظة الوجه العلوي. فما النواتج الممكنة لهذا الحدث؟ وما احتمال وقوع كل حدث مما يلي؟

(١) مجموع العدددين الظاهرين . ٩.

(٢) مجموع العدددين الظاهرين هو عدد زوجي.

(٣) العدد الظاهر على الحجر الأحمر أكبر من العدد الظاهر على الحجر الأخضر.

في التمارين (٤-٩)، ح تتضمن عينة لألوان الحلوي التقليدية التي ينتجهما مصنع للحلوى وهي:

$ج = \{\text{البني، الأخضر، البرتقالي، الأحمر، البرونزي، الأصفر}\}$.

احتمال كل حدث في ج يساوي نسبة إنتاج هذا اللون من الحلوي من إجمالي الألوان. وقد صرَحَ المسؤول في هذا المصنع ببعض المعلومات عن احتمال الإنتاج في الجدول التالي:

| اللون | البني | الأحمر | الأصفر | الأخضر | البرتقالي | البرونزي |
|----------|-------|--------|--------|--------|-----------|----------|
| الاحتمال | ٠,٣ | ٠,٢ | ٠,٢ | ٠,١ | ٠,١ | ٠,١ |

إذا قمت بأخذ قطعة حلوي عشوائياً من علبة مفتوحة حديثاً من إنتاج هذا المصنع، فما احتمال أن تأخذ حلوي بالألوان التالية:

(٤) البني أو البرونزي؟

(٥) الأحمر أو الأخضر أو البرتقالي؟

(٦) الأحمر؟

(٧) أي لون عدا الأحمر؟

(٨) أي لون عدا البرتقالي أو الأصفر؟

(٩) أي لون عدا البني أو البرونزي؟

في التمارين (١٠-١٣)، ما احتمال أن يتحقق رمز عدد عشوائي مكون من رقمين من ١ إلى ٩ الشروط التالية؟

(١٠) رقمان عشوائيان. الأول فردي والثاني من مضاعفات العدد ٤.

(١١) رقمان عشوائيان. الأول زوجي والثاني فردي.

(١٢) رقمان عشوائيان. كلا الرقمين أصغر من ٧.

(١٣) رقمان عشوائيان. الرقم الثاني هو الرقم الأول نفسه.

(١٤) تأجير السيارات: لدى شركة لتأجير السيارات ٢٥ سيارة للإيجار، ٢٠ منها من الحجم الكبير و٥ سيارات من الحجم المتوسط. إذا تم اختيار سيارتين بشكل عشوائي للإيجار لمدة يوم واحد، فما احتمال أن تكون السيارتان من الحجم الكبير؟

(١٥) اكتب لتعلم: علّل لماذا العبارة التالية غير صحيحة: احتمال أن يبيع باائع الحواسيب ١، ٢، ٣ أو ٣ أجهزة حاسوب في أي يوم من الأيام هو: ١٢، ٠، ٤٥، ٠، ٣٨، ٠، ١٥، ٠، بحسب الترتيب.

(١٦) إذا كان A ، B حدثين مستقلين وكان $L(A) = 3$ ، $L(B) = 4$. أوجد كلاً من:

$$(أ) L(A \cup B) =$$

$$(ب) L(\bar{A}) =$$

$$(ج) L(A \cap B) =$$

(١٧) ليكن: $L(A) = 3$ ، $L(B) = 7$ ، $L(A \cup B) = 8$. احسب:

$$(أ) L(A \cap B) =$$

$$(ب) L(|A|B) =$$

$$(ج) L(B|A) =$$

(١٨) ليكن \mathcal{A} , \mathcal{B} حدثان مستقلان في فضاء عينة Ω حيث $\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $P(\mathcal{B}) = 0.5$. احسب: $P(\mathcal{A}|\mathcal{B})$.

في التمارين (١٩-٢١)، اختار الإجابة الصحيحة.

(١٩) إذا كان \mathcal{A} , \mathcal{B} حدثن مستقلين وكان $P(\mathcal{A}) = 0.2$, $P(\mathcal{B}) = 0.5$, $P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) =$

(أ) ٠.٥ (ب) ٠.٧ (ج) ٠.٨ (د) ٠.٦

(٢٠) إذا كان \mathcal{A} , \mathcal{B} حدثن في فضاء العينة وكان $P(\mathcal{A}) = 0.5$, $P(\mathcal{B}) = 0.7$, $P(\mathcal{A} \cup \mathcal{B}) =$

(أ) ٠.٢ (ب) ٠.٤ (ج) ٠.٦ (د) ١.٢

(٢١) إذا كان \mathcal{A} , \mathcal{B} حدثن مستقلين في فضاء العينة وكان $P(\mathcal{A}) = 0.6$, $P(\mathcal{B}) = 0.4$, $P(\mathcal{A} \cap \mathcal{B}) =$

(أ) ٠.٦ (ب) ٠.٤ (ج) ٠.٢ (د) ١

المجموعة ب تمارين تعزيزية

في التمارين (١-٣)، عند رمي حجر نرد أحمر اللون وحجر نرد أخضر اللون معًا ولاحظة الوجه العلوي لهما. فما النواتج الممكنة لهذا الحدث؟ وما احتمال ونوع كل حدث في ما يلي؟

(١) مجموع العدددين الظاهرين أصغر من ١٠.

(٢) العددان الظاهران عددان فردان.

(٣) العددان الظاهران عددان زوجيان.

في التمارين (٤)، حل المسألة التالية:

(٤) رقم التأمين الاجتماعي: ما احتمال أن يتم بشكل عشوائي اختيار رقم تأمين اجتماعي مكون من تسعه أرقام مختلفة ليس من بينها الصفر؟

(٥) ما احتمال اختيار رقمًا عشوائياً واحداً من ١ إلى ٩ يحقق الشرطين التاليين:

رقم أولي أو من مضاعفات الرقم ٦.

في التمارين (٦ - ١٠)، ينتج المصنع حلوى محسوسة بالفول السوداني مشكلة بالألوان الموضحة بالجدول.

يوضح الجدول التالي احتمال إنتاج الحلوى بحسب لونها:

| اللون | البني | الأحمر | الأصفر | الأخضر | البرتقالي |
|-------|-------|--------|--------|--------|-----------|
| ٠,٣ | ٠,٢ | ٠,٢ | ٠,٢ | ٠,٢ | ٠,١ |

إذا قمت بأخذ قطعة حلوى عشوائياً من كل من علبتين مفتوحتين حديثاً من إنتاج هذا المصنع، فما احتمال أخذ حلوى بالألوان التالية؟

(٦) كلتاهم ببنية اللون.

(٧) كلتاهم برترقالية اللون.

(٨) الأولى ببنية اللون والثانية صفراء.

(٩) ولا واحدة صفراء.

(١٠) الأولى ليست حمراء والثانية ليست برترقالية.

(١١) ليكن \mathbb{A} , \mathbb{B} حدثان مستقلان في فضاء عينة \mathcal{F} حيث $L(\mathbb{A}) = 2, L(\mathbb{B}) = 0, L(\mathbb{A} \cap \mathbb{B}) = 0$.

احسب:

$$(أ) L(\mathbb{A} \cup \mathbb{B})$$

$$(ب) L(\mathbb{B} | \mathbb{A})$$

$$(ج) L(\mathbb{A} \cap \mathbb{B})$$

$$(د) L(\mathbb{A} | \mathbb{B})$$

مراجعة الوحدة العاشرة

(١) يبيّن الجدول التالي التوزيع التكراري لعدد الرجال غير المتزوجين في إحدى الدول.


| الرجال | الفئة (العمر) |
|--------|---------------|
| ٤٥٠٠ | -٢٠ |
| ٤٨٠ | -٣٠ |
| ٣٧٠ | -٤٠ |
| ٢٩٠ | -٥٠ |
| ١٨٠ | -٦٠ |
| ١١٠ | -٧٠ |
| ٣٠ | -٨٠ |

(أ) أكمل الجدول بإضافة مراكز الفئات والتكرار المتجمع الصاعد.

| مركز الفئة | التكرار المتجمع الصاعد | أقل من الحدود العليا للفئة | الرجال | الفئة (العمر) |
|------------|------------------------|----------------------------|--------|---------------|
| | | | ٤٥٠٠ | -٢٠ |
| | | | ٤٨٠ | -٣٠ |
| | | | ٣٧٠ | -٤٠ |
| | | | ٢٩٠ | -٥٠ |
| | | | ١٨٠ | -٦٠ |
| | | | ١١٠ | -٧٠ |
| | | | ٣٠ | -٨٠ |

(ب) أوجد المتوسط الحسابي لأعمر الرجال.

(ج) أوجد الوسيط لأعمر الرجال مستخدماً منحنى التكرار المتجمع الصاعد.



(د) أوجد المنوال لأعمر الرجال باستخدام المدرج التكراري.



(٢) جاءت درجات أحمد السنة الماضية في اختبار مادة العلوم حيث النهاية العظمى ٢٠ درجة كما يلي:

١٧، ١٦، ١٣، ١٢، ١٥، ١٠، ٩، ٨، ١٦، ١٤.

(أ) أوجد المتوسط الحسابي لهذه الدرجات سـ.

(ب) أوجد مجمل الأعداد الخمسة لهذه الدرجات.

(ج) ارسم خطط الصندوق ذي العارضتين.



ماذا تلاحظ؟


(د) أوجد الانحراف المعياري لهذه الدرجات بـع.

(٣) إذا كانت درجات أحد الطلاب في اختبارات مادة الرياضيات على مدار السنة حيث النهاية العظمى ٢٠ درجة كما يلي: ٧، ١٠، ١٢، ٩، ١٤، ١٦، ١٥، ٨، ١٧. .

(أ) أوجد مجمل الأعداد الخمسة لقيم هذه الدرجات.

(ب) ارسم مخطط الصندوق ذي العارضتين لتمثيل قيم هذه الدرجات.

ماذا تلاحظ؟



تمارين إثرائية


(١) يبيّن الجدول التالي التوزيع التكراري لأوزان ٧٥ رأساً من قطع المها العربية بالكيلوجرام.

| الفئة | التكرار |
|-------|---------|
| -٨٠ | ٤ |
| -٧٠ | ١٧ |
| -٦٠ | ٢٢ |
| -٥٠ | ١١ |
| -٤٠ | ٨ |
| -٣٠ | ٥ |
| -٢٠ | ٧ |
| -١٠ | ١ |

(أ) أكمل الجدول بإضافة التكرار المتجمع الصاعد والتكرار المتجمع النازل.

| الناتج | الناتج | الناتج | الناتج | الناتج | الفئة |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | ١ | -١٠ |
| | | | | ٧ | -٢٠ |
| | | | | ٥ | -٣٠ |
| | | | | ٨ | -٤٠ |
| | | | | ١١ | -٥٠ |
| | | | | ٢٢ | -٦٠ |
| | | | | ١٧ | -٧٠ |
| | | | | ٤ | -٨٠ |

(ب) أوجد الوسيط لقيم هذه الأوزان باستخدام منحنى التكرار المتجمع الصاعد ومنحنى التكرار المتجمع النازل معاً.



(ج) أوجد المنوال لقيم هذه الأوزان باستخدام قانون الرافعة وباستخدام المدرج التكراري.



(د) أوجد المتوسط الحسابي لقيم هذه الأوزان.

(٢) سجل أحد الأشخاص أسعار الحاسوب بالدينار الكويتي من عدة محلات لبيع هذه الأجهزة كما يلي:

.٢٦٥، ٢٥٥، ٢٤٥، ٢٦٠، ٢٤٠، ٢٣٥، ٢٦٥، ٢٤٠، ٢٧٠، ٢٣٥، ٢٦٥، ٢٤٠، ٢٥٠

(أ) أوجد المتوسط الحسابي لقيم هذه الأسعار \bar{x} .

(ب) أوجد الانحراف المعياري لقيم هذه الأسعار s .

(٣) حلوي محسوسة بالفول السوداني: يتبع مصنع حلوي محسوسة بالفول السوداني مشكلة بالألوان، كما يوضح الجدول التالي:

| اللون | البني | الأحمر | الأصفر | الأخضر | البرتقالي |
|----------|-------|--------|--------|--------|-----------|
| الاحتمال | ٠,٣ | ٠,٢ | ٠,٢ | ٠,٢ | ٠,١ |

إذا أخذت ثلاثة قطع من علبة واحدة، فكم عدد الألوان التي يتحمل الحصول عليها؟

(٤) تسلية: في إحدى الألعاب يتم رمي خمسة أحجار نرد متمايزة في وقت واحد وملاحظة الوجه العلوي لها. كم عدد النواتج التي يمكن تمييزها إذا كان لكل حجر لون مختلف؟

(٥) المعلم والامتحان النهائي: أعطى معلم طلابه ٢٠ سؤالاً للاستذكار على أن يحتوي الامتحان النهائي على ثمانية أسئلة منها. كم عدد الامتحانات النهائية المختلفة التي يمكن وضعها؟

(٦) مسح للخريجين: اختارت إحدى الكليات عدداً من دفعة عام ١٩٩٦ المكونة من ٢٥٤ خريجاً من بينهم ١٧٢ سيدة، حيث التحق ١٢٤ سيدة بالدراسات الجامعية و ٥٨ رجلاً. فما احتمال كل من الأحداث التالية؟

(أ) أن يكون الخريج سيدة.

(ب) أن يلتتحق الخريج بالدراسات الجامعية.

(ج) أن يكون الخريج سيدة وقد التحقت بالدراسات الجامعية.

(٧) تحديد نوع الطفل: افترض أن احتمال أن يكون الطفل المولود حديثاً من نوع معين هو ٥٠٪، في عائلة مكونة من أربعة أطفال. فما احتمال كل حدث معطى؟

(أ) كل الأطفال إناث.

(ب) كل الأطفال من نوع مختلف.

(ج) كل الأطفال إما ذكور أو إناث.

(٨) عند إشارة المرور التي تتالف من ثلاثة ألوان لاحظنا أن:

٢٪ من السيارات تتوقف عند الإشارة الخضراء.

٦٥٪ من السيارات تتوقف عند الإشارة الصفراء (كما يطلب قانون المرور).

٩٧٪ من السيارات تتوقف عند الإشارة الحمراء.

قررنا مراقبة سلوك سيارة عند إشارة المرور. لنفترض أنه عند وصول السيارة إلى الإشارة، لون الإشارة عشوائي وأن احتمال أن يكون اللون هو الأخضر ٦٠، احتمال أن يكون اللون هو الأصفر ١٠، احتمال أن يكون اللون هو الأحمر ٣٠.

(أ) ما احتمال أن تكون السيارة المراقبة قد توقفت؟

(ب) تجاوزت السيارة الإشارة. فما احتمال أن تكون قد تجاوزت الإشارة عندما كان لونها أحمراً.

(٩) أرقام الهاتف: ما احتمال أن يتم بشكل عشوائي اختيار رقم هاتف مكون من سبعة أرقام دون تكرار أي منها؟

(١٠) ما احتمال اختيار رقم واحد عشوائي من ١ إلى ٩ يحقق الشروط التالية: عدد فردي أو من مضاعفات العدد ٤؟

(١١) في فصل الشتاء، أصابت موجة زكام ربع المواطنين. ثلث المواطنين تلقوا لقاحاً ضد الزكام، ولسبب عدم

فاعلية اللقاح ١٠٠٪. نفترض أن مريضاً مصاباً بالزكام من ١٠ قد تلقى لقاحاً.

ما احتمال أن يكون مواطن من بين الذين تلقوا اللقاح مصاباً بالزكام؟

ملاحظات

ملاحظات

ملاحظات