

الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية
المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية

الكيمياء

الصف الثاني الثانوي العلمي

العام الدراسي: 2019-2020م

المؤلفون

فئة من المختصين

**حقوق التأليف والنشر محفوظة لوزارة التربية في
الجمهورية العربية السورية**

حقوق الطبع والتوزيع محفوظة للمؤسسة العامة للطباعة

طبع أول مرة للعام الدراسي 2019/2018

المقدمة

نقدم للمتعلّمين الأعزاء كتاب الكيمياء المبنيٌ وفق الإطار العام للمنهاج الوطني ووثيقة المعايير الوطنية المطورة، والتي تهدف إلى مواكبة التطورات الحالية، وتقديم منهاج قائم على البحث العلمي والتجريب يلبي آمال المتعلّمين من جهةٍ، ومتطلبات سوق العمل والمجتمع المحلي من جهةٍ أخرى.

يشهد العالم ثورةً معرفيةً يرافقها تسارعٌ في إنتاج المعرفة وانتشارها وتطور التقانات المستخدمة إضافةً إلى سرعة التغييرات في مجالات الحياة كلها.

لذلك وجب ربط المنهاج بالحياة اليومية للمتعلم وبيته، ومواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية التي سيكون لها الأثر الفعال في تنمية شخصية المتعلم من الناحتين الفكرية والجسدية، وهذا ما يسمح له بالتكامل مع متطلبات الحياة المعاصرة، والمساهمة في التنمية الوطنية المستدامة.

يخاطب المحتوى العلمي المتعلّم بوصفه محور العملية التعليمية، ويشجّعه على التعلم الذاتي، حيث صيغت موضوعات الكتاب بأسلوب علمي مبسط واضح لتناسب النمو العقلي والعمري للمتعلم وتشير دافعيته. كما يرتكز المحتوى على المعارف والمهارات بعيداً عن الحشو والتكرار، ويمكّن المتعلّم من مواجهة المشكلات التي يتعرّض لها في حياته اليومية، وإيجاد الأساليب المناسبة لحلّها، وكذلك يحفز المتعلّم على اكتساب مهارات التّواصل والتفكير والبحث والاستنتاج بدلاً من تلقّي المعلومات وحفظها واستظهارها، كما يؤكّد المحتوى على دور المعلم بوصفه موجهاً للمناقشة، وميسراً للعلم والعمل.

وكلنا أملٌ وثقة أن يحقق زملاؤنا المتعلّمون ما نصبو إليه.

فريق التأليف

الفهرس

الوحدة الأولى:

6	الأكسدة والإرجاع	1
19	الزوج الهدروجيني	2
28	المخلية الغلفانية	3
42	الخلايا الكهربائية	4
53	التحليل الكهربائي	5
62	المعايير الحجمية بطريقة تفاعل الأكسدة والإرجاع	6

الوحدة الثانية:

74	الكيمياء الحرارية	1
----------	-------------------------	---

الوحدة الثالثة:

100	الكيمياء العضوية	2
107	المركبات الهدروكربونية	3
117	الألكنات	4
126	الألكينات	5
134	النفط والغاز الطبيعي	6

الوحدة الرابعة


142	الصناعات والتعدين	1
155	المعادن والسبائك	2

الوحدة الأولى

الكيمياء الكهربائية


الأهداف العامة للوحدة :

- يَسْتَنْتَجُ مِنْ خَلَالِ التَّجَارِبِ التَّفَاعُلَاتِ بَيْنَ الْمَعَادِنِ وَالْأَيُونَاتِ.
- يَفْهَمُمُ عَمَلِيَّةَ الْأَكْسَدَةِ وَالْإِرْجَاعِ وَفَقَ مَفْهُومَ تَغْيِيرِ رَقْمِ التَّأْكُسُدِ.
- يَتَعَرَّفُ كَيْفِيَّةَ تَحْضِيرِ مَحْلُولٍ.
- يَفْهَمُمُ الرَّوْجَ الْهَدْرُوجِينِيَّ $. H_2/2H^+$.
- يَتَعَرَّفُ المُعَايِرَةُ الْحَجْمِيَّةُ بِطَرِيقَةِ (أَكْسَدَة / إِرْجَاع).
- يَتَعَرَّفُ الخَلَايَا الْكَهْرَبَائِيَّةُ.
- يَفْهَمُمُ ظَاهِرَةَ التَّحْلِيلِ الْكَهْرَبَائِيِّ.



٧

الأكسدة والإرجاع



الأهداف:



يعتمد إطلاق بعض الصواريخ الحاملة للسفن والأقمار الصناعية على احتراق الوقود، الذي يعتبر نوعاً من أنواع التفاعلات الكيميائية، ما هي برأيك؟

أجرب وأستنتج:

تجربة:

المواد والأدوات الازمة:

صفيحة من الحديد - صفيحة من الزنك - محلول كبريتات النحاس II - محلول كبريتات الحديد II - كأس زجاجي / بيسر / عدد 2.

خطوات التجربة:

- أضْعُ صفيحة الحديد في محلول كبريتات النحاس II ، وأنظر فترةً مُناسبة من الزمن، ماذا ألاحظ؟



- * يتعرّف التفاعل بين معدن وأيون معدن.
- * يتعرّف العامل المؤكسد والعامل المرجع.
- * يحدّد عمليّي الأكسدة والإرجاع.
- * يستخرج الثنائيّة (M/M^{n+}).
- * يفهم السلسلة الكهركيميائّية للأزواج المعدنيّة.
- * يحدّد رقم الأكسدة.
- * يستخدم تغيير رقم الأكسدة في تحديد تفاعل الأكسدة وتفاعل الإرجاع.
- * يوازن تفاعلات الأكسدة والإرجاع في وسطٍ (حمضي - أساسي).

الكلمات المفتاحية:

- * أكسدة.
- * إرجاع.
- * مؤكسد.
- * مرجع.
- * الرّوج الأيوني المعدني.
- * السلسلة الكهركيميائّية.
- * رقم الأكسدة.

2. أضَعْ صفيحةً الزَّنك في محلول كبريتات الحديد II، وأنظر فترهً مناسبة من الزَّمن، ماذا ألاحظ؟



3. أضَعْ صفيحةً من النحاس في محلول كبريتات الزَّنك، وأنظر فترهً زمنيةً مناسبة، ماذا ألاحظ؟
أتساءلُ:

ما سبب زوال اللون الأزرق وظهور اللون الأخضر في الخطوة 1؟

ما سبب زوال اللون الأخضر في الخطوة 2؟

في الخطوة 1:

- تأكسد ذرات الحديد إلى أيونات الحديد II ذات اللون الأخضر وفق المعادلة:



- تُرجع أيونات النحاس II زرقاء اللون في محلول باكتسابها الإلكترونات المُتحرّرة من الحديد، وتترسّب ذرات النحاس وفق المعادلة:



أستنتجُ: يقومُ الحديد بدور مُرجع، وأيونات النحاس بدور مؤكسد.

في الخطوة 2:

- تأكسد ذرات الزَّنك إلى أيونات الزَّنك عديمة اللون وفق المعادلة:



- تُرجع أيونات الحديد II إلى ذرات الحديد باكتسابها الإلكترونات المُتحرّرة من الزَّنك وفق المعادلة:



أستنتاجُ: تقومُ أيونات الحديد II بدور المؤكسد، والزنك بدور المُرجع.

بالمقارنة بين الخطوتين يقومُ الحديد بدور المُرجع، وأيوناته بدور المؤكسد Fe/Fe^{2+} . يُسمى الزوج (أيون المعدن / المعدن) بالزوج مؤكسد/مرجع، ويُعبر عنه بالشكل


في الخطوة 3

- لا يحصل أي تغيير على صفيحة النحاس، أو على لون محلول.

أستنتاجُ: النحاس غير قادرٍ على إرجاع أيون الزَّنك.

وبتجاربٍ مماثلة تم التوصل إلى ترتيب بعض العناصر في سلسلةٍ تبعاً لنشاطها الكهركيميائي.

نصف التفاعل



(1-1) جدولٌ يبيّن ازدياد قوّة العامل المُؤكسد والعامل المُخسّد للأزواج

نشاط (1):

حدّد الزوجين (مؤكسد / مُخسّد) للتفاعل الآتي:



تطبيق (1):


لديك الزوجان المعدنيان (Zn/Zn^{2+}) ، (Fe/Fe^{2+}) . المطلوب:

1. اكتب نصفي تفاعلي الأكسدة والإرجاع المعتبرين عن تفاعلي الزوجين السابقين، ثم حدد العامل المُؤكسد والعامل المُخسّد.


2. استنتج معادلة التفاعل الكلّي الحاصل.

الحل:

1. بالاعتماد على السلسلة الكهر كيميائية في الجدول (1-1) نلاحظ أنَّ الزنك أكثر قدرة إرجاعية من الحديد، لذلك يتآكسد ويقوم بدور العامل المُؤكسد:



ترجع أيونات الحديد II وتقوم بدور العامل المُؤكسد:



2. بجمع المعادلين السابقين نحصل على التفاعل الكلّي للأكسدة والإرجاع:



نشاط (2)

- لديك الزوجان المعدنيان (Ag/Ag^+)، (Al/Al^{3+}) المطلوب:
- اكتب نصفٍ تفاعليًّا للأكسدة والإرجاع المُعَبِّرِين عن تفاعلي الزوجين السابقين، ثم حدد العامل المؤكسد والعامل المرجع.
 - استنتج معادلة التفاعل الكلي الحاصل.

الأسدة والإرجاع وفق مفهوم رقم الأكسدة

رقم الأكسدة: هو عدد الشحنات الكهربائية التي تحملها ذرة عنصر ما في المركبات الأيونية والمُشتَركة.

قواعد حساب رقم الأكسدة:

نشاط (3)

ألاحظ الجداول الآتية وأستنتج:

Na	Ag	Cu	H_2	Cl_2	O_2	S_8	رمز العنصر الحرّ
0	0	0	0	0	0	0	رقم الأكسدة

رقم أكسدة العنصر الحرّ يساوي الصفر.

O^{2-}	S^{2-}	Al^{3+}	Ca^{2+}	Na^+	Cl^-	رمز الأيون البسيط
-2	-2	+3	+2	+1	-1	رقم الأكسدة

رقم أكسدة الأيون البسيط يساوي المقدار الجبري لشحنته.

$\text{Mg}_3(\text{PO}_4)_2$	K_2CO_3	CaF_2	FeCl_3	صيغة المركب
+2	+1	+2	+3	رقم أكسدة المعدن

رقم أكسدة معدن في مركباته يساوي قيمة تكافؤه مسبوقة بإشارة (+).

H_2O	NO_2	NaBrO_3	H_2SO_4	صيغة المركب
0	0	0	0	مجموع أرقام أكسدة عناصر المركب

مجموع أرقام أكسدة العناصر في مركب يساوي صفر.

SO_4^{2-}	PO_4^{3-}	NH_4^+	NO_3^-	صيغة الأيون المركب
-2	-3	+1	-1	رقم أكسدة الأيون

مجموع أرقام أكسدة العناصر في أيون مركب يساوي مقدار شحنته.

LiH	KH	H_2S	HF	صيغة مركب يحوي الهdroجين
-1	-1	+1	+1	رقم أكسدة الهdroجين

رقم أكسدة الهdroجين في مركباته (+1)، عدا هدریدات المعادن (-1).

OF_2	KO_2	H_2O_2	H_2O	صيغة مركب يحوي الأكسجين
+2	$-\frac{1}{2}$	-1	-2	رقم أكسدة الأكسجين

رقم أكسدة الأكسجين في مركباته (-2)، عدا فوق الأكسيد (-1)، وأعلى الأكسيد (سوبر أكسيد) ($-\frac{1}{2}$)، ومع الفلور يأخذ (+2)

تطبيق (2):

احسب رقم أكسدة العنصر الذي تحته خط:

$$\begin{array}{ll} \text{MgCl}_2 & \underline{\text{Mn}} \text{O}_4^- \\ +2 + 2x = 0 & x + 4(-2) = -1 \\ 2x = -2 & \Rightarrow x - 8 = -1 \\ \Rightarrow x = -1 & x = +7 \end{array}$$

نشاط (4):

احسب رقم الأكسدة لذرة الكبريت في كل من المركبات الآتية:

H_2SO_4	H_2S	SO_2
-------------------------	----------------------	---------------

مفهوم الأكسدة والإرجاع وفق تغيير رقم الأكسدة

نشاط (5):

في تفاعل الأكسدة والإرجاع الآتي:

- أحدد نصفي تفاعل الأكسدة والإرجاع، ثم أحدد تغيير رقم أكسدة كل من الزنك والنحاس.



يزداد رقم الأكسدة بمقدار (2) أي: $2 - 0 = 2$.




ينقص رقم الأكسدة بمقدار (2) أي: $0 - 2 = -2$

استنتج:

- يزداد رقم أكسدة العنصر في نصف تفاعل الأكسدة.
- ينقص رقم أكسدة العنصر في نصف تفاعل الإرجاع.
- يزداد رقم أكسدة العامل المُرجع.
- ينقص رقم أكسدة العامل المُؤكسد.

تطبيق (3):

أحدد نصفي تفاعل الأكسدة والإرجاع، وفق مفهوم تغيير رقم الأكسدة في التفاعل الآتي:



إثراء:

يتآكسد الحديد بأكسجين الهواء فتشكل ما يُعرف بالصدأ، وهذه العملية غير مرغوب بها لأنها تؤدي مع الوقت لتأكل الحديد وتلف بنيته. بينما في بعض المعادن مثل الألミニوم فالأكسدة تؤدي لتشكل طبقة واقية من أكسيد الألミニوم تقي المعدن من استمرار تآكله.



نشاط (6)

حدّد نصفي تفاعل الأكسدة والإرجاع، والعامل المؤكسد والعامل المُرجع، في التفاعل الآتي:



موازنة معادلات أكسدة - إرجاع للتفاعلات التي تحدث في المحاليل المائية

أ. طريقة أنصاف التفاعل


a. في وسطٍ حمضيٍ:

نشاط (7):


أضيف كمية من محلول ثائي كرومات البوتاسيوم إلى كمية من محلول يحوي أيونات الحديد II في وسطٍ حمضيٍ. يحدث التفاعل الآتي:




أوازن المعادلة بطريقة أنصاف التفاعل في وسطٍ حمضيٍ عبر المراحل الآتية:




1. أكتب نصفي تفاعل الأكسدة والإرجاع.



2. أحقّق قانون مصونية الكتلة، حيث تتم موازنة الأكسجين بإضافة H_2O وموازنة الهدروجين بإضافة H^+ .




3. أحقّق قانون مصونية الشحنة بإضافة إلكترونات.



4. أحقّق التساوي بين عدد الإلكترونات المفقودة وعدد الإلكترونات المكتسبة بالضرب بالأمثال.



5. أجمع المعادلين.



6. اختصر.

نشاط (8)

وازن المعادلة الآتية في وسط حمضي بطريقة أنصاف التفاعل:




b. في وسط أساسي:

نشاط (9)

أضيف كمية من محلول برمغنانات البوتاسيوم إلى محلول يحوي أيونات الحديد II في وسط أساسي.

يحدث التفاعل الآتي:



وازن المعادلة بطريقة أنصاف التفاعل في وسطٍ أساسي:



$\text{MnO}_4^- \rightarrow \text{MnO}_2$ $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$	1. أكتب نصفَي تفاعل الأكسدة والإرجاع.
$4\text{H}^+ + \text{MnO}_4^- \rightarrow \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$	2. أحقّق قانونَ مصوّنة الكتلة، حيث تتم موارنة الأكسجين بإضافة H_2O ، و موازنة الهيدروجين بإضافة H^+ .
$4\text{H}^+ + 4\text{OH}^- + \text{MnO}_4^- \rightarrow \text{MnO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{OH}^-$ $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$ $2\text{H}_2\text{O} + \text{MnO}_4^- \rightarrow \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-$ $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$	3. أضيف إلى الطرفين عدداً من أيونات OH^- تساوي عددَ أيونات H^+ حيث يشَكّلان H_2O ، ثم أكتب الشكل المختصر.
$2\text{H}_2\text{O} + \text{MnO}_4^- + 3\text{e}^- \rightarrow \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-$ $\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$	4. أحقّق قانونَ مصوّنة الشحنة بإضافة إلكترونات.
$1 \times (2\text{H}_2\text{O} + \text{MnO}_4^- + 3\text{e}^- \rightarrow \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^-)$ $3 \times (\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^-)$	5. أحقّق التّساوي بينَ عددِ الإلكترونات المفقودة وعددِ الإلكترونات المكتسبة بالضربِ بالأمثال.
$2\text{H}_2\text{O} + \text{MnO}_4^- + 3\text{Fe}^{2+} + 3\text{e}^- \rightarrow \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^- + 3\text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^-$	6. أجمع المعادلين.
$2\text{H}_2\text{O} + \text{MnO}_4^- + 3\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{MnO}_2 + 4\text{OH}^- + 3\text{Fe}^{3+}$	7. أختصرُ

نشاط (10)

وازنِ المعادلة الآتية بطريقة أنصاف التفاعل بوسطٍ أساسي.



٢. طريقة أرقام التأكسد


a. في وسط حمضي:

نشاط (11):


أوازن التفاعل الآتي بطريقة أرقام الأكسدة:



١. أحدد نصفي تفاعل الأكسدة والإرجاع وفق مفهوم رقم الأكسدة، وأحسب التغيير في رقمي الأكسدة في كلّ منهما:



٢. أحقق التساوي في تغيير رقمي الأكسدة بالضرب بالأمثال:



٣. أوازن الأكسجين بإضافة جزيئات H_2O ، والهيدروجين بإضافة أيونات H^+ :



نشاط (12):

وازن بطريقة تغيير رقم الأكسدة المعادلة الآتية في وسط حمضي.




b. في وسط أساسي:

نشاط (13):


أوازن بطريقة تغيير رقم الأكسدة المعادلة الآتية:



1. أحدد نصف تفاعل الأكسدة والإرجاع، وفق مفهوم رقم الأكسدة، وأحسب التغيير في رقمي الأكسدة في كلّ منها



2. أحقق التساوي في تغيير رقمي الأكسدة بالضرب بالأمثل:



3. أوازن الأكسجين بإضافة H_2O ، والهdroجين بإضافة H^+ ، ثم أضيف إلى طرفي المُعادلة عدد من أنيونات OH^- تساوي عدد أنيونات H^+ :




4. اختصر جزيئات الماء: (باعتبار $2\text{H}^+ + 2\text{OH}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$)



نشاط (14):

وازن بطريقة تغيير رقم الأكسدة المُعادلة الآتية في وسطٍ أساسيٍ:



تعلّمت

- يُسمى المعدن وأيونه، الزوج مؤكسد / مرجع ، ويعبر عنه بالشكل M/M^{n+} .
- ازدياد قوّة العامل المؤكسد والعامل المرجع للأزواج M/M^{n+} وفق النشاط الكيميائي لكلّ منها.
- رقم الأكسدة: هو عدد الشحنات الكهربائية التي تحملها الذرة في المركبات الأيونية والمُستَرَكة.
- قواعد تعيين أرقام الأكسدة:
 - * رقم أكسدة العنصر الحر يساوي الصفر.
 - * رقم أكسدة الأيون البسيط يساوي مقدار شحنته.
 - * مجموع أرقام أكسدة عناصر مركب يساوي صفر.
 - * مجموع أرقام الأكسدة للعناصر في الأيون المركب يساوي مقدار شحنته.
 - * رقم أكسدة معدن في مركباته يساوي قيمة تكافؤه مسبوقة بإشارة (+).
 - * رقم أكسدة الهيدروجين في مركباته (1+)، عدا هيدريدات المعادن (-1).
 - * رقم أكسدة الأكسجين في مركباته (-2)، عدا فوق الأكسيد (-1)، والأكسيد العليا ($\frac{1}{2}-$)، ومع الفلور يأخذ (2+).
- مفهوم الأكسدة والإرجاع وفق تغيير رقم التأكسد:
 - * يزداد رقم أكسدة عنصر في تفاعل الأكسدة.
 - * ينقص رقم أكسدة عنصر في تفاعل الإرجاع.
 - * العامل المرجع يزداد رقم أكسدته.
 - * العامل المؤكسد ينقص رقم أكسدته.

موازنة تفاعلات الأكسدة وإرجاع

طريقة تغيير رقم الأكسدة	طريقة انصاف التفاعل	كتابه نصفي تفاعل الأكسدة والإرجاع
تحديد نصفي تفاعل الأكسدة والإرجاع وفق مفهوم رقم الأكسدة، وحساب التغيير بين رقمي الأكسدة لكلّ منها.	في الوسط الأساسي <ul style="list-style-type: none"> - تحقيق قانون مصونية الكتلة، حيث تتم موازنة الأكسجين بإضافة H_2O، وموازنة الهيدروجين بإضافة H^+ - إضاف طرف المعادلة عدد من أيونات OH^- تساوي عدد أيونات H^+ حيث يُشكّل H_2O - يكتب الشكل المختصر. 	في الوسط الحمضي <ul style="list-style-type: none"> - تحقيق قانون مصونية الكتلة، حيث تتم موازنة الأكسجين بإضافة O_2، وموازنة الهيدروجين بإضافة H^+.
مساواة التغيير في رقم الأكسدة.	تحقيق قانون مصونية الشحنة بإضافة إلكترونات.	مساواة عدد الإلكترونات المفقودة بعد إلكترونات المكتسبة بالضرب بالأمثال.
موازنة الأكسجين بحسب طبيعة الوسط (الحمضي أو الأساسي).		جمع المعادلين، ثم الاختصار.



أولاً: اختار الإجابة الصحيحة لكلٌ مما يأتي:

1. رقم أكسدة المanganizer في الأيون MnO_4^- يساوي:

- +7 .d +5 .c +3 .b +1 .a

2. يبلغ عدد الإلكترونات التي يفقدها الألمنيوم في التفاعل الآتي:

$$2Al_{(s)} + 3Cl_{2(g)} \longrightarrow 2AlCl_{3(s)}$$

6 .d 3 .c 2 .b 1 .a

3. المركب الذي يأخذ فيه عنصر الكلور أعلى رقم أكسدة له من المركبات الآتية هو:

- $KClO_3$.d $NaOCl$.c HCl .b $HClO_4$.a

4. رقم أكسدة عنصر الألمنيوم في مركب أكسيد الألمنيوم يساوي:

- +3 .d -3 .c +2 .b +1 .a

5. عند وضع قطعة من معدن النحاس في بישر، يحتوي على محلول كبريتات الزنك، تركيزه 1 mol.L^{-1} ، فإنه:
a. يتآكسد الزنك. b. يرجح التحاس. c. يتربّس الزنك. d. لا يطرأ عليه أي تغيير.

ثانياً: لديك تفاعلاً للأكسدة والإرجاع الآتي:



المطلوب:

- a. اكتب الزوجين مؤكسد والعامل المرجع. b. حدد العامل المؤكسد والعامل المرجع.




ثالثاً: احسب رقم أكسدة عنصر النتروجين في كلٍ من المركبات الآتية:

- NO_2 .e $NaNO_2$.d HNO_3 .c Mg_3N_2 .b NH_3 .a

رابعاً: احسب رقم أكسدة العنصر الذي تحته خطٌ في كلٌ مما يأتي:

- $LiAlH_4$.f H_2O_2 .e $NaBrO_3$.d $C_2O_4^{2-}$.c MnO_4^- .b P_2O_5 .a

خامساً: حدد تفاعلات الأكسدة والإرجاع من بين التفاعلات الآتية:





سادساً: لديك الزوجان المعدنيان Ag/Ag^+ ، Pb/Pb^{2+} . المطلوب:

1. اكتب نصفي تفاعل الأكسدة والإرجاع المعتبرين عن تفاعل كلّ منهما، اعتماداً على السلسلة الكهركيميائية.
2. حدد العامل المؤكسد والعامل المرجع.
3. استنتج المعادلة الممثلة للتفاعل الكلّي الحاصل.

سابعاً: وازن المعادلتين الآتيتين، اعتماداً على مفهومي الأكسدة والإرجاع في وسطٍ حمضي:



ثامناً: وازن المعادلتين الآتيتين، اعتماداً على مفهومي الأكسدة والإرجاع في وسطٍ أساسي:



تفكر ناقد


يأخذ النتروجين في مركب نترات الأمونيوم NH_4NO_3 رقمي أكسدة، ما هما؟

أبحث أكثر



للكروم أرقام أكسدة مختلفة، فالكروم السادس لونه برتقالي، بينما الكروم الثلاثي لونه أخضر، لذلك تميّز مركبات الكروم بالألوان المختلفة، لهذا اشتقت اسم العنصر من الكلمة اليونانية chroma التي تعني اللون.

أبحث في سبب تشكّل الألوان المختلفة في محليل الكروم.



2

الزوج الهدروجيني



يقع البحر الميت بين الأردن وفلسطين المحتلة. لماذا سمّي بالبحر الميت؟ وما الفرق بين ملوحة مياهه وملوحة مياه البحر الأبيض؟

الأهداف:

- * يحسب تركيز محلول الحمض.
- * يتعرّف درجة الحموضة أو ما يُدعى الأُس الهدروجيني (pH).
- * يحضر بعض المحاليل الحمضية المُمددة.
- * يتعرّف تأثير المحاليل الحمضية على المعادن.
- * يستنتج الزوج الهدروجيني $\cdot H_2/2H^+$.
- * يستنتاج عدد المولات الإلكترونية في تفاعل الأكسدة والإرجاع.

الكلمات المفتاحية:

- * التركيز.
- * التركيز الغرامي.
- * التركيز المولي.
- * الأُس الهدروجيني (pH).

تحضير المحلول الممددة

أُجْرِبْ وأُسْتَنْجْ (1):

المواد والأدوات الالزامية:

حوجلة عدد 2/ - ماء مقطر - ميزان إلكتروني - أسطوانة مدرجة - ملح كبريتات النحاس II.

خطوات التجربة

- أضع في كل من الحوجلتين 100 mL من الماء المقطر.
- أزن بدقة كتلة 5.0 g من كبريتات النحاس II المائية، وأضيفها إلى الحوجلة الأولى. ماذا ألاحظ؟
- أزن بدقة كتلة 10.0 g من كبريتات النحاس II المائية ، وأضيفها إلى الحوجلة الثانية. ماذا ألاحظ؟



- أقارن بين لوني المحلولين الناتجين.
- أسئل ما سبب تباين اللون الأزرق في الحوجلتين.

أُسْتَنْجْ:

المحلول: هو مزيج متجلسان من مادتين نقبيتين، إحداهما تدعى المذيب (المحلل)، وهي ذات الكمية الأكبر، والأخر المذاب (الم محلل) وهي ذات الكمية الأقل.

التركيز: نسبة كمية المادة المُحللة في كمية محددة من المادة المُحللة.

- التركيز الغرامي: عدد غرامات (كتلة) المادة المُحللة في لتر واحد من المحلول.

$$C_{(g.L^{-1})} = \frac{m_{(g)}}{V_{(L)}}$$

حيث (m) كتلة المادة، (V) حجم المحلول.

- التركيز المولى: عدد مولات المادة المُحللة في لتر من المحلول.

$$C(\text{mol}.L^{-1}) = \frac{n(\text{mol})}{V(L)}$$

حيث (n) عدد المولات، (V) حجم المحلول.

- يمكن حساب عدد المولات من العلاقة:


$$n(\text{mol}) = \frac{m(g)}{M(g.\text{mol}^{-1})}$$

حيث (m) كتلة المادة، M الكتلة المولية للمادة.

تطبيق (1):

يُذاب 15.95 g من كبريتات النحاس II اللامائية في الماء المقطر، ثم يُكمَل الحجم إلى 500 mL. المطلوب حساب:

1. التركيز الغرامي لمحلول كبريتات النحاس II الناتج.
2. التركيز المولى لمحلول كبريتات النحاس II الناتج.



الحل:

$$C = \frac{m}{V} = \frac{15.95}{500 \times 10^{-3}} = 31.9 \text{ g.L}^{-1} .1$$

$$\begin{aligned} n &= \frac{m}{M} = \frac{15.95}{159.5} = 0.1 \text{ mol} \\ C &= \frac{n}{V} = \frac{0.1}{0.5} = 0.2 \text{ mol.L}^{-1} \end{aligned} .2$$

الأُس الهيدروجيني pH :

أُجْرِب وأسْتَنْتِج (2):

المواد والأدوات الازمة:

كأس زجاجي /بيشر/، محلول حمض كلور الماء، مقياس pH، ماء مقطر.

خطوات التجربة:

- أضَعُ في أنبوب اختبار 10 mL من محلول حمض كلور الماء، تركيزه $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.
- أقيِّس درجة pH للمحلول، باستخدام مقياس pH.
- أكِمِلُ الحجم بالماء المقطر إلى 100 mL.
- أقيِّس الأُس الهيدروجيني، باستخدام مقياس pH.



تركيز الحمض (mol.L^{-1})	الأُس الهيدروجيني pH
2	10^{-2}
3	10^{-3}

جدولٌ يبيّن قيم الأُس الهيدروجيني pH للحمض المستعمل.

أفسّر النتائج السابقة:

1. يتأيّد حمض كلور الماء كلياً بالماء وفق المعادلة:



$$1 \text{ mol} \quad 1 \text{ mol} \quad 1 \text{ mol}$$

$$n_{(\text{HCl})} \quad n_{(\text{H}_3\text{O}^+)}$$

$$n_{(\text{HCl})} = n_{(\text{H}_3\text{O}^+)}$$

وبما أنَّ الحجم ذاته للمحلول:


$$C_{(\text{HCl})} = C_{(\text{H}_3\text{O}^+)}$$

فيكونُ:

$$\text{قبل التمديد} \quad C_{(\text{HCl})} = C_{(\text{H}_3\text{O}^+)} = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$\text{بعد التمديد} \quad C_{(\text{HCl})} = C_{(\text{H}_3\text{O}^+)} = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$$

أستنتج: تركيز أيونات الهدرونيوم يساوي $10^{-\text{pH}}$, أي: $C_{(\text{H}_3\text{O}^+)} = 10^{-\text{pH}}$



تأخذُ الـ pH قيمًا تراوحُ بين (0 — 14) في درجة الحرارة 25°C.

تطبيق (2):

يوضع 10 mL من محلول حمض الأزوت، تركيزه 0.1 mol.L^{-1} في وعاء، ثم يضاف إليه 90 mL ماءً مقطّرًا.
المطلوب حساب:

- تركيز محلول حمض الأزوت الناتج.
- قيمة pH محلول الناتج.

الحل:

1. ينقص تركيز المحلول عند زيادة حجمه مع بقاء عدد المولات ذاته.

$$n_{\text{بعد}} = n_{\text{قبل}}$$

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

$$0.1 \times 10 = C_2(10 + 90)$$

$$C_2 = 0.01 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

$$C_{\text{H}_3\text{O}^+} = 10^{-\text{pH}}$$

.2

$$C_{\text{HNO}_3} = C_{\text{H}_3\text{O}^+} = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$$

بالمقارنة نجد أن: $\text{pH} = 2$

: نشاط (1)

احسب pH لمحلول حمض قوي وحيد الوظيفة HA تركيزه $10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

إثراء:



يتغيّر لون زهرة *hydrangea* shrub بتغيير pH التربة، حيث يمكنك تغيير لونها بإضافة أسمدة حمضيّة أو أساسية.

النحوه الهدروجيني $\text{H}_2/2\text{H}^+$

أجّرب وأستنتج (3):

المواد والأدوات اللازمة:

محلول حمض الكبريت المُمدّد، أنابيب اختبار، قطع صغيرة من الحديد والزنك والنحاس، حاملة أنابيب.

خطوات التنفيذ:

- أضع في ثلاثة أنابيب كميات متساوية من محلول حمض الكبريت المُمدّد.
- أضيف إلى الأنابيب الأولى قطعة حديد، وإلى الأنابيب الثانية قطعة زنك، وإلى الأنابيب الثالثة قطعة نحاس. ماذالاحظ؟
- أقرب عود ثقاب مشتعلًا من فوهة كلّ أنابيب. ماذالاحظ؟



الاحظُ:

- تَفَاعُل قطعة الحديد مع ظهور اللون الأخضر الفاتح، وانطلاق غاز.
- تَفَاعُل قطعة الزنك، وانطلاق غاز.
- لا يحدث أي تغيير في الأنابيب الثالث.
- احتراق الغاز المنطلق مُتَرافقاً بفرقعة، في كل من الأنابيب الأولى والثانية.

أَسْتَنْتَجُ:

- لا يتفاعل حمض الكبريت المُمدد مع التحاس.
$$(2H^+ + SO_4^{2-}) + Cu \longrightarrow X$$
 لا يحدث تَفَاعُل
- يتفاعل حمض الكبريت المُمدد مع كل من الحديد والزنك، وينطلق غاز الهيدروجين، وفق المعادلين الآتيين:
$$(2H^+ + SO_4^{2-}) + Fe \longrightarrow (Fe^{2+} + SO_4^{2-}) + H_2 \quad .1$$



- يتأكسد الحديد ويرجع الهيدروجين:
 - نصف تَفَاعُل الأكسدة: $Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2e^-$
 - نصف تَفَاعُل الإرجاع: $2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2$
- يتأكسد الزنك ويرجع الهيدروجين:
 - نصف تَفَاعُل الأكسدة: $Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e^-$
 - نصف تَفَاعُل الإرجاع: $2H^+ + 2e^- \longrightarrow H_2$

- كل 1 mol من ذرات الحديد أو الزنك تمنح 2 mol من الإلكترونات، وكل 2 mol من أيون الهيدروجين يكتسب 1 mol من الإلكترونات لتشكيل 1 mol من غاز الهيدروجين، ويكون عدد مولات الإلكترونات الممنوعة تساوي عدد مولات الإلكترونات المكتسبة.
- في التفاعل الأول: الزوجين مؤكسد / مرجع، هما: Fe/Fe^{2+} ، $\text{H}_2/2\text{H}^+$
- في التفاعل الثاني: الزوجين مؤكسد / مرجع، هما: Zn/Zn^{2+} ، $\text{H}_2/2\text{H}^+$
- الزوج $\text{H}_2/2\text{H}^+$ يسمى بالزوج الهيدروجيني.

نشاط (2)

اكتب معادلتي نصفي التفاعل أكسدة إرجاع لتفاعل المغنتزيوم مع حمض كلور الماء الممدد. ثم حدد الأزواج مؤكسد / مرجع.

تعلمت

- التركيز الغرامي: عدد غرامات (كتلة) المادة المنحلّة في لتر واحد من محلول.
$$C = \frac{m}{V} (\text{g.L}^{-1})$$
- التركيز المولى: عدد مولات المادة المنحلّة في لتر من محلول.
$$C = \frac{n}{V} (\text{mol.L}^{-1})$$
- تركيز أيونات الهيدرونيوم يساوي: $C_{(\text{H}_3\text{O}^+)} = 10^{-\text{pH}}$
- تتراوح قيمة pH بين (0 ← 14) في درجة الحرارة 25°C.
- تحضير المحاليل الممددّة لمادة ما، بإضافة كمية من الماء المقطر لمحلول مركزٍ من هذه المادة.
- يسمى الزوج $\text{H}_2/2\text{H}^+$ بالزوج الهيدروجيني.



أولاًً - اختر الإجابة الصحيحة لكلّ مما يأتي:

1. يذاب 0.56 g من هدروكسيد البوتاسيوم في الماء المقطر، ويكمّل الحجم إلى 200 mL، فيكون تركيز المحلول الناتج مقداراً بـ mol.L⁻¹ مساوياً: (K:39, H:1, O:16)

- 0.5 .d 0.05 .c 0.2 .b 0.02 .a

2. محلول حمض كلور الماء، تركيزه 3.65 g.L⁻¹، تكون قيمة pH لمحلول هذا الحمض متساوية: (H:1, Cl:35.5)

- 1 .d 2 .c 3 .b 2.5 .a

3. تُمدد محلول حمضي قويٌّ وحيد الوظيفة الحمضية عشر مراتٍ، فإنَّ قيمة pH للمحلول الناتج: a. تنقص بمقدارٍ واحدٍ. b. تزداد بمقدارٍ واحدٍ c. تزداد مرتين d. تنقص مرتين

4. المعادن الأقل قدرةً إرجاعيةً من الهدروجين من المعادن الآتية هو:

- Na .d Fe .c Al .b Cu .a

5. العلاقة بين التركيزين ($C(g.L^{-1})$, $C(mol.L^{-1})$) هي:

$$C(mol.L^{-1}) = \frac{M}{C(g.L^{-1})} .b \quad C(g.L^{-1}) = \frac{C(mol.L^{-1})}{M} .a$$

$$C(mol.L^{-1}) = \frac{C(g.L^{-1})}{m} .d \quad C(g.L^{-1}) = C(mol.L^{-1}) \times M .c$$

ثانياً: أجب عن السؤال الآتي:

نضع كمية من مسحوق الزنك في حوجلة ونضيف لها كمية كافية من حمض كلور الماء المتمدد. المطلوب:

1. اكتب معادلة التفاعل الحاصل.
2. اكتب نصفي تفاعل الأكسدة - إرجاع.
3. اكتب الزوجين مؤكسد/مرجع.
4. حدد عدد مولات الإلكترونات المتبادلة في التفاعل السابق.

ثالثاً: حل المسألتين الآتتين:

المسألة الأولى:

تفاعل كمية كافية من مسحوق المغنتزيوم مع 200 mL من محلول حمض الكبريت المتمدد، فينطلق غازٌ حجمه 224 mL مقاساً في الشرطين النظاميين. المطلوب:

- 1 - اكتب معادلة التفاعل الحاصل.
2 - احسب تركيز الحمض السابق مقداراً بـ (g.L⁻¹, mol.L⁻¹, g.L⁻¹, mol.L⁻¹).
3 - احسب قيمة pH لمحلول الحمض المستعمل، بفرض أنَّ حمض الكبريت يتآكل بشكلٍ تام.
(Mg: 24, H: 1, S: 32, O: 16)

المسألة الثانية:

- لديك محلول حمض بروميد الهدروجين HBr (حمض قوي تام التأين)، تركيزه 0.1 mol.L^{-1} . المطلوب:
- اكتب معادلة تأين هذا الحمض.
 - احسب تركيز أيون الهدرونيوم H_3O^+ ، وقيمة pH محلول هذا الحمض.
 - احسب حجم الماء المقطر اللازم إضافته إلى 10 mL من الحمض السابق لتصبح $\text{pH} = 3$.


تفكير ناقد

يُستخدم هيدروكسيد الصوديوم في صناعة الصابون من خلال إضافته للزّيوت، ومن أجل ذلك يطلب تحضير محلول من هيدروكسيد الصوديوم حجمه 10 L بتركيز 0.1 mol.L^{-1} . بِّين خطوات تحضير المحلول، واحسب كتلة هيدروكسيد الصوديوم الازمة لذلك.

أبحث أكثر

تم توثيق أضرار الأمطار الحامضية، على الغابات والصخور والمباني. ابحث في مكتبة مدرستك، أو في الشبكة عن سبب هذه الظاهرة، وكيفية تفادي أضرارها.





3

الخلية الغلفانية



التطور المتسارع للتكنولوجيا في مجتمعنا الحديث، أدى لتزايد الحاجة إلى الأجهزة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ولكن بقيت مشكلة تزويدها المستمر بالطاقة، فكان أفضل الحلول هي الخلايا الغلفانية.

الأهداف:

- * يَتَعَرَّفُ على الخلية الغلفانية.
- * يَكتَشِفُ دورَ الجسر الملحي في الخلية الغلفانية.
- * يَحْسَبُ القوَّةَ المُحرِّكَةَ الكهربائية للخلية الغلفانية.
- * يَتَعَرَّفُ نصفَ الخلية الغلفانية والتمثيل الرمزي لها.
- * يَتَعَرَّفُ مَسْرِيَ الْهَدْرُوجِينِ القياسي.
- * يَقْسِمُ كمُونَ الإِرْجَاعِ لِأَنْصَافِ الخلايا الغلفانية اعتماداً على مَسْرِيَ الْهَدْرُوجِينِ.
- * يُحدِّدُ قطبَيَ الخلية الغلفانية.

الكلمات المفتاحية:


- * الخلية الغلفانية.
- * نصف الخلية.
- * كمون المسرى.
- * الجسر الملحي.
- * كمون الإرجاع القياسي.
- * مسرى الهدروجين القياسي.

الخلية الغلافية البسيطة (خلية دانيال)



جون فردرريك دانيال 1790 – 1845
عالم فيزيائي كيميائي إنكليزي الأصل،
قام بابحاث عديدة حول طرائق
إنتاج الكهرباء من خلال التفاعلات
الكيميائية وتوصل إلى اختراع أول
بطارية كهركيمائية، هي خلية دانيال

عند تفاعل الزنك مع محلول كبريتات النحاس ألاحظ:
تتأكسد صفيحة الزنك في محلول كبريتات النحاس II، وفق التفاعل:



تنقل الإلكترونات من الزنك إلى أيون النحاس بشكل مباشر، وفق نصفي التفاعل:



يقوم الزنك بدور المُرجع وأيون النحاس بدور المؤكسد.



خلايا دانيال التي تم صنعها عام 1836
محفوظة في المتحف الدولي للتاريخ الأمريكي بوشنطن

أسئلة:

هل يمكن انتقال الإلكترونات بطريقة غير مباشرة من العامل المُرجع إلى العامل المؤكسد؟

أُجِّرَب وأُسْتَنْتَج (1):

الأدوات والمواد الازمة:

صفيحة نحاس - صفيحة زنك - كأس زجاجي /بيشر/ عدد 2/ - أسلاك توصيل - مصباح مناسب - مقياس آفومتر (AVO) - أنبوب زجاجي أو بلاستيكي على شكل U - قطن - محاليل مركزة من كلوريد البوتاسيوم وكبريتات النحاس وكبريتات الزنك.

خطوات التجربة:

- أضع محلول كبريتات النحاس II في البيشر الأول، ثم أغمس فيه صفيحة النحاس.
- أضع محلول كبريتات الزنك في البيشر الثاني، ثم أغمس فيه صفيحة الزنك.

- أضْعُ مَحْلُولَ كُلُورِيدِ الْبُوتَاسِيُومَ فِي الأَنْبُوبِ الرِّجَاجِيِّ عَلَى شَكْلِ U ، وَأَغْلُقُ طَرْفَيْهِ بِقَطْعَتَيْ قَطْنٍ (جَسْرٌ مَلْحِيٌّ) ، ثُمَّ أَغْمَسْ كُلَّ طَرْفٍ فِي بِيشِرٍ.

- أَصْلُ الدَّارَةِ كَمَا فِي الشَّكْلِ الْأَتَيِّ ، مَاذَا لَاحِظَ ؟

- أَرْفَعُ الْجَسْرَ الْمَلْحِيَّ مِنَ الْبِيشِرِيْنِ ، مَاذَا لَاحِظَ ؟

اللَّاحِظُ وَأَسْتَنِجُ :

- عَنْدَ وَصْلِ الدَّارَةِ يُضَيِّعُ الْمِصْبَاحُ نَتْيَاهَةً اِنْتِقالِ الْإِلْكْتَرُونَاتِ مِنْ خَلَالِ سُلْكِ التَّوْصِيلِ الْكَهْرَبَائِيِّ بَيْنَ صَفِيَّحَةِ الزَّنْكِ وَصَفِيَّحَةِ النَّحْاسِ.

- تَعُودُ حَرَكَةُ الْإِلْكْتَرُونَاتِ نَتْيَاهَةً وَجُودُ فَرْقٍ كَمَوْنٍ كَهْرَبَائِيٍّ بَيْنَ ثَانِيَّةِ صَفِيَّحَةِ الزَّنْكِ فِي مَحْلُولِهِ (Zn/Zn^{2+}) ، وَثَانِيَّةِ النَّحْاسِ فِي مَحْلُولِهِ (Cu/Cu^{2+}) الَّتِينَ تَشَكَّلُانِ مَسَرِّيَّ الْخَلِيلَةِ الْغَلْفَانِيَّةِ.

- يَنْطَفِئُ الْمِصْبَاحُ الْكَهْرَبَائِيُّ عَنْدَ إِزَالَةِ الْجَسْرِ الْمَلْحِيِّ .
وَتَعُودُ أَهْمَيَّةُ الْجَسْرِ الْمَلْحِيِّ إِلَى أَنَّهُ :

- يَحْقُّقُ التَّوازُنُ الْأَيُونِيُّ فِي كُلَّ الْمَحْلُولَيْنِ .

- يَمْنَعُ اِخْتِلاَطَ أَيُونَاتِ مَحْلُولِيِّ نَصْفِيِّ الْخَلِيلَةِ بِعَضِيهِمَا .

- يَقُومُ بِدُورِ موَصِّلِ كَهْرَبَائِيِّ .

يُمْكِنُ اِسْتِبَدَالُ الْجَسْرِ الْمَلْحِيِّ بِغَشَاءِ نَصْفِ نَفْوِيِّ .



اضاءة

غَشَاءُ نَصْفِ النَّفْوِيِّ : نَوْعٌ مِنَ الْأَغْشِيَةِ الْحَيَوِيَّةِ أَوِ الصَّنِاعِيَّةِ ، يُسَمِّحُ بِعُبُورِ الْجَزِيَّاتِ أَوِ الْأَيُونَاتِ خَلَالَهُ عَنْ طَرِيقِ الْاِنْتِشَارِ ، يَعْتَمِدُ مُعَدَّلُ اِنْتِشَارِ الْمَوَادِ النَّافِذَةِ عَلَى الضَّغْطِ ، وَدَرْجَةِ الْحَرَارَةِ ، وَعَلَى تَرْكِيزِ الْجَزِيَّاتِ فِي الْمَحْلُولِ عَلَى طَرْفِيِّ الْغَشَاءِ ، بِالْإِضَافَةِ إِلَى درَجَةِ نَفْوِيَّتِهِ بِالنَّسْبَةِ لِهَذِهِ الْجَزِيَّاتِ .


عَنْدَ اِخْتِلَافِ التَّرْكِيزِ بَيْنَ طَرْفَيِّ الْغَشَاءِ تَتَجَهُ الْأَيُونَاتُ نَحْوَ الطَّرْفِ الْأَقْلَلِ تَرْكِيزًاً تَحْتَ تَأْثِيرِ الضَّغْطِ الْأَسْمُوزِيِّ .

أُجْرَبُ وَأَسْتَنِجُ (2) :


أَعِيدُ إِجْرَاءَ التَّجْرِيْبِ السَّابِقَةِ ، بِاسْتِبَدَالِ الْمِصْبَاحِ الْكَهْرَبَائِيِّ ، بِمَقْيَاسِ افُومِترِ (مَقْيَاسِ فُولْتِ) ، مَاذَا لَاحِظَ ؟




الأخطاء:



تأكل صفيحة الزنك
وفق نصف التفاعل التالي:



ترسب النحاس على صفيحة النحاس
وفق نصف التفاعل التالي:



المعادلة الكلية التي تحدث بالخلية:



أستنتج:

- دلالة مقياس الأفومتر تدل على قيمة فرق في الكمون بين المسرعين، ويُدعى بالقوّة المُحرّكة الكهربائية.
- تدل القيمة الموجبة لفرق الكمون على مرور تيار كهربائي متواصل، جهّه من صفيحة النحاس إلى صفيحة الزنك، حيث يحدث تفاعلاً أكسدة لصفيحة الزنك، وتفاعلاً إرجاعاً لأيونات النحاس، وتنقل الإلكترونات بطريقة غير مباشرة من صفيحة الزنك إلى صفيحة النحاس.

أتساءٌ

لماذا يشير مقياس أفومتر إلى فرق كمون ثابت يساوي $V = 1.10$ بين صفيحة الترّنك والتحاس. رتب العلماء الثنائيات (M/M^{n+}) بحسب كمون إرجاعها في الشروط القياسية، وفق جدول سُمي بكمون الإرجاع القياسي.

الكمون القياسي مقدراً بالفولط (V)	نصف خلية الإرجاع (المهبط)
-3.04	$\text{Li}_{(aq)}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Li}_{(s)}$
-2.71	$\text{Na}_{(aq)}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Na}_{(s)}$
-2.38	$\text{Mg}_{(aq)}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mg}_{(s)}$
-1.66	$\text{Al}_{(aq)}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al}_{(s)}$
-0.83	$2\text{H}_2\text{O}_{(l)} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_{2(g)} + 2\text{OH}_{(aq)}^-$
-0.76	$\text{Zn}_{(aq)}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}_{(s)}$
-0.74	$\text{Cr}_{(aq)}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}_{(s)}$
-0.41	$\text{Fe}_{(aq)}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}_{(s)}$
-0.40	$\text{Cd}_{(aq)}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cd}_{(s)}$
-0.23	$\text{Ni}_{(aq)}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ni}_{(s)}$
-0.14	$\text{Sn}_{(aq)}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sn}_{(s)}$
-0.13	$\text{Pb}_{(aq)}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}_{(s)}$
-0.04	$\text{Fe}_{(aq)}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}_{(s)}$
0.00	$2\text{H}_{(aq)}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_{2(g)}$
0.15	$\text{Sn}_{(aq)}^{4+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sn}_{(aq)}^{2+}$
0.16	$\text{Cu}_{(aq)}^{2+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}_{(aq)}^+$
0.34	$\text{Cu}_{(aq)}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}_{(s)}$
0.52	$\text{Cu}_{(aq)}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}_{(s)}$
0.54	$\text{I}_{2(s)} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{I}_{(aq)}^-$
0.77	$\text{Fe}_{(aq)}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}_{(aq)}^{2+}$
0.80	$\text{Hg}_{2(aq)}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Hg}_{(l)}$
0.80	$\text{Ag}_{(aq)}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}_{(s)}$
0.85	$\text{Hg}_{(aq)}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Hg}_{(l)}$
0.90	$2\text{Hg}_{(aq)}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Hg}_{2(aq)}^{2+}$
1.07	$\text{Br}_{2(l)} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Br}_{(aq)}^-$
1.23	$\text{O}_{2(g)} + 4\text{H}_{(aq)}^+ + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}_{(l)}$


بالاعتماد على الجدول السابق نجد:

- كمون الإرجاع للزنك (Zn/Zn^{2+}) يساوي $V -0.76$ ، وهو أصغر من كمون إرجاع النحاس (Cu/Cu^{2+}) الذي يُساوي $+0.34 V$.
- يمثل الزوج (Zn/Zn^{2+}) نصف خلية غلفانية، يحدث عنده تفاعل الأكسدة، ويلعب دور المصدع، لأنَّ كمون إرجاعه هو الأصغر.
- يمثل الزوج (Cu/Cu^{2+}) نصف خلية غلفانية، يحدث عنده تفاعل الإرجاع، ويلعب دور المهبط، لأنَّ كمون إرجاعه هو الأكبر.
- القيمة الناتجة على مقياس آفومتر بطرح قيمتي كموني الإرجاع السابقين، والتي تمثل القوة المحرّكة الكهربائية للخلية الغلفانية E .

$$E = +0.34 - (-0.76) = 1.10 \text{ V}$$

أستنتج:

- الخلية الغلفانية: جملة مؤلفة من صفيحتين معدنيتين مختلفتين، عُمسَت كلُّ منها في محلولٍ يحوي أيوناتها، لتشكل مسرى (إلكترود)، يصلُ بين المحلولين فيها جسرٌ ملحيٌ.
 - يحدث في الخلية الغلفانية تفاعل أكسدة وإرجاع تلقائي ينتج عنه تيارً كهربائيًّا.
 - قيمة القوة المحرّكة للخلية الغلفانية تتعلق بنوع نصف الخلية المكونين لها.
 - تُحسب القوة المحرّكة للخلية الغلفانية بالعلاقة:
- $$E^{\circ} = E^{\circ}_{\text{إرجاع}} - E^{\circ}_{\text{(مهبط)}}$$
- خليّة
- تمثّل الخلية الغلفانية الكهربائية بالشكل الآتي:



إثراء:

ثعبان البحر الكهربائي: يعيش هذا الثعبان في قارة أمريكا الجنوبيّة، يملك هذا الثعبان خلايا تستطيع إنتاج الكهرباء، وذلك من خلال اختلاف تركيز أيوني Na^+ و K^+ . حيث تولد كل خلية قوةً محرّكةً كهربائيةً مقدارها 0.1 V . ومن خلال ربط آلاف الخلايا على الجلد يستطيع توليد نبضةً كهربائيةً قصيرةً تفوق 500 V ، يستخدمها للدفاع فيها عن نفسه ومحاجمة طرائده.



إثراء: ★

خلية بغداد


في شهر حزيران من عام 1936 ، وفي أثناء الأعمال الإنسانية لخطوط سكة الحديد في العراق قريراً من بغداد، وُجدت مقابر أثرية، فيها الكثير من القطع التي نقلت إلى المتحف العراقي، في عام 1940 جذبت هذه القطع انتباه عالم الآثار ويليم كونيك الذي فجر مفاجأة حين نشر مقالاً عن هذه القطع، بأنها قد تكون خلايا غلفانية استخدمت لتوليد كمياتٍ صغيرةٍ من الكهرباء، يعتقد أنها استُخدِمت في عمليات طلاء الفضة بالذهب في ذلك الوقت.

القطع الأثرية المكتشفة كانت لجرار خفيف بفتحة دائرة في أعلى كل جرّة. ووُجد أيضاً أسطوانات مصنوعة من صفائح النحاس تحيط بقضبان من الحديد. ووُجد في الأعلى أنَّ القضبان الحديدية معزولة عن النحاس بواسطة سداداتٍ من الإسفلت (القار)، ويُعتقد أنَّ السوائل التي كانت تُستخدم في داخل هذه البطارية هي سوائل حمضية من عصارة الليمون أو العنب أو الخل.



إثراء: ★


أحياناً عندما يُضغط على قطعة الألミニوم بضرس تم إصلاحه، بوضع حشوة في داخل الضرس يدخل في تركيبها أحد العناصر الآتية (الفضة - القصدير - الزئبق).



ينتج تيار كهربائي، نتيجة تشكُّل خلية غلفانية مكونة من الألミニوم (المصد) والخشوة المعدنية (مهبط) وللعاب محلول الناقل بينهما. يُتسبّب بألم ومعانٍ في هذا الضرس، نتيجة مرور تيار كهربائي صغير يصل إلى عصب الضرس مُسبباً هذا الألم.

تطبيق (1):

الخلية غلفارنية موضحة بالشكل الآتي:



بالاعتماد على جدول كمونات الإرجاع القياسيّة:

1. أُحدِّدُ كلّ من المصدُّع والمهْبَط.
2. أُحْسِبُ القوَّةُ المُحرِّكَةُ الكهربائيَّةُ لِهَذِهِ الْخَلِيَّةِ الغلفارنية.
3. أَكْتُبُ الرَّمْزُ الَّذِي يُمثِّلُ الْخَلِيَّةَ السَّابِقَةَ، وَأَحدِّدُ الْقَطْبَيْنَ الْمُوجِّبِ وَالسَّالِبِ.

الحل:

1. المصدُّع هو مَسْرِيُّ الْحَدِيدِ، وَالمهْبَطُ مَسْرِيُّ النَّحَاسِ.

$$E_{\text{خلية}}^{\circ} = E_{\text{إرجاع}}^{\circ} - (E_{\text{مصدُّع}}^{\circ} - E_{\text{إرجاع}}^{\circ})$$

$$E_{\text{(cell)}}^{\circ} = 0.34 - (-0.41) = 0.75 \text{ V}$$

تَدَلِّلُ إِشَارَةُ الْمُوجَّةِ لِلقوَّةِ المُحرِّكَةِ الكهربائيَّةِ عَلَى أَنَّ تَفَاعُلَ الأُكْسَدَةِ وَالإِرجَاعِ تَلَقَّائِيٌّ.

$$3. \quad \text{Fe}/\text{Fe}^{2+} \parallel \text{Cu}^{2+}/\text{Cu}$$

يُمثِّلُ المَسْرِيُّ Cu^{2+}/Cu الْقَطْبَ الْمُوجِّبَ، أَمَّا المَسْرِيُّ Fe/Fe^{2+} فَيُمثِّلُ الْقَطْبَ السَّالِبِ.

تطبيق (2):

تتألف خلية غلافانية من مسرى التحاس والفضة، وبالاعتماد على جدول كمونات الإرجاع القياسية.

1. أكتب معادلتي نصفي التفاعل الحادثين، وأستنتج معادلة التفاعل الكلي.

2. أمثل الخلية السابقة، وأحدد كلاً من المصعد، والمهبط، وجهة التيار.

3. أحسب القوة المحرّكة الكهربائية لهذه الخلية.


الحل:

1. قيمة كمون الإرجاع القياسية لكلٍ من مسرى الخلية:

$$\text{Ag}/\text{Ag}^+ = 0.80 \text{ V}$$

$$\text{Cu}/\text{Cu}^{2+} = 0.34 \text{ V}$$


أستنتاج: الفضة أقل نشاطاً كيميائياً من التحاس، لذلك سيرجع الفضة (يتربّس معدن الفضة)، ويشكل المهبط، بينما يتآكسد التحاس، وتشكل صفيحة التحاس المصعد، في هذه الخلية.



أجمع المعادلين بعد المساواة بعد الإلكترونات، للحصول على معادلة التفاعل الكلي:



2. رمز الخلية الغلافانية:



- يمثل المسرى Ag^+/Ag القطب الموجب، أمّا المسرى Cu^{2+}/Cu فيمثل القطب السالب.


- تنتقل الإلكترونات من مسرى التحاس إلى مسرى الفضة خارج الخلية. وبالتالي تكون جهة التيار الكهربائي من مسرى الفضة (مهبط)، إلى مسرى التحاس (المصعد).

3. قيمة كمون الخلية يُحسب بالعلاقة:

$$E_{\text{خلية}}^\circ = E_{\text{إرجاع}}^\circ - E_{\text{(مهدٌ)}}^\circ$$

$$E_{\text{(cell)}}^\circ = 0.80 - 0.34 = 0.46 \text{ V}$$

تدل الإشارة الموجبة للقوة المحرّكة الكهربائية على أن تفاعلاً الأكسدة والإرجاع تلقائي.




هل يمكن قياس كمون نصف خلية بشكل مباشر؟
لقياس الكمون القياسي لأي نصف خلية بشكل مباشر، من الضروري إيجاد كمون إرجاع قياسي يعبر مرجعاً لباقي الكمونات، وقد تم اعتبار كمون مسri الهيدروجين في الشروط القياسية ($H_2/2H^+$) مساوياً للصفر.


ممّ يتكون مسri الهيدروجين؟ وما أهمّيته؟

يتكون مسri الهيدروجين من صفيحةٍ من البلاتين رُسّبَت عليها طبقةٌ من البلاتين، لزيادة سطح التماس، توضع هذه الصفيحة في محلول لحمض كلور الماء، تركيزه 1 mol.L^{-1} ، ويوضح فيه غاز الهيدروجين بشكلٍ كافٍ ومستمرٍ في الشروط القياسية.

• يتأكسد جزءٌ من غاز الهيدروجين إلى أيون الهيدروجين: $H_{2(g)} \rightarrow 2H_{(aq)}^+ + 2e^-$



• كما يرجع جزءٌ من أيون الهيدروجين إلى غاز الهيدروجين: $2H_{(aq)}^+ + 2e^- \rightarrow H_{2(g)}$



• يعتبر كمون مسri الهيدروجين في الشروط القياسية مساوياً للصفر.

$$E^\circ_{(H_2/2H^+)} = 0\text{ V}$$

تكمّن أهميّة مسri الهيدروجين القياسي في قياس كمون إرجاع بقية المسار الآخر.

تطبيق (3):



أتأمل الخلية الغلفانية الموضحة بالشكل المجاور، المستخدمة لقياس كمون إرجاع الزنك، بواسطة مسرى الهدروجين القياسي.

- أكتب المعادلتين المعتبرتين عن نصف التفاعلين الحاصلين في الخلية: بما أن الإلكترونات تنتقل من مسرى الزنك إلى مسرى الهدروجين القياسي.


استنتج: أن مسرى الزنك يقوم بدور المرجع، ويشكل المصعد:



بينما مسرى الهدروجين القياسي يقوم بدور المؤكسد، ويشكل المهبط:



- أكتب رمز هذه الخلية الغلفانية:



- أطّبِّع العلاقة: (مصد) $E^\circ - E^\circ_{(\text{إرجاع})}$ خلية $= E^\circ_{(\text{إرجاع})} - E^\circ_{(\text{ MSR })}$ لحساب قيمة كمون الإرجاع القياسي لمُسرى الزنك (Zn/Zn^{2+}) إرجاع بالاستفادة من:

$$\text{دلالة مقياس الفولط تساوي: } E^\circ_{\text{خلية}} = 0.76 \text{ V}$$


- قيمة كمون مسرى الهدروجين القياسي: $E^\circ_{\text{H}_2/2\text{H}^+} = 0 \text{ V}$ بالتعويض:

$$E^\circ_{\text{خلية}} = E^\circ_{(\text{إرجاع})} - E^\circ_{(\text{ MSR })}$$

$$0.76 \text{ V} = 0 - E^\circ_{(\text{Zn/Zn}^{2+})}$$

$$E^\circ_{(\text{Zn/Zn}^{2+})} = -0.76 \text{ V}$$

نشاط (1):



تتألف خلية غلفانية من مسرى النحاس، ومسرى الهدروجين القياسي، الجسر الملحي فيها من نترات البوتاسيوم KNO_3 تركيزه 1 mol.L^{-1} ، إذا علمت أن القوة المحرّكة الكهربائية للخلية يساوي 0.34 V ، المطلوب:

- حدّد المصعد والمهبط في هذه الخلية.
- احسب كمون إرجاع مسرى النحاس القياسي $E^\circ_{\text{red}}(\text{Cu/Cu}^{2+})$

قياس كمون خلية في الشروط غير القياسية

أسئلة

- إلى أي مدى تعمل الخلية الغلافانية في إنتاج القوة المحرّكة الكهربائية إذا خضعت إلى شروط مختلفة عن الشروط القياسية؟
- هل تتغيّر القوة المحرّكة الكهربائية في حال كانت درجة حرارة الخلية مرتفعة، أو اختلف تركيز محلول، عند كل مسار من مسارات الخلية؟

أجب

- درس العلماء تأثير الشروط الخارجية على الخلايا، وقد توصل العالم نرنست إلى قانون سُمي باسمه:

$$E = E^\circ - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

حيث E هي القوة المحرّكة الكهربائية للخلية.

R ثابت الغازات العام، ويساوي $\text{J.K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.

T درجة الحرارة مقدرة بالكلفن، وتساوي: $T(K) = 273 + t^\circ\text{C}$.

n عدد الإلكترونات المتبادلة في معادلة الأكسدة إرجاع الحاصلة.

F ثابت فارادي $F = 96485 \text{ C/mol}$.

Q نسبة تركيز أيونات المواد الناتجة إلى تركيز أيونات المواد المتفاعلة.

بتعويض R بقيمتها، واعتبار درجة الحرارة $K = 298$ ، وثبت فارادي بقيمتها، وتحويل اللوغاريتم النبرى إلى عشري، يصبح القانون:

$$E = E^\circ - \frac{0.0592}{n} \log Q$$


تعلمت

- تتألف الخلية الغلافانية من مسرين لمعدنين مختلفين يربط بينهما جسر ملحى.
- يتتألف المسار من صفيحة معدنية مغمورة في محلول يحوي أيوناته.
- تستطيع الخلية الغلافانية توليد قوة محرّكة كهربائية، وتعلق القوة المحرّكة الكهربائية بكمون الإرجاع القياسي لكلا المسررين المستخدمين في تشكيل الخلية.
- يمكن حساب كمون الإرجاع القياسي للخلية الغلافانية من خلال تطبيق القانون الآتي:

$$E^\circ_{\text{خلية}} = E^\circ_{\text{إرجاع}} - \frac{(\text{مصدر})}{(\text{إرجاع})}$$

- يتكون مسار الهروجين من صفيحة من البلاتين مغمورة في محلول لحمض كلور الماء، تركيزه 1 mol.L^{-1} ويوضح فيه غاز الهروجين بشكل كافٍ ومستمر في الشروط القياسية، ليكون ضغطه مساوياً 1 atm .
- يعتبر كمون مسار الهروجين في الشروط القياسية مساوياً للصفر.

أختبر نفسك



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

الخلية الغلفانية الكهربائية كيميائياً $Mg/Mg^{2+} \parallel Ag^+/Ag$ المبينة في الشكل الآتي:

1. عند وصل دارتها الخارجية تنتقل الإلكترونات فيها نحو صفيحة:

- a. الفضة، ويتأكسد المغذنزيوم.
- b. الفضة، ويتأكسد الفضة.
- c. المغذنزيوم، ويتأكسد الفضة.

2. الجسر الملحي في الخلية:

- a. يسمح بالخلط الميكانيكي بين محلولي المسرعين.
- b. ينقل الإلكترونات الحرّة بين المسرعين.
- c. يسمح بالتوازن الأيوني بين المسرعين.
- d. ليس ضروريًا لعمل الخلية ويمكن إزالته.

3. يدل الرمز \parallel في تمثيل الخلية الغلفانية على:

- a. إلكترود غازى.
- b. سلك معدني ناقل للإلكترونات.
- c. مسرى الهيدروجين القياسي.
- d. الجسر الملحي.

4. نصف الخلية Mg/Mg^{2+} يمثل:

- a. المصعد ويشكل القطب الموجب للخلية.
- b. المهبط ويشكل القطب السالب للخلية.
- c. المصعد ويشكل القطب السالب للخلية.
- d. المهبط ويشكل القطب الموجب للخلية.

ثانياً: أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. وجود الجسر الملحي في الخلية الغلفانية.

2. القوة المحرّكة الكهربائية لخلية مؤلفة من مسرعين متاماثلين تساوي الصفر.

3. يشكل مسرى التحاس المهبط ومسرى الزنك المصعد في خلية دانيال.

ثالثاً: اعتماداً على كمונات الإرجاع القياسية لأنصاف التفاعلات التلقائية في الجدول الآتي:

$A^{+}_{(aq)} + e^- \rightarrow A_{(s)}$	1.33 V
$D^{3+}_{(aq)} + 3e^- \rightarrow D_{(s)}$	-1.59 V
$C^{3+}_{(aq)} + e^- \rightarrow C^{2+}_{(aq)}$	-0.12 V
$B^{2+}_{(aq)} + 2e^- \rightarrow B_{(s)}$	0.87 V

المطلوب:

1. رتب العوامل المؤكسدة في أنصاف التفاعلات السابقة تنازلياً حسب قوّة كل منها.

2. أكتب العوامل المؤكسدة التي تؤكسد C^{2+} .

رابعاً: خلية غلفانية يحدث فيها التفاعل التلقائي الآتي:



1. اكتب نصفي التفاعلين الحاصلين فيها.
2. حدد التفاعل ذو الكمون الأعلى.
3. اكتب تمثيل هذه الخلية.

خامساً: حل المسألتين الآتتين:


المسألة الأولى:

اعتماداً على نصفي التفاعلين الآتيين:



المطلوب:

1. أكمل الرسم المجاور لتشكّيل خلية غلفانية قياسية، يحدث فيها نصفي التفاعلين السابقين.
2. حدد كلاً من مصدع ومبط هذه الخلية.
3. حدد جهة حركة الإلكترونات في الدارة الخارجية للخلية.
4. احسب القوة المحرّكة الكهربائية للخلية في الشروط القياسية.



المسألة الثانية:

لديك الخلية الغلفانية الآتية:

يحدث فيها نصفي التفاعلين الآتيين:



المطلوب:


1. اكتب اسم المسرى الذي يشكّل كلاً من المهدّط والمصدع.
2. احسب القوة المحرّكة الكهربائية لهذه الخلية.

تفكير ناقد

عند قياس فرق الكمون لبعض الخلايا الكهربائية بواسطة مقياس فولط، غالباً تكون قيمة مُغايرةً للقيمة التي كتبت عليها، ما أسباب ذلك برأيك؟

أبحث أكثر

تستخدم في عددٍ من الأجهزة خلايا ذات قوّة محرّكة كهربائية 1.5 V قابلة للشحن، ابحث في مكتبة مدرستك أو في الشبكة عن المواد التي تدخل في تركيبها وأليّة عملها.



4

الخلايا الكهربائية



تعتمد بعض الأجهزة الكهربائية على خلية غلفانية أو أكثر، للحصول على الطاقة الكهربائية، صُممَت هذه الخلايا بحيث تُلائم عمل الأجهزة التي تحويها، ندعو هذه الخلية عموماً بالمُدَخَّرة، ويُشارُ بين الناس استخدامُ الكلمة بطارية *Battery*.
كيفَ تتمُّ صناعتها؟ وما التفاعلات التي تحدثُ فيها؟

الأهداف:

- * يصنف الخلايا الكهربائية إلى أولية وثانوية.
- * يتعرّفُ بالخلايا الملحيّة.
- * يقارن بين الخلايا الملحيّة والخلايا القلوبيّة.
- * يتعرّفُ بالخلية الرصاصية.
- * يتعرّفُ بخلية الليثيوم - أيون.
- * يتعرّفُ بخلايا الوقود الهدروجينية.

الكلمات المفتاحية:

- * خلايا لو كلانشيه.
- * الخلايا القلوبيّة.
- * خلايا الوقود الهدروجينية.
- * المُدَخَّرة الرصاصية.
- * مُدَخَّرة الليثيوم أيون.
- * الخلية الجافة.

نشاط (1):

صنف الخلايا الآتية، بحسب قابليتها للشحن، وإعادة الاستخدام من جديد.



تصنيف الخلايا الكهربائية إلى نوعين:

- الخلايا الأولية: غير قابلة للشحن، مثل الخلايا المستخدمة في المصباح الكهربائي المحمول.
- الخلايا الثانوية: قابلة للشحن، مثل الخلايا المستخدمة في الهاتف المحمول.

بعض الخلايا الأولية:

خلية لو كانشيه:

تُستخدم في بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية، مثل أجهزة التحكم عن بعد، وساعات الحائط، وبعض أجهزة الراديو الصغيرة وغيرها.


وصف الخلية

- تتألف من:
 - المصدع: أسطوانة من الزنك تُشكّل القطب السالب للخلية.
 - مزيج مؤلف من: ثنائي أكسيد المنغنيز MnO_2 ، محلول كلوريد الأمونيوم NH_4Cl ، محلول كلوريد الزنك $ZnCl_2$ ، ومسحوق الكربون C، يضاف النشاء إلى المزيج ليصبح بشكل عجينة كي لا ينساب من أسطوانة الزنك.
 - المهبط: قلم من الكربون ذو رأس نحاسي يوضع في مركز الأسطوانة من دون أي تماسٍ معها، تحيط به العجينة بشكلٍ كاملٍ، ويُشكّل القطب الموجب للخلية.
 - القوة المحرّكة الكهربائية لهذه الخلية تُساوي 1.5 V.

التفاعلات الكيميائية التي تتم في خلية لوكلانشيه

نشاط (2):

لديك خلية لوكلانشيه. المطلوب:




1. أكتب نصفي التفاعل الحادثين عند كل من المصعد والمهبط.
أحد دور كلاً من: ثنائي أكسيد المنغنيز، قلم الكربون، مسحوق الكربون.

استتبع التفاعل الكلي الذي يحدث في هذه الخلية.

الحل:

1. عند المصعد يحدث تفاعل الأكسدة الآتي:



عند المهبط يحدث تفاعل الإرجاع الآتي:
 $2\text{e}^- + 2\text{NH}_4^+_{(aq)} \rightarrow 2\text{NH}_3{}_{(aq)} + \text{H}_2{}_{(g)}$

2. يؤكسد ثنائي أكسيد المنغنيز الهدر وجين المتشكل عند المهبط، وفق المعادلة الآتية:
 $\text{H}_2{}_{(g)} + \text{MnO}_{2(s)} \rightarrow \text{MnO}_{(s)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)}$

ينقل قلم الكربون الإلكترونات إلى العجينة، يعمل مسحوق الكربون على تحسين التماس.

3. بجمع المعادلات الثلاث نحصل على التفاعل الكلي:



ال الخلية القلوية

وصف الخلية

• تتكون من:

– المصعد: مسحوق من الزنك.

– محلول هيدروكسيد البوتاسيوم المركّز KOH هلامي القوام لمنع انسياكه خارج الخلية.

– المهبط: مزيج من مسحوق الكربون وثنائي أكسيد المنغنيز MnO_2 .


يوضع المصعد والمهبط في أسطوانة معدنية معلقة بشكل جيد.

• القوة المحرّكة الكهربائية لهذه الخلية تساوي 1.5 V.


إثراء:

التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الخلية القلوية:

• عند المصعد:



• عند المهبط:



إثراء: *




يُثَبَّتُ بِهِ فِي الْأَسْوَاقِ مَدْخَرَاتٍ بِقُوَّةٍ مُّحْرِّكَةٍ كَهْرَبَائِيَّةٍ مُّقْدَارُهَا 9 V ، هَذِهِ مَدْخَرَاتٍ تُحَوَّلُ بِدَاخْلِهَا عَلَى سَتٌّ خَلَائِيَا لَوْكَلَانْشِيهِ أَوْ خَلَائِيَا قَلْوَيَّة، قَدْرَةُ كُلٌّ خَلَيَّةٍ صَغِيرَةٍ 1.5 V مُوصَلَةٌ عَلَى التَّسْلِسِلِ.

الخلايا التَّانُوِيَّة: الْقَابِلَةُ لِلشَّدَّهِ



المُدَّخَرَةُ الرَّصَاصِ الْحَامِضِيَّةُ وَصَفُّ المُدَّخَرَةِ

- تَأَلَّفُ مِنْ سَتٌّ خَلَائِيَا تَرْتَبَطُ مَعَ بَعْضِهَا عَلَى التَّسْلِسِلِ.
- تَأَلَّفُ الْخَلَيَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنْ:
 - الْمَهْبِطُ: شَبَكَةُ مِنْ ثَنَائِيِّ أَكْسِيدِ الرَّصَاصِ PbO_2 مُثَبَّتٌ عَلَى صَفِيحةٍ نَاقِلةٍ.
 - الْمَصْعِدُ: شَبَكَةُ مِنْ الرَّصَاصِ Pb مُثَبَّتٌ عَلَى صَفِيحةٍ نَاقِلةٍ.
- طَبَقَةٌ رَقِيقَةٌ مِنْ مَادَّةٍ بِلَاسْتِيكِيَّةٍ تَفَصلُ بَيْنَ الشَّبَكَتَيْنِ الْمُتَقَابِلَيْنِ فِي وَعَاءٍ بِلَاسْتِيكِيٍّ، وَيَتَمُّ غَمُرُهُمَا بِمَحْلُولِ حَمْضِ الْكَبِيرِيتِ، تَرْكِيزُهُ 1 mol.L^{-1} .
- الْقُوَّةُ الْمُحْرِّكَةُ الْكَهْرَبَائِيَّةُ لِكُلٌّ خَلَيَّةٍ تَسَاوِي 2.05 V، فَتَكُونُ الْقُوَّةُ الْمُحْرِّكَةُ الْكَهْرَبَائِيَّةُ لِلْمُدَّخَرَةِ تَسَاوِي:
$$2.05 \times 6 = 12.3\text{ V}$$
- يَكُونُ حَمْضُ الْكَبِيرِيتِ سَائِلًا فِي المُدَّخَرَةِ السَّائِلَةِ، بَيْنَمَا تُضَافُ لَهُ بَعْضُ الْمُرَكَّبَاتِ الْكِيمِيَّيَّةِ لِيَصْبَحَ هَالِمِيًّا فِي المُدَّخَرَةِ الرَّصَاصِيَّةِ الْجَافَّةِ.



نشاط (3):

لديك مُدَخَّرة رصاصية والمطلوب:

1. اكتب التفاعلات الكيميائية التي تحدث عند كل من المصعد والمهبط في أثناء عملية التفريغ.
2. استنتج معادلة التفاعل الكلي التي تحدث في أثناء التفريغ.
3. احسب القوة المحرّكة الكهربائية للمدّخرة، إذا علمت أنَّ



4. أكتب التفاعل الذي يحدث في الخلية في أثناء عملية شحن المدّخرة بـ DC .


الحل:


- في أثناء تفريغ الخلية تحدث التفاعلات الآتية:
عند المصعد:

— يتأكسد الرصاص وفق المعادلة الآتية:




— يتأكسد حمض الكبريت على مرحلتين على الشكل






عند المهبط:

— يرجع ثانوي أكسيد الرصاص وفق المعادلة الآتية:



— يكون التفاعل الكلي عند التفريغ ممثلاً بالمعادلة الآتية:



— القوة المحرّكة الكهربائية للخلية:


$$E_{\text{ الخلية}}^\circ = E_{\text{ إرجاع}}^\circ - E_{\text{ المهبط}}^\circ$$

$$E_{\text{cell}} = +1.685 - (-0.456) = +2.014 \text{ V}$$

بالتالي القوة المحرّكة الكهربائية للمدّخرة:

$$E = 2.041 \times 6 = 12.246 \text{ V}$$

— في أثناء شحن المدّخرة بالتيار الكهربائي DC



التعامل مع المُدَخَّرة الرصاصية

تستخدم المُدَخَّرة الرصاصية الحمضية عموماً في السيارات لتشغيلها من خلال إدارة المُقلع (المارش) وفي المنازل لإنارة المصايد في حال انقطاع التيار الكهربائي، ولضمان عمرٍ طويل لهذه المُدَخَّرات لابد من بعض النصائح العامة:

- عند شراء مُدَخَّرة جديدة يجب الانتباه إلى سعتها، حيث أن كل مُدَخَّرة تمتلك سعة محددة تقدر بواحدة الأمبير تتناسب هذه السعة مع حجمها.
- عند شراء مُدَخَّرة لعمل ضمن المنزل يجب اقتناه شاحن يتناسب وسعة المُدَخَّرة، بشكل عام ينصح بآلا يتجاوز شدة تيار الشاحن 10% من سعة المُدَخَّرة التخزينية للمُدَخَّرة.
- عند وصل سلكي الشاحن إلى المُدَخَّرة يراعى أن يكون فرق الكمون ثابتاً بين طرفيه، ويزيد عن 12.5 V، وتعتبر القيمة المثالية لفرق الكمون لتيار الشحن 13.2 V حيث يتم شحن المُدَخَّرة ببطء، وهذا يتناسب مع سرعة تفاعل تفكك كبريتات الرصاص، علماً أن الشحن السريع يقلل من عمر المُدَخَّرة بشكل كبير، وأن سرعة الشحن تزداد كلما زاد فرق الكمون بين سلكي الشاحن.
- لشحن المُدَخَّرة يتم وصل سلك الشاحن الموجب ذي اللون الأحمر بقطب المُدَخَّرة الموجب (+)، ووصل سلك الشاحن السالب (-) ذي اللون الأسود إلى القطب المُدَخَّرة السالب.
- يجب فصل الشاحن عن المُدَخَّرة بعد انتهاء الشحن، وتجدر الإشارة أن استمرار وصل الشاحن بعد اكتمال الشحن يؤدي لحدوث تفاعلات جانبية، حيث يتفكك الماء إلى هيدروجين وأوكسجين، وتظهر فقاعات واضحة في السائل الحمضي مترافقاً مع انخفاض مستوى في الخلايا إلى مستوى يؤدي لأضرار في المُدَخَّرة.
- عند نقصان مستوى السائل في المُدَخَّرة يجب إضافة الماء المقطر حسراً، ويلجأ بعض الأشخاص إلى إضافة الماء العادي أو المغلي أو حتى الماء المستخرج من المكيفات وأجهزة التبريد، هذا الماء يحتوي على أيونات مختلفة تؤدي لحدوث تفاعلات جانبية وهو ما يعرف بتسمم المُدَخَّرة.
- يجب أن يتم التأكد من تركيز حمض الكبريت من خلال فني مختص كل عدة أسابيع، واستبدال الحمض في حال لزم ذلك.

مُدَخَّرة الليثيوم - أيون

أصبحت مُدَخَّرات الليثيوم - أيون أكثر أنواع المُدَخَّرات انتشاراً، تعمَّدُ عليها الأجهزة الكهربائية المحمولة الحديثة بشكل أساسي، كالهواتف المحمولة والحواسب المُتنقلة والكاميرات الرقمية والأجهزة اللوحية وغيرها. من أهم ميزاتها:




- وزنها أخف مُقارنةً مع المُدَخَّرات الأخرى.
- قدرتها على تخزين كمية كبيرة من الطاقة.
- عمرها طويلاً مُقارنةً مع المُدَخَّرات الأخرى.

وصف المُدَخَّرة

- تتألف المُدَخَّرة من:
 - المصعد: يتكون من طبقاتٍ صغيرةٍ جداً من الكربون (الغرافيت) تترسَّبُ عليه ذراتُ الليثيوم.
 - المهبط: يتكون من أكسيد أحد العناصر الانتقالية، وعادة ما يُستخدم أكسيد الكوبالت CoO_2 في المُدَخَّرات التجارية.
- يتم فصل المصعد عن المهبط بمحلول إلكتروليتي كثيفٍ لا يحوي على الماء، يسمح بمرور أيونات الليثيوم عبره ليشكِّل بذلك جسراً ملحياً.
- القوة المُحرِّكة لهذه المُدَخَّرة 3.7 V .

إثراء:

التفاعلات الكيميائية التي تحدث عند كلٍ من المصعد والمهبط في أثناء التفريغ



- عند المصعد: تتأكسد ذرات الليثيوم وفق المعادلة الآتية:



- عند المهبط: تنتقل أيونات الليثيوم عبر محلول الكهرليتي إلى المهبط ليحدث التفاعل الآتي:



- بجمع المعادلتين نحصل على المعادلة الكلية لعملية التفريغ



في أثناء شحن المُدَخَّرة يحدث التفاعل الكلي الآتي:






أدّت بعض الحوادث إلى انفجار خلية الليثيوم، ويعود ذلك إلى أنَّ الليثيوم يعتبر من العناصر ذات نشاط كيميائيٍّ كبير، فعند ارتفاع درجة الحرارة في المُدَخَّرة أو وصول كمية قليلة من الرطوبة فإنَّ المُدَخَّرة قد تنفجر لذلك يُنصح بعدم استخدام الأجهزة الحاوية على مُدَخَّرة الليثيوم في أثناء شحن الجهاز خوفاً من ارتفاع درجة حرارته.

بسبب خطورة الليثيوم يتم تغليف الخلية بشكل جيد جداً منعاً من وصول الرطوبة إلى داخلها، ولذلك وعند حدوث تفاعلات جانبية قد تطلق بعض الغازات داخل الخلية نتيجة للاستخدام السيء أو انتهاء فترة صلاحيتها مما يؤدي لانفاسِحها إلى حجم قد يصل إلى 200% من حجم الخلية وينصح عند ملاحظة ذلك تبديله.

خلية الوقود الهروجينية:

تُستخدم هذه الخلية في الأقمار الصناعية، ويُعمل على استخدامها حديثاً في وسائل النقل، للتقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري. تُعد هذه الخلية صديقة للبيئة لأنَّها تعتمد على الهيدروجين والأكسجين معاً كوقودٍ في توليد التيار الكهربائي المُتوصل.



تعلمت

- تُصنَّف الخلايا الكهربائية إلى نوعين:
خلايا أولية: غير قابلة للشحن وخلايا ثانوية: قابلة للشحن.
- خلية لوكلانشيه تتَّألفُ الخلية من:
 - المصعد: أسطوانة من الزنك.
 - مزيج من: ثائيٌّ أكسيد المَنْغِنيز، محلول كلوريد الأمونيوم، محلول كلوريد الزنك،
 - مسحوق الغرافيت.
 - المهبط: قلم من الغرافيت.
 - القوَّة المُحرِّكة الكهربائية لهذه الخلية تساوي 1.5 V .
- الخلية القلوية تتَّألفُ الخلية من:
 - المصعد: مسحوق من الزنك.
 - محلول هدروكسيد البوتاسيوم المركَّز KOH .
 - المهبط: مزيج من مسحوق الغرافيت وثائيٌّ أكسيد المَنْغِنيز MnO_2 .
 - القوَّة المُحرِّكة الكهربائية لهذه الخلية تساوي 1.5 V .
- مُدَخَّرة الرصاص الحمضية تتَّألفُ من ست خلايا موصولة على التسلسل تتَّألفُ الواحدة من:
 - المهبط: شبكة من ثائيٌّ أكسيد الرصاص PbO_2 .
 - المصعد: شبكة من الرصاص Pb .
 - يتَّمُّ عمرُهما بمحلولِ حمض الكبريت، تركيزه 1 mol.L^{-1} .
 - القوَّة المُحرِّكة الكهربائية لكلّ خليةٍ تساوي 2.041 V ، ولِكامل المُدَخَّرة 12.246 V .
- مُدَخَّرة الليثيوم – أيُّون تتألَّفُ من:
 - المصعد: يتَّكونُ من طبقاتٍ صغيرةٍ جدًّا من الغرافيت تترَسَّبُ عليه ذَرَّاتُ الليثيوم.
 - المهبط: يتَّكونُ من أكسيد الكوبالت CoO_2 .
 - يتَّمُّ فصلُ المصعد عن المهبط بمحلولٍ إلكتروليتيٍّ كثيفٍ يشكّل الجسرَ الملحيّ.

أختبر نفسك



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1. القوة المحرّكة الكهربائية لخلية لو كلانشيه:
d. 2.1 V c. 3.7 V b. 1.5 V a. 5.1 V
2. يؤخذ ثانوي أكسيد المنغنيز في خلية لو كلانشيه:
d. الهدروجين. c. الغرافيت. b. كلوريد الأمونيوم. a. الزنك.
3. يلعب دور المهبط في الخلية الرصاص الحمضية:
d. ثاني أكسيد الكبريت. c. حمض الكبريت. b. أكسيد الرصاص. a. الرصاص.
4. تصنع المسار في خلايا الوقود الهدروجينية من:
d. البلاتين. c. أكسيد الكوبالت. b. الغرافيت. a. الرصاص.

ثانياً: أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. القوة المحرّكة الكهربائية للخلية القلوية تساوي القوة المحرّكة الكهربائية لخلية لو كلانشيه.
2. عزل الخلايا القلوية ومذكرة الليثيوم - أيون بشكل جيد.
3. يجب إلا يحوي محلول إلكترونوليتي الناقل في مذكرة الليثيوم - أيون على الماء.
4. تحتاج خلايا الوقود الهدروجينية لدارة تبريد.
5. تعتبر خلايا الوقود الهدروجينية صديقة للبيئة.

ثالثاً: أجب عن السؤالين الآتيين:

1. قارن بين خلية لو كلانشيه والخلية القلوية من حيث: (المهبط، المصعد، محلول إلكترونوليتي).
2. احسب القوة المحرّكة الكهربائية لمذكرة رصاصية حمضية، إذا علمت أنها تحوي ثلات خلايا ، وتم التفاعلات في هذه الخلايا على الشكل:
 $\text{PbO}_2/\text{Pb}^{+2} \quad E_{red}^{\circ} = +1.685\text{ V}$
 $\text{Pb}/\text{Pb}^{+2} \quad E_{red}^{\circ} = -0.456\text{ V}$

تفكير ناقد

تحتاج آلة موسيقية كهربائية إلى قوة محرّكة كهربائية قيمتها 12 V . حدد عدد خلايا لو كلانشيه الازمة لهذه الآلة، وطريقة وصلها؛ علماً أن القوة المحرّكة الكهربائية 1.5 V للخلية الواحدة.


أبحث أكثر



سمعنا كثيراً عن انفجار مذكرة الليثيوم أيون في بعض الهواتف المحمولة. ابحث في الشبكة عن الأسباب المحتملة لحدوث ذلك.

5

التّحليل الكهربائي



يلجأ الصناعيون لطلاع بعض المعادن كهربائياً بمعادن أخرى للحفاظ عليها من العوامل الخارجية وتحسين مظهرها وخصائصها الفيزيائية والميكانيكية.

الأهداف:

- * يشرح عملية التّحليل الكهربائي.
- * يعطي أمثلة عن التّحليل الكهربائي.
- * يقارنُ بين التّحليل الكهربائي للماء في وسط (حمضي، أساسي).
- * يطبق قانون فارادي في التّحليل الكهربائي.
- * يتعرّف بعض التطبيقات الصناعية للتّحليل الكهربائي.


الكلمات المفتاحية:

- * التّحليل الكهربائي.
- * الفارادي.
- * تنقية المعادن.
- * الطلي الغلفاني.
- * خلية التّحليل الكهربائي.

مفهوم التحليل الكهربائي:

أجريت وأستنتج (1):

المواد والأدوات اللازمة:



وعاء فولتا - منبع كهربائي DC - محلول هيدروكسيد الصوديوم - محلول حمض الكبريت - أنابيب زجاجية - أسلاك توصيل - قاطعة كهربائية.

خطوات العمل:

- أضخ كمية من الماء في وعاء فولتا، وأضيف إليه كمية قليلة من محلول هيدروكسيد الصوديوم.
- أركب الدارة الموضحة في الشكل، ثم أغلق القاطعة، ماذالاحظ؟
- اكتشف عن الغازين المُتجمعين في الأنابيب، ماذا أستنتاج؟
- أكتب نصفي التفاعل اللذان يحدثان عند كلٍ من المهبط والمصعد.
- أكتب التفاعل الكلي الحاصل.
- أكرر الخطوات السابقة باستبدال محلول هيدروكسيد الصوديوم بمحلول حمض الكبريت.

استنتاج: يتحلل الماء في وعاء التحليل بوجود محلول هيدروكسيد الصوديوم أو محلول حمض الكبريت بإمداد تيار كهربائي، مما يؤدي إلى انطلاق غاز الهيدروجين عند المهبط، وغاز الأكسجين عند المصعد.

$\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$	
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$	عند المهبط
$4\text{OH}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 + 4\text{e}^-$	عند المصعد

تتكون خلية التحليل الكهربائي من:

1. وعاء يحوي:

- محلول أو مصهور ناقل للتيار الكهربائي.

-قطبين ناقلين للتيار الكهربائي من مادة واحدة أو من مواد مختلفة معمورتين في المحلول أو المصهور.
المصعد: يتصل بالقطب الموجب لمنبع كهربائي DC ويحدث عنده تفاعل الأكسدة.
المهبط: يتصل بالقطب السالب لمنبع كهربائي DC ويحدث عنده تفاعل الإرجاع.

2. منبع تيار كهربائي متوصيل DC:

قوته المحرّكة الكهربائية أكبر من القوة المحرّكة الكهربائية الناتجة عن تفاعل الأكسدة والإرجاع التلقائي.

نتيجة:


- التحليل الكهربائي: عملية يحدث فيها تفاعل أكسدة إرجاع غير تلقائي عند إمداد تيار كهربائي.
- في حال وجود أكثر من نصف تفاعل إرجاع عند المهبط يحدث نصف التفاعل ذي الكمون الإرجاع الأكبر.
- في حال وجود أكثر من نصف تفاعل أكسدة عند المصعد يحدث نصف التفاعل ذي الkmون الإرجاع الأصغر.

قانون فارادي في التحليل الكهربائي

نشاط (1):

دللت الدراسة التجريبية أن كمية الفضة المترسبة عند إمداد تيار كهربائي متواصل شدته 19.3 A في محلول نترات الفضة لفترات زمنية مختلفة تزداد مع ارتفاع الزمن كما هو مبين في الجدول الآتي:

الزمن t	50 s	100 s	200 s
$q = I \times t$ كمية الكهرباء	-----	-----	-----
كتلة الفضة المترسبة m	1.08 g	2.16 g	4.32 g
$\frac{m}{q}$	-----	-----	-----



العالم فارادي (1791-1867)
أوجَّد سنة 1834 قانوناً في التحليل
الكهربائي.

المطلوب:

أكمل الجدول السابق، ماذا تستنتج.

استنتاج: تتناسب كتلة الفضة المترسبة على المهبط طرداً مع كمية الكهرباء المارة في خلية التحليل الكهربائي.

ينص قانون فارادي في التحليل الكهربائي:

تناسب كتل المواد المتفاعلة أو الناتجة عند قطب كهربائي سواء كانت غازية أو صلبة في أثناء التحليل الكهربائي طرداً مع كمية الكهرباء المارة في خلية التحليل.
ويكتب بالصيغة الرياضية:

$$m = \frac{q}{F} \times \frac{M}{n}$$

n عدد الإلكترونات المتبادلة.

q كمية الكهرباء المارة في الدارة.

m كتلة المادة المترسبة أو المنطلقة.

F الفارادي حيث $1 \text{ F} = (6.02 \times 10^{23}) (1.6 \times 10^{-19}) \approx 96500 \text{ C/mol}$

M الكتلة المولية للمادة المترسبة أو المنطلقة.

تطبيق (1):

نمرر تياراً كهربائياً شدته 0.5 A في خلية تحليل كهربائية تحوي محلول نترات الذهب لفترة زمنية فيترسب على المهبط 1.97 g من الذهب وينطلق غاز الأكسجين على المصعد.

مع العلم أن $(\text{O}:16, \text{Au}:197)$. المطلوب حساب:

1. كمية الكهرباء المارة في الدارة.
2. عدد مولات الأكسجين المنطلقة.
3. زمن عملية التحليل.


الحلّ :



$$m = \frac{q}{F} \times \frac{M}{n}$$

$$1.97 = \frac{q}{96500} \times \frac{197}{3}$$

$$q = 2895 \text{ C}$$



$$m = \frac{2895}{96500} \times \frac{16}{2}$$

$$m = 0.24 \text{ g}$$

$$n = \frac{m}{M} = \frac{0.24}{32} = 0.0075 \text{ mol}$$

$$t = \frac{q}{I} = \frac{2895}{0.5} = 5790 \text{ s} . \quad .3$$

نشاط (2):

نمرٌ تياراً كهربائياً، شدُّته 10 A لمدة 5 min في محلول مائي لكلوريد الباريوم. المطلوب حساب:

1. كتلة الباريوم المترسبة على المهبط.

2. كتلة غاز الكلور المُنطلق عند المصعد.

الكتل الذرية (Cl:35.5 , Ba:137).

التطبيقات الصناعية للتحليل الكهربائي

أ. - الطلي الكهربائي: (الطلي الغلفاني):

أجريّ:

أدوات ومواد التجربة:

منبع كهربائي DC - محلول نترات الفضة - صفيحة من الفضة - ملعقة معدنية.

خطوات التجربة:


1. أكُونْ دارَةً كهربائيةً كما في الشّكل.

2. أصلِّ صفيحة الفضة إلى القطب الموجب كما أصلِّ الملعقة إلى القطب السالب.

3. أغمرْ كلاً من صفيحة الفضة والملعقة المعدنية بمحلول نترات الفضة، وأغلق الدّارة. ماذا ألاحظ؟

الإجابة:

ترسَّب طقة من الفضة على الملعقة وتتآكلُ صفيحة الفضة تدريجيًّا.



أُستنتج: يتَّم طلي معدنٍ بمعدنٍ آخر يجعله مهبطاً، والمعدنُ الآخر مصدعاً، في خلية تحليل كهربائيٍّ تحوي محلولاً لأملاح المعدن المراد الطلبي به.

نشاط (3):

ما الخطوات التي تقوم بها لطلبي قلادةٍ معدنيةٍ بطبقةٍ من النحاس.

أهمية الطلي الكهربائي:

- إكساب المعدن الأصلي مظهراً جميلاً.
- حماية المعدن من التآكل والصدأ.
- إكساب المعدن قيمةً اقتصاديةً عالية، نتيجةً طلائه بمعدنٍ ثمينٍ.
- إكساب المعدن خاصياتٍ كهربائيةً ومغناطيسيةً جديدةً.

إثراء:

بعض تطبيقات الطلاء الكهربائي

المصدر المعدن الذي يزود محلول بالأيونات المطلوبة	المهبط المعدن الذي يراد طلاوه	المحلول	مجال التطبيق
Ag	Ag	4% AgCN 4% KCN 4% K ₂ CO ₃	مجوهرات وأواني طاولة الطعام
Au	Au, C, Ni, Cr	3% AuCN 19% KCN	مجوهرات
Cr	Pb	25% CrO ₃ 0.25% H ₂ SO ₄	قطع السيارات
Zn	Fe	4% Zn(CN) ₂ 5% NaCN 8% NaOH 5% Na ₂ SO ₄	حديد مغلفن
Sn	Fe	8% H ₂ SO ₄ 7% SnSO ₄	علب حفظ الطعام

٢. استحصلال المعادن النشطة:


لا يمكن استحصلال بعض المعادن الشديدة الفعالية الكيميائية كالصوديوم والألمنيوم، إلا بطريقة التحليل الكهربائي لمركباتها.

مثال:

تحضير الألمنيوم:

يُستخلص الألمنيوم بالتحليل الكهربائي لمصهور أكسيد الألمنيوم بعد ترقية خام البوكسيت من الشوائب وتخليصه من الماء.


- يتأين أكسيد الألمنيوم وفق التفاعل:



- ترجع أيونات الألمنيوم عند المهبط، ثم يخرج الألمنيوم المصهور من فتحات أسفل الخلية وفق التفاعل:



- تناسد أيونات الأكسجين عند المتصعد وفق التفاعل:



٣. تنقية المعادن:

تحتوي أغلب المعادن الممحضرة على شوائب معدنية وغير معدنية تؤثر في خاصياتها الفيزيائية، لذلك لابد من تنقيتها، ويعتبر التحليل الكهربائي من أفضل الطرق للحصول على معدن له درجة عالية من النقاء.

مثال:

تنقية النحاس:

نشاط (4):

المواد والأدوات الازمة:

منبع DC ، وعاء تحليل، محلول كبريتات النحاس، أسلاك توصيل، صفيحة من النحاس النقي، صفيحة نحاس مشوب.

خطوات التجربة:



- أغمِرْ صفيحة النحاس المشوب في محلول كبريتات النحاس وأصلِها بالقطب الموجب.

- أغمِرْ صفيحة النحاس النقي في محلول كبريتات النحاس وأصلِها بالقطب السالب.

- أمرِرْ تياراً كهربائياً في وعاء التحليل الذي يحوي محلول كبريتات النحاس.

- أصِفْ ما يحدث عند ذلك.

- أفسِرْ كيف يمكن تغطية نفقات التحليل الكهربائي المرتفعة.

أستنتجُ:

- يتأكسد النحاس عند المصعد ويتحول إلى أيون:



- ترجع أيونات النحاس عند المهبط وتحوّل إلى نحاسٍ نقىٍ يترسب على المهبط:



تجمّع الشّوائب في قعر وعاء التحليل على شكل راسبٍ يطلق عليه اسم الوحل المصудي، وأهم هذه الشّوائب الفضة والذهب والسيليكون، وهذه المواد غالبة الثمن تعطي قيمتها نفقات التنقية الكهربائية.

تعلمت

- تكون خلية التحليل الكهربائي من:

1. وعاء يحوي:

— محلول أو مصهور ناقل للتيار الكهربائي معمور فيه قطبان.

— قطبين ناقلين للتيار الكهربائي من مادة واحدة أو كلّ منهما من مادة مختلفة.
المصعد: يتصل بالقطب الموجب لمنبع كهربائي DC ، ويحدث عنده تفاعل الأكسدة.
المهبط: يتصل بالقطب السالب لمنبع كهربائي DC ، ويحدث عنده تفاعل الإرجاع.

2. منبع DC للتيار الكهربائي:

قوته المحرّكة الكهربائية أكبر من القوة المحرّكة الكهربائية الناتجة عن التّفاعل التلقائي.

— التحليل الكهربائي: عملية يحدث فيها تفاعل أكسدة إرجاع غير تلقائي عند إمداد تيار كهربائي.

— نص قانون فارادي في التحليل الكهربائي:

تناسب كتل المواد المتفاعلة أو الناتجة عند قطب كهربائي، سواء كانت غازية أو صلبة، في أثناء التحليل الكهربائي طرداً مع كمية الكهرباء المارة في خلية التحليل.
الصيغة الرياضية لقانون فارادي:

$$m = \frac{q}{F} \times \frac{M}{n}$$

- التطبيقات الصناعية للتحليل الكهربائي

— الطلي الكهربائي.

— استخلاص المعادن النشطة كيميائياً.

— تنقية المعادن.



أولاً: اختار الإجابة الصحيحة لكلٍ مما يأتي:

1. عند تحليل محلول نترات الفضة كهربائياً باستخدام قطبين من البلاتين، يتربّض مول واحدٌ من الفضة على المهبط إذا كان عدُّ مولات الأكسجين المنطلقة على المصعد:

a. 2 mol b. 0.25 mol c. 0.5 mol d. 4 mol

2. عند إمرار تيار كهربائي في مصهور كلوريد الصوديوم، باستخدام مسرعين من الغرافيت:

- a. ينطلق غاز الهيدروجين عند المهبط، وغاز الأكسجين عند المصعد.
- b. ينطلق غاز الهيدروجين عند المهبط، وغاز الكلور عند المصعد.
- c. يتجمّع الصوديوم عند المهبط، وينطلق غاز الكلور عند المصعد.
- d. يتجمّع الصوديوم عند المصعد، وينطلق غاز الكلور عند المهبط.

3. عند مرور تيار كهربائي في خلية التحليل تكون جهة حركة الإلكترونات:

- a. في محلول من المهبط إلى المصعد.
- b. في محلول من المصعد إلى المهبط.
- c. في السلك من المصعد إلى المهبط.
- d. في السلك من المهبط إلى المصعد.

ثانياً: نضع في وعاء تحليل محلول كلوريد الصوديوم، ونمرر بالوعاء تياراً كهربائياً مناسباً. المطلوب:

1. ما المواد الناتجة عند المصعد وعند المهبط.

2. اكتب معادلة التفاعل الحاصل.

ثالثاً: لديك سبيكة من الذهب والنحاس، اقترح تجربةً يمكن من خلالها فصل الذهب عن النحاس، موضحاً إجابتك بكتابة المعادلات الكيميائية المناسبة.

رابعاً: نريد طلاء قطعةً معدنيةً باليكل، اقترح تجربةً مناسبةً لتحقّيق ذلك، موضحاً إجابتك بالرسم وبكتابة المعادلات الكيميائية المناسبة.

خامساً: يستخدم التحليل الكهربائي لمحلول كبريتات الزنك من أجل الحصول على معدن الزنك بدرجة عالية جداً من النقاء. المطلوب:

1. ارسم شكل خلية التحليل الكهربائي المناسب لذلك.
2. حدد نوع مادة المصعد ومادة المهبط ونوع محلول.
3. اكتب المعادلين المعتبرتين عن نصف التفاعل الحادثين عند كلٍ من المهبط والمصعد.

سادساً: حل المسألتين الآتيتين:

المسألة الأولى:

نمرر تياراً كهربائياً، شدته $A = 5$ ، في وعاء تحليل مسرياه من البلاتين، يحوي مصهور كلوريد الألمنيوم لمدة ساعتين. المطلوب حساب:

1. كتلة الألمنيوم المترسبة.
2. كتلة الغاز المتصاعد عند المصعد.

(Al:27 , Cl:35.5)

المسألة الثانية:

نمرر تياراً كهربائياً، شدته I ، في وعاء تحليل يحوي محلول يوديد البوتاسيوم لمدة ساعة واحدةٍ فتحرر 10 g من اليود. المطلوب حساب

1. كمية الكهرباء اللازمة لذلك.
2. شدة التيار المار في الدارة.

(K:39 , I:127)

تفكير ناقد

عند تحضير الألمنيوم بطريقة التحليل الكهربائي يجب استبدال المصاعد بشكلٍ دوري، فسر ذلك؟

أبحث أكثر

في حال وجود أكثر من نصف تفاعل أكسدة عند المصعد، أي تفاعل يحدث؟



6

المعايير الحجمية بطريقة تفاعل الأكسدة والإرجاع



تحتاج خلايا الجسم، ولا سيما الدماغ، العضلات والقلب إلى كمية من الكالسيوم في الدم لكي تستطيع العمل بشكل سليم، يمكن قياس كميته عملياً اعتماداً على تفاعلات أكسدة إرجاع بعملية تسمى معايرة.


الأهداف:

- * يوضح مفهوم المعايرة الحجمية.
- * يشرح مبدأ المعايرة الحجمية.
- * يذكر شروط المعايرة الحجمية.
- * يقوم بتجاربٍ توضّح معايرة أكسدة - إرجاع.
- * يستنتج قانون المعايرة الحجمية.
- * يطبق قوانين المعايرة الحجمية.

الكلمات المفتاحية:

- * المعايرة.
- * المحلول القياسي.
- * المشعر.

مفهوم المعايير الحجمية



أجريّ وأستنتج (1)

المواد والأدوات اللازمة:

سحاحة - حامل مع قاعدة - ملقط تثبيت - أرلينة - أنبوب مدرج - محلول كبريتات الحديد II - محلول برمغنتات البوتاسيوم تركيز 0.1 mol.L^{-1} .

خطوات تنفيذ التجربة:

1. أركّب الأدوات كما في الشكل المجاور:

2. أغلق صنبور السحاحة، وأملاً السحاحة بمحلول برمغنتات البوتاسيوم (MnO_4^-) ذو اللون البنفسجي، K^+ لا لون له) حتى التدرج 0 في أعلى السحاحة

3. أضف 10 ml من محلول كبريتات الحديد II (SO_4^{2-}) لا لون له، ذي اللون الأخضر) في الأرلينة

4. أضيف محلول البرمنغنات إلى محلول كبريتات الحديد II تدريجياً. ماذالاحظ؟

الأخطاء:

- زوال لون قطرات برمغنتات البوتاسيوم المضافة مباشرةً إلى محلول كبريتات الحديد II. وانخفاض اللون الأخضر تدريجياً.
- وبعد إضافة كمية مُناسبة من البرمنغنات يظهر اللون البنفسجي.

أفسر:

- تفاعل أيونات البرمنغنات المضافة مع أيونات الحديد II ، مما يؤدي إلى زوال لون أيون البرمنغنات
- وفق التفاعل المُمثل بالمعادلة الآتية:



- يدلُ ظهور اللون البنفسجي في محلول على تفاعل أيونات الحديد II ، بشكلٍ كامل مع أيونات البرمنغنات المضافة، يستفاد من ذلك في حساب تركيز أيونات الحديد II.




استنتاج:
مفهوم المعايير الحجمية:

- هي عملية مخبرية في التحليل الكمي يُعرف بها تركيز محلول مادة مؤكسدة بواسطة تفاعلاً مع محلول مادة مرجعية معلومة التركيز أو العكس.
- مبدأ المعايير:
أضَعُ المحلول القياسي (تركيزه دقيق وثابت) في ساحة، ويضاف في أثناء المعايرة إلى حجمٍ مُحدَّد من المحلول المعاير في الأرلينة حتى تمام التفاعل.
- شروط المعايرة الحجمية:
 • أن تتفاعل المادة المراد معايرتها على نحوٍ تامٍ مع المادة القياسية.
 • أن يكون تفاعل المعايرة مستمراً وسريعاً.
 • أن يمثل تفاعل المعايرة بمعادلة كيميائية موزونة.
 • أن يكون تفاعل المعايرة تفاعلاً بسيطاً لا يتراافق بأي تفاعلاتٍ ثانوية.
 • أن يتوافر مشعرٌ مناسبٌ يمكن من خلاله تحديد نقطة نهاية المعايرة.

حساب المعايرة نشاط (1):

لديك مُعادلة التفاعل الآتي في وسط حمضي:




المطلوب:

1. وازن مُعادلة التفاعل.

2. استنتج العلاقة بين عدد مولات أيونات الحديد II وعدد مولات أيونات البرمنغات.

3. يُعَاير 10 mL من محلولٍ كبريتات الحديد II مع محلول برمنغمات البوتاسيوم تركيزه 0.01 mol.L^{-1} ، فلزم لإتمام المعايرة 50 mL منه. احسب تركيز محلول كبريتات الحديد II.

الحل:



$$5 \text{ mol} \quad 1 \text{ mol}$$

$$n_{(\text{Fe}^{2+})} \quad n_{(\text{MnO}_4^-)}$$

2. عند نهاية المعايرة: $n_{(\text{Fe}^{2+})} = 5n_{(\text{MnO}_4^-)}$

$$C_1 \cdot V_1 = 5 \cdot C_2 \cdot V_2 .3$$

$$C_1 = \frac{5 \cdot C_2 \cdot V_2}{V_1}$$

$$C_1 = \frac{5 \times 0.01 \times 50 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-3}} = 0.25 \text{ mol.L}^{-1}$$

الاحظُ من المعادلة النهائية أن إرجاع أيون من البرمنغات يحتاج إلى خمسة إلكترونات يكتسبها أيون المنغنيز من أيون الحديد II الذي بدوره يؤكسد إلى الحديد III

تطبيق (1):

- أضِعْ 10 ml من محلول يوديد البوتاسيوم المجهول التركيز في بيشر، ثم أضِيفْ إليه قطراتٍ من مطبخ النساء.


- أضِعْ في السحاحة محلول فوسفات ثلاثية الصوديوم تركيزه 0.2 mol.L^{-1} ، وابداً بإضافته تدريجياً إلى محلول يوديد البوتاسيوم السابق حتى ظهور اللون الأزرق، فيلزم 20 ml منه لإتمام المعايرة.

- يحدث التفاعل في وسْطِ حمضيٍ وفقَ المعادلة:



والمطلوب:


- 1- وزن معادلة التفاعل.
- 2- استنتج العلاقة بين عدد مولات أيونات اليود وعدد مولات أيونات الفوسفات.
- 3- احسب تركيز يوديد البوتاسيوم.



إضاءة

يتلّونُ اليود مع مطبخ النساء باللون الأزرق ، حيثُ يُستخدم كمشعر لتحديد نهاية المعايرة.

الحل:



$$4 \text{ mol} \quad 2 \text{ mol}$$

$$n_{(\text{I}^-)} \quad n_{(\text{PO}_4^{3-})}$$

$$n_{(\text{I}^-)} = 2n_{(\text{PO}_4^{3-})} .2$$

$$C_1 V_1 = 2C_2 V_2 .3$$

$$C_1 = \frac{2 \times 0.2 \times 20 \times 10^{-3}}{10 \times 10^{-3}} = 0.8 \text{ mol.L}^{-1}$$


إثراء:

تُستخدم معايير أكسدة إرجاع في تقدير كمية:

1. المواد المؤكسدة في المنظفات والمواد القاصرة.
2. الحديد في خاماته بعد تحويله إلى حديد ثانوي.
3. اليورانيوم والزرنيخ والكالسيوم إلخ

نشاط (2)

يلزم لمعاييرة 20 ml من محلول الماء الأكسجيني 17 ml من محلول برمغنتات البوتاسيوم، تركيزه 0.1 mol.L^{-1} وفق المعادلة الآتية:



المطلوب:

1. كيف تستدل على نهاية تفاعل المعايرة؟
2. احسب تركيز الماء الأكسجيني المستعمل.

تعلمت

مفهوم المعايرة الحجمية.

هي عملية مخبرية في التحليل الكمي يُعرف بها تركيز محلول مادة مؤكسدة بواسطة تفاعلها مع محلول مادة مرجعية معلومة التركيز أو العكس.

مبدأ المعايرة

أضع محلول القياسي (تركيز دقيق وثابت) في ساحة ويضاف في أثناء المعايرة إلى حجم محدد من محلول المعاير في الأرلينة حتى تمام التفاعل.

شروط المعايرة الحجمية:

1. أن تتفاعل المادة المراد معايرتها على نحو تام مع المادة القياسية.
2. أن يكون تفاعل المعايرة مستمراً وسريعاً.
3. أن يمثل تفاعل المعايرة بمعادلة كيميائية موزونة.
4. أن يكون تفاعل المعايرة تفاعلاً بسيطاً لا يتافق بأي تفاعلات ثانوية.
5. أن يتوافر مشرعاً مناسباً يمكن من خلاله تحديد نقطة نهاية المعايرة.



أولاً: ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (غلط) أمام العبارة المغلوطة، ثم صحّحها:

1. في أثناء معايرة أيونات اليود بمحلول برمغنتات البوتاسيوم نستخدم مطبوخ النشاء كمشعر.
2. يتميز محلول القياسي المستخدم في المعايرة الحجمية بتركيزه الدقيق والثابت.
3. يوضع محلول القياسي في الأرلينة والمحلول المجهول التركيز في السحاحة.

ثانياً: اختار الإجابة الصحيحة في كلٌ مما يأتي:

1. عند نهاية معايرة أكسدة إرجاع يكون عدد مولات الإلكترونات المفقودة:

a. أكبر من عدد مولات الإلكترونات المكتسبة.

b. أقل من عدد مولات الإلكترونات المكتسبة.

c. تساوي نصف عدد مولات الإلكترونات المكتسبة.

d. تساوي عدد مولات الإلكترونات المكتسبة.

2. عند نهاية معايرة أيونات الحديد II بمحلول برمغنتات البوتاسيوم، يصبح لون محلول الناتج عن المعايرة:


a. أخضر فاتح. b. عديم اللون. c. بنّي. d. بنفسجي.

ثالثاً: حل المسألتين الآتتين:

المأسألة الأولى:

نعيّر 10 ml من محلول كلوريد الحديد II بمحلول ثالثي كرومات البوتاسيوم، تركيزه 0.02 mol.L^{-1} ,

فيلزم 30 ml منه. فإذا علمت أن نصف التفاعلين الحاصلين هما:



المطلوب:


1. استنتج معادلة التفاعل الأيونية المختصرة الكلية.

2. احسب تركيز محلول كلوريد الحديد II مقدراً بالـ mol.L^{-1} ثم بالـ g.L^{-1} (Cl:35.5 , Fe:56)

المأسألة الثانية:

نعيّر 10 ml من محلول أكرالات الصوديوم بمحلول برمغنتات البوتاسيوم، تركيزه 0.1 mol.L^{-1} ، فيلز

40 mL منه. فإذا علمت أن نصف التفاعلين الحاصلين هما:



المطلوب:

1. استنتاج معادلة التفاعل الأيونية المختصرة الكلية.

2. احسب تركيز محلول أكرالات الصوديوم مقدراً بالـ mol.L^{-1} ثم بالـ g.L^{-1} (O:16 , C:12 , Na:23)

لا تظهر الإلكترونات في معادلة التفاعل الكلي للأكسدة والإرجاع، كيف تفسّر ذلك؟

أبحث أكثر



ابحث في مكتبة مدرستك أو في الشبكة عن كيفية قياس نسبة الكالسيوم في الدم باستخدام معايرة أكسدة إرجاع.

مشروع الخلايا الكهربائية

تحدث في الطبيعة تحولات مستمرة مُعطية كميات ضخمة من الطاقة، إلا أنَّ الإنسان لا يستخدم إلا جزءاً ضئيلاً منها. ومع تطور العلوم والنهضة الصناعية والتكنولوجية ظهرت الحاجة إلى تأمين طاقة تلبي عمل الأجهزة الكهربائية والأقمار الصناعية وغيرها. فكان لابد من صناعة الخلايا الكهربائية.

هدف المشروع:

التعرُّف على الخلايا الكهربائية واستخداماتها.

مراحل المشروع:

أولاً: التخطيط

1. التعرُّف على الخلايا الأولية (لوكلانشيه – القلوية) وأهم استخداماتها.
2. التعرُّف على الخلايا الثانوية (مُذَخِّرة الرصاص – مُذَخِّرة الليثيوم أيون.....) وأهم استخداماتها.
3. التعرُّف على خلية الوقود الهيدروجينية واستخداماتها.
4. التعرُّف على أضرار الخلايا وطرائق التخلص من الخلايا التالفة.

ثانياً: التنفيذ

1. توزيع الطلاب إلى مجموعاتٍ وتحديد مهمة كلٌّ مجموعة:
 - المجموعة الأولى: تبحثُ في الخلايا الأولية، وأهم استخداماتها.
 - المجموعة الثانية: تبحثُ في الخلايا الثانوية، وأهم استخداماتها.
 - المجموعة الثالثة: تبحثُ في خلية الوقود الهيدروجينية، وأهم استخداماتها.
 - المجموعة الرابعة: تبحثُ في أضرار الخلايا الكهربائية وطرائق التخلص من الخلايا التالفة.
2. تبادل المعلومات بين المجموعات للوصول إلى النتائج، ثم تسليم نسخة ورقية من البحث أو نسخة إلكترونية.

ثالثاً: التقويم:

3. مُناقشة النتائج وإعداد تقرير كامل خلال مدة خمسة عشر يوماً.

أسئلة الوحدة الأولى

أولاً: اختبر الإجابة الصحيحة لكلٌ مما يأتي:

1. العامل المرجع في المعادلة الموزونة الآتية:



H₂O .d

Ni²⁺ .c

Cr₂O₇²⁻ .b

Ni .a

2. رقم أكسدة البوتاسيوم في برمغنتات البوتاسيوم KMnO₄ يُساوي:

+1 .d

+7 .c

+2 .b

+6 .a

3. معدن مجهول M يستطيع ترسيب النيكل عند وضعه في محلول كبريتات النيكل، ولكن لا يستطيع ترسيب

المغنيز عند وضعه في محلول كبريتات المغنيز، فيكون الترتيب الصحيح لقدرة المعدن الإرجاعية:

Mn > Ni > M .b

Ni > Mn > M .a

Mn > M > Ni .d

M > Ni > Mn .c

4. عدد الإلكترونات المُمتنقلة في نصف التفاعل الآتي هو:

6 .d

2 .c

4 .b

1 .a

5. عند اتحاد غاز الكلور Cl₂ مع غاز الأكسجين O₂ لتشكيل سباعي كلور الأكسجين Cl₂O₇ يكون تغيير رقم

أكسدة الكلور مُساوياً:



+3.5 .d

+7 .c

+5 .b

-7 .a

6. نصف تفاعل الإرجاع الذي يحدث في مسرى الهدروجين القياسي:



7. أحد الشروط الآتية غير مُتحقق في مسرى الهدروجين القياسي:



25°C .b. درجة الحرارة


1 mol.L⁻¹ .a. تركيز أيونات الهدروجين

.d. الصفيحة المعدنية لا تؤثر في الهدروجين.

c. الضغط الجوي 1 atm

8. نصف التفاعل الذي يحدث عند المبهط من أنصاف التفاعلات الآتية هو:








١٠. في أثناء شحن المُدَخَّرة الرّصاصيّة الحمضية:
 a. يصبح المصعد ذا لون أبيض.
 b. ينخفض تركيز حمض الكبريت في المُدَخَّرة.
 c. يزداد تركيز حمض الكبريت في المُدَخَّرة.
 d. تنخفض درجة الحرارة.





١١. ينطلق على المصعد في التحليل الكهربائي لحمض كلور الماء.
 a. غاز الأكسجين. b. غاز الهيدروجين. c. غاز الكلور. d. غاز كلوريد الهيدروجين.

ثانياً: وازن التفاعلات الآتية:

a. اعتماداً على مفهومي الأكسدة والإرجاع في وسطٍ حمضي:




b. اعتماداً على مفهومي الأكسدة والإرجاع في وسطٍ أساسي:



ثالثاً: اعط تفسيراً علمياً لكلاً مما يأتي:

١. يتفاعل حمض الكبريت المُمدد مع المغنتريوم، ولا يتفاعل مع الفضة.
 ٢. ينقص تركيز محلول بإضافة كمية له من الماء المقطر.

رابعاً: بيّن التشكيل الآتي الشكل الفراغي لأيون رابع الشيونات $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$. والمطلوب:
 أكتب رقم الأكسدة لكل ذرةٍ كبريت في المركب



خامساً: قارن بين كلٌ من المهبط والمصدع في الخلايا الغلفانية وخلايا التحليل.

سادساً: بالاعتماد على جدول كمונات الإرجاع:

1. حدد كلاً من المصدع والمهبط في الخلية.

– الأولى: تتألف من مسرى المنيوم Al^{3+}/Al ، ومسرى فضة Ag/Ag^+ .


– الثانية: تتألف من مسرى نيكل Ni^{2+}/Ni ، ومسرى مغزنيوم Mg^{2+}/Mg .

2. اكتب رمز كلٍ خلية.

سابعاً: حل المسائل الآتية

المسألة الأولى:



تُستخدم مُدَخِّرة الليثيوم – فضة في أجهزة تنظيم ضربات القلب، وتعتمد هذه المُدَخِّرة في عملها على التفاعل الآتي:



المطلوب:

1. هل يشكل معدن الليثيوم المصدع أم المهبط في المُدَخِّرة؟

2. إذا علمت أنَّ كمون الإرجاع القياسي لكلٍ من المسرىين على الشكل:



3. احسب القوَّة المُحرِّكة الكهربائية لهذه المُدَخِّرة في الشروط القياسية.

المسألة الثانية:

نُذيب 0.4 g من هيدروكسيد الصوديوم في الماء المُقطر، ونُكمل الحجم إلى 1 L. المطلوب:

1. احسب تركيز محلول الناتج مقدراً بال $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ ، $\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$.

نأخذ منه 20 mL، ونضيف إليها كميةً كافيةً من حمض الكبريت المُمدد لإتمام التفاعل. المطلوب:

1. اكتب مُعادلة التفاعل الحاصل.

2. احسب عدد مولات حمض الكبريت المستعمل.

3. احسب كتلة الملح الناتج.

(Na: 23, H: 1, S: 32, O: 16)

المسألة الثالثة:

نمرٌ تياراً كهربائياً في وعاء تحليل، يحوي محلول بروميد النحاس. والمطلوب:

1. اكتب نصف التفاعل الحاصلين عند المسرين.

2. إذا ترسّب 0.42 g من النحاس على المهبط، احسب كتلة البروم المُتكوّن عند المصعد.

المسألة الرابعة:

نريد طلاء قطعة معدنية باليكل، فإذا كان سطحها يساوي 125 cm^2 ، وسماكة طبقة اليكل 0.2 mm . المطلوب:

احسب كمية الكهرباء المارة في وعاء التحليل علماً أنَّ الكتلة الحجمية لليكل 8.9 g.cm^{-3} .

المسألة الخامسة:

لدى معايرة محلول لأيونات اليورانيوم U^{4+} ، حجمه 20 mL ، بمحلول قياسي لبرمنغنات البوتاسيوم ذي التركيز

0.2 mol.L^{-1} ، يتأكسد اليورانيوم وفقَ نصف التفاعل الآتي:



كما يرجع أيون البرمنغنات وفقَ نصف التفاعل الآتي:



وقد لزم للوصول لنقطة نهاية المعايرة حجم مقداره 15 mL من برمنغنات البوتاسيوم. المطلوب:

1. اكتب المعادلة الكلية للتفاعل بشكلها الموزون.

2. احسب تركيز أيونات اليورانيوم في محلولها.


الوحدة الثانية

الكيمياء الحرارية

الأهداف العامة للوحدة :


- يَعْرَفُ التَّغْيِيراتُ الْحَرَارِيَّةُ الَّتِي تَرَافَقُ التَّحْوُلَاتِ.
- يَعْرَفُ الْأَنْوَاعُ الْمُخْتَلِفَةُ لِحَرَارَةِ التَّفَاعُلِ.





٧

حرارة التفاعل



يحتاج الإنسان إلى طاقة للقيام بأعماله اليومية، يحصل عليها من الأغذية التي يتناولها، ويطلق اسم الكيمياء الحرارية على فرع الكيمياء الذي يُعني بدراسة التغيرات الحرارية التي ترافق التحولات. تبيّن الصور المحتوى الحراري في 100 g لكلّ من الأطعمة الآتية:



62 kJ



2000 kJ



720 kJ

ما سبب اختلاف قيمة المحتوى الحراري للأطعمة المختلفة؟

الأدلة الدارجية:

نشاط (١):

الاحظ الصورة المجاورة، وأميّز فيها التحول الناشر للحرارة والتحول الماصل للحرارة.

أستنتج: التحولات الحرارية نوعان: تحولات ناشرة للحرارة، وماصلة للحرارة.



الأهداف:

- * يفهّمُ الأثر الحراري للتفاعلات.
- * يتعرّفُ مفهوم الإنثالبية.
- * يستنتجُ حرارة التشكّل القياسيّة.
- * يفهّمُ حرارة الاحتراق.
- * يتعرّفُ الحرارة المولية للذوبان.
- * يستنتجُ حرارة التعديل.
- * يحسّبُ إنثالبية تفاعُل اعتماداً على إنثالبية التشكّل القياسيّة.
- * يبيّنُ أهميّة استخدام قانون هسن.
- * يحسّبُ إنثالبية تفاعُل اعتماداً على قانون هسن.
- * يحسّبُ إنثالبية تفاعُل اعتماداً على طاقات الروابط.

الكلمات المفتاحية:

- * الإنثالبية.
- * الكيمياء الحرارية.
- * إنثالبية التشكّل.
- * إنثالبية التفكّك.
- * حرارة الاحتراق.
- * الحرارة المولية للذوبان.
- * حرارة التعديل.
- * طاقة الرابطة.
- * قانون هسن.

نشاط (2):

اذكر أمثلةً من بيئتك على تحولات ناشرة للحرارة وتحولات ماصة للحرارة.

حرارة التفاعل الكيميائي مع ثبات المُنْفَعِط

- إنَّ مجموع الطاقات المُختَرَّنة في المادة تحت ضغط ثابت يُسمى المُحتوى الحراري للمادة (الإنتالبيَّة) ويرمزُ لها H ، ولكلَّ مادةً إنتالبيَّة خاصَّة بها، يُمكِّن قياس تغييرها ΔH ، وهو الفرق بين إنتالبيَّة المواد الناتجة وأنتالبيَّة المواد المُتَفَاعِلَة $\Delta H = H_2 - H_1$.
- تغير الإنتالبيَّة ΔH المُرافق لتفاعلٍ تُساوي كمية الحرارة عند ضغط ثابت $\Delta H = Q_p$.
- الحالة القياسيَّة لأي مادة هي الحالة التي توجَّد عندها المادة بشكل أكثر استقراراً عند الضغط القياسي 1 atm ، ودرجة الحرارة 298.15°C أو 25°C ، فالحالة القياسيَّة للأكسجين والهيدروجين والتتروجين غازات، بينما البوتاسيوم والرصاص والثحاس مواد صلبة في الشروط ذاتها، أمَّا الزئبق فإنه سائل.
- ويرمزُ للتغير الإنتالبيَّة القياسيَّة المرافق لأي تفاعلٍ كيميائيٍ بـ ΔH_{rxn}^0 .



تطبيق (1):

يحرقُ 1 mol من الميتان CH_4 بأكسجين الهواء O_2 ويتشَكَّلُ غازُ ثاني أكسيد الكربون CO_2 والماء H_2O وتنتشرُ كمية من الحرارة، والمطلوب:

1. أكتب المعادلة الكيميائيَّة التي تمثل التفاعل.

2. أرسم مخططًا يمثل طاقةَ المواد المُتَفَاعِلَة، وطاقةَ المواد الناتجة والطاقة المُنتَشرة.

الحل:




مخطط الإنتالبيَّة لتفاعل ناشر للحرارة

نشاط (3):

لديك المخطط البياني الآتي الذي يمثل تفاعلاً ماصًّا للحرارة:

حدَّد عليه إنتالبيَّة كلٍّ من: المواد المُتَفَاعِلَة، المواد الناتجة وتغيير الإنتالبيَّة.

قارِنْ بين قيمة إنتالبيَّة المواد المُتَفَاعِلَة والمواد الناتجة.




مخطط الإنتالبيَّة لتفاعل ماصٌ للحرارة

كتابه المعادلات الكيميائية الحرارية.

1. تكتب المعادلة الكيميائية بشكل موزون، ثم تكتب قيمة ΔH_{rxn} إلى يمين المعادلة.
2. تكون قيمة ΔH_{rxn} سالبة إذا كان التفاعل ناشراً للحرارة، وتكون موجبة إذا كان التفاعل ماصاً للحرارة.
3. يكتب رمز الحالة الفيزيائية الطبيعية للمواد، (s) للمادة الصلبة، (l) للسائلة، (g) للغاز، (aq) للمادة المُحللة.


مثال:

احتراق الكربون في الشروط القياسية



تغير الإنثالبيّة ΔH تابع حالة، لا يتوقف على الطريق المسلوك بل يعتمد على الحالة الابتدائية والحالة النهائية للجملة. فمثلاً عند



تشكيل 1 mol من الماء السائل من تفاعل غازى الهيدروجين والأكسجين يكون تغير الإنثالبيّة $\Delta H^0 = -286 \text{ kJ}$ ، والذي سنحصل عليه مهما كانت الطائق المستعملة لتحضير الماء من عناصره الأوليّة، ومهما تعددت مصادر الحصول على الهيدروجين والأكسجين.



العوامل التي يتوقف عليها تغيير الإنثالبيّة

الأحظ وأستنتج

- **الأحظ المعادلين المعتبرين عن التفاعلين الآتيين:**





— أحدد عدد مولات الهيدروجين المتفاعلة في كلّ منها.

— أقارن بين قيمتي تغيير الإنثالبيّة.

— أبّين سبب اختلاف قيمة تغيير الإنثالبيّة للتفاعلين السابقين.

- **الأحظ المعادلين المعتبرين عن التفاعلين الآتيين:**





— أُحدِّد عددَ الحالة الفيزيائية للماء الناتج في كلّ منهما.

— أقارن بينَ قيمتي تغيير الإنثالبيَّة.

— أبَيِّن سبب اختلاف قيمة تغيير الإنثالبيَّة للتَّفاعُلَيْن السابقيَّين.

• ألاَّحظ المُعادلَيْن المُعَبِّرَيْن عن التَّفاعُلَيْن الآتَيَيْن:



— أتعرَّفُ الشَّكَل التَّاصُلي للكربون (الفحَم) المتفاعَل في كلّ منهما.

— أقارن بينَ قيمتي تغيير الإنثالبيَّة.



— أبَيِّن سبب اختلاف قيمة تغيير الإنثالبيَّة للتَّفاعُلَيْن السابقيَّين.

أَسْتَنْتَجُ: يتعلَّقُ تغيير الإنثالبيَّة للتَّفاعل بكميَّة المادَّة، وحالَتَها الفيزيائيَّة، والشَّكَل التَّاصُلي لها.

أنواع حرارة التَّفاعل : ΔH

ا. إنثالبيَّة التَّشكُّل القياسيَّة ΔH_f°

الألاَّحظ المُعادلات الآتَيَة وأجيِّبُ:



1. ما عدد مولات المواد المُتشَكَّلة في كلّ من المُعادلات السَّابقة؟


2. هل المواد المتفاعلة عناصر أم مركبات؟

3. ماذا تعرَّفُ إنثالبيَّة التَّشكُّل القياسيَّة؟

أَسْتَنْتَجُ: إنثالبيَّة التَّشكُّل القياسيَّة هي تغيير الإنثالبيَّة عند تكوُّن 1 mol من المادَّة انطلاقاً من عناصرها الأولىَيَّة في الشَّروط القياسيَّة وحدتها $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.

تطبيق (1):

احسب قيمة إنثالبيَّة التَّشكُّل القياسيَّة لغاز يود الهدروجين في التَّفاعل المُمثَّل بالمعادلة الآتَيَة:




الحل:

يتكون مولان من غاز يود الهيدروجين انطلاقاً من عناصره الأولية وبالتالي:
 $\Delta H_{f(\text{HI})}^{\circ} = \frac{\Delta H_{rxn}^{\circ}}{2} = +25.9 \text{ kJ.mol}^{-1}$

نشاط (4):

لديك التفاعل الممثل بالمعادلة الآتية:



هل تُعبر حرارة هذا التفاعل إنتالية تشکل قياسية لثاني أكسيد الكربون؟ فسر إجابتك.

إضافة



اتفق العلماء على أن ΔH_f° لجميع العناصر في حالتها القياسية تساوي صفرًا. مثل الأكسجين يوجد في ثلاثة أشكال، وهي:

الأكسجين الذري O، والأكسجين الجزيئي O_2 ، والأوزون O_3 . ويُعد الأكسجين الجزيئي O_2 الأكثر استقراراً عند درجة الحرارة (298.15K) والضغط الجوي القياسي (1 atm)، لذا فإن $\Delta H_f^{\circ}(\text{O}_3) = 0$ و $\Delta H_f^{\circ}(\text{O}_2) \neq 0$ و $\Delta H_f^{\circ}(\text{O}) \neq 0$.

ج. إنتالية التفكك القياسية ΔH_d°


لاحظ المخطط البياني لتغيير الإنثالبية في أثناء سير التفاعل، وأستنتج:

1. أتعرف قيمة دالة ΔH_1

2. أتعرف قيمة دالة ΔH_2

3. أفارِن بين قيمتي ΔH_1 و ΔH_2 ، ماذا أستنتاج؟

أستنتاج:



– إنثالبية التشكّل القياسية لغاز CO_2 تساوي بالقيمة وتعاكس بالإشارة إنثالبية تفككه إلى عنصريه الكربون C والأكسجين O₂.


– إنثالبية التفكك القياسية هي تغير الإنثالبية عند تفكك 1 mol من المادة إلى عناصرها الأولية في الشروط القياسية، ونرمز لها ΔH_d° وحدتها kJ.mol^{-1} . فتكون: $\Delta H_d^{\circ} = -\Delta H_f^{\circ}$

تطبيق (2):

لديك التفاعل الحراري الممثل بالمعادلة الآتية:



حدّد تغيير الإنثالبيّة في كلّ من المعادلتين الآتىَين:



الحل:

$$\Delta H_{rxn1}^\circ = -\Delta H_{rxn}^\circ = +92.4 \text{ kJ}$$

$$\Delta H_{rxn2}^\circ = 2\Delta H_{rxn}^\circ = -184.8 \text{ kJ}$$

نشاط (5):

اكتب المعادلة الحراريّة المُعبّرة عن تشكّل غاز الميتان CH_4 علماً أنَّ $\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4) = -74.8 \text{ kJ.mol}^{-1}$

٣. علاقة إنثالبيّة التشكّل بالثبات الحراري.


نشاط (6):

أكمل الجدول الآتي:

C_6H_6	H_2S	SO_2	C_2H_4	CO	صيغة المركب
+49.04	-----	-296.1	-----	-110.5	$\Delta H_f^\circ \text{ kJ.mol}^{-1}$
-----	+20.2	-----	-52.3	-----	$\Delta H_f^\circ \text{ kJ.mol}^{-1}$

- أحدّد المركب الذي ينشر أكبر كمية من الحرارة عند تشكّله من عناصره الأولية.
- أحدّد المركب الذي يحتاج إلى أكبر كمية من الحرارة حتى يتفكّك إلى عناصره الأولية.
- أعرّف العلاقة بين الثبات الحراري لمركب وكمية الحرارة المُنتشرة عند تشكّله. ماذا أستنتج؟
- أعرّف العلاقة بين الثبات الحراري لمركب وكمية الحرارة المُمتصّصة عند تشكّله. ماذا أستنتج؟
- رسم مُحوارًا يمثل تغيير إنثالبيّة التشكّل، ثم أحدّد عليه أنثالبيّات التشكّل للمركبات السابقة. ماذا أستنتج؟

أستنتج:




- يزداد الثبات الحراري للمركب بازدياد كمية الحرارة المُنتشرة عند تشكّله.
- يقلُّ الثبات الحراري للمركب بازدياد كمية الحرارة المُمتصّصة عند تشكّله.

تطبيق (3):

رتب المركبات الآتية بحسب تزايد ثباتها الحراري، بالاعتماد على أنطالبيات تشكّلها القياسية:

C_2H_2	H_2O	CO_2	C_3H_8	صيغة المركب
+226.7	-286	-393.5	-103.8	$\Delta H_f^\circ \text{ kJ.mol}^{-1}$

الحل:



نشاط (7):



رتب المركبات الآتية تنازلياً بحسب ثباتها الحراري بالاعتماد على أنطالبيات تشكّلها القياسية:

$\text{HI}_{(g)}$	$\text{H}_2\text{S}_{(g)}$	$\text{CH}_3\text{OH}_{(l)}$	$\text{C}_6\text{H}_{6(l)}$	صيغة المركب
+25.9	-20.2	-238.6	+49.04	$\Delta H_f^\circ \text{ kJ.mol}^{-1}$

حرارة الاحتراق القياسية : ΔH_c°

نشاط (8):

يحرق كل من غاز أول أكسيد الكربون وغاز الميتان احتراقاً تماماً في الشروط القياسية، وفق المعادلين الآتيين:



أحد عدد مولات CO المتفاعلة.

أحد عدد مولات CH_4 المتفاعلة.

أحد كمية الحرارة المُرافقة لاحتراق مول واحد من غاز أول أكسيد الكربون. ماذا أستنتج؟

أحد كمية الحرارة المُرافقة لاحتراق مول واحد من غاز الميتان. ماذا أستنتج؟

أستنتج: كمية الحرارة المنتشرة عند احتراق 1 mol من المادة احتراقاً تماماً بوجود كمية كافية من الأكسجين في الشروط القياسية، تختلف من مادة لأخرى، وتسمى حرارة الاحتراق القياسية، يرمز لها بـ ΔH_c° , ووحدتها kJ.mol^{-1} .

نشاط (9):

اكتب المعادلة الحرارية المعتبرة عن احتراق الإستيلين C_2H_2 , علماً أن حراة احتراقه

$$\Delta H_c^\circ = -1255.5 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

أهمية حرارة الاحتراق

نشاط (10):

الاحظ وأستنتج

أنظر إلى الصور الآتية، ثم أجيب:




سيارة تعمل على البنزين



سيارة تعمل على الديزل(المازوت)

- أتعرفُ أسبابَ اختلافِ نوعِ الوقودِ المستعمل في وسائلِ النقل.
- أقارنُ بينَ أنواعِ الوقودِ من حيثُ الطاقةِ الناتجةِ عن احتراقِ كمياتٍ متساويةٍ من كلّ منها في شروطٍ متماثلةٍ. ماذا أستنتجُ؟



- أتعرفُ الغذاء الممكِن تناوله من قبل شخصٍ يرغبُ في إنفاص وزنه.
- أقارنُ بينَ أنواعِ الأغذيةِ من حيثُ الطاقةِ الناتجةِ عن تناولِ كمياتٍ متساويةٍ من كلّ منها. ماذا أستنتجُ؟

أستنتاجُ: لكلّ مادةً حرارةً احتراقٍ ثابتة، وتتوقفُ قيمتها على طبيعةِ المادة، وتختلفُ قيمتها من مادةٍ لأخرى. يُستخدمُ منها في تقديرِ القيمة الحرارية لأنواعِ الوقودِ والأغذية.

نشاط (11):

حدّد الوقود الأفضل من حيث قيمة ونطافة الطاقة الناتجة عن احتراق كلّ من أنواع الوقود الآتية، بالاعتماد على الجدول الذي يبيّن كمية حرارة احتراق كلّ منها:


المادة	الغاز الطبيعي	الهيدروجين	الفحم	البنزين
حرارة المنتشرة عن احتراق 1 g (kJ.g ⁻¹)	49	143	31	48

تطبيق (4):

اكتب المعادلة الحرارية المُعتبرة عن احتراق البروبان C_3H_8 , ثمّ احسب كمية الحرارة المُنتشرة من احتراق 880 g بروبان, إذا علمت أنّ حرارة احتراقه القياسية $\Delta H_c^\circ = -2220 \text{ kJ.mol}^{-1}$.

الحل:

كتابة المعادلة الكيميائية الحرارية المُمثلة للتفاعل:



حساب عدد مولات البروبان الموجودة في 880 g :

$$n = \frac{m}{M} = \frac{880}{44} = 20 \text{ mol}$$

حساب كمية الحرارة المُنتشرة من احتراق 880 g :

$$\Delta H = 20 \times (-2220) = -44400 \text{ kJ}$$

٤. حرارة الذوبان المولية : ΔH_s

تشعر بارتفاع درجة حرارة يدك عند إذابة كمية قليلة من مسحوق الغسيل بالماء فيها.


أجريّ وأستنتج:

المواد والأدوات الالزام:


كأس زجاجي عدّ 2 – ميزان حرارة عدّ 2 – أنبوب مدرج – ميزان لقياس الكتلة – حبات من هيدروكسيد الصوديوم التقى – نترات الصوديوم الصلب – ماء مُقطر.

خطوات تنفيذ التجربة:

- أضع في كلّ كأس mL 80 ماءً مُقطرًا.
- أحدد درجة الحرارة في كلّ كأس، وأسجل ملاحظاتي.
- أضيف 5 g من حبات هيدروكسيد الصوديوم في الكأس الأول، و 5 g من نترات الصوديوم في الكأس الثاني. ماذا ألاحظ؟
- أحدد درجة الحرارة في كلّ من الكأسين، وأسجل النتائج.
- أقارن النتائج، وأستنتج:



- ترتفع درجة الحرارة عند احلال جبّات هيدروكسيد الصوديوم في الماء.
- ذوبان هيدروكسيد الصوديوم في الماء ناشر للحرارة.
- تنخفض درجة الحرارة عند احلال نترات الصوديوم في الماء.
- ذوبان نترات الصوديوم في الماء ماصل للحرارة



- توحّدُ مُعظَّم المَوَادِ الصلبة على شكل بنية بلوريّة، وتمُر عمليّة الذوبان بالماء المُقطر بالمرحلتين الآتَيَتَين:
- المرحلة الأولى:** تحطيم الشبكة البلوريّة، وهي عملية ماضّة للحرارة، وتُسمى طاقة التبلور ΔH_1 .
- المرحلة الثانية:** تشكّل الأيونات المتميزة وهي عملية ناشرة للحرارة، وتُسمى طاقة التمييّز ΔH_2 .
- تكون عمليّة الذوبان:**

— ماضّة للحرارة عندما $\Delta H_2 < \Delta H_1$.

— ناشرة للحرارة عندما $\Delta H_2 > \Delta H_1$.

تعُرُّف حرارة الذوبان المولية:

بأنّها التغيير الحراري الناتج عن ذوبان مول واحد من المادة المُنحلّة في الماء المُقطر، لتكوين لتر من المحلول، ويرمز لها بـ ΔH_s ، ووحدتها $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ، وتحسب حرارة الذوبان من القانون $\Delta H_s = \Delta H_1 + \Delta H_2$.

تطبيق (5):

اكتب المعادلة الحرارية المُعبّرة عن ذوبان هيدروكسيد الصوديوم بالماء، إذا علمت أن حرارة ذوبانه

$$\Delta H_s = -51 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

الحل:



إثراء:

تستخدم أكياس خاصة للتسخين أو للتبريد، بالاعتماد على ذوبان ملح في الماء فيحدث تحول حراري يمكن الاستفادة منها في الإسعافات الأولية للإصابات.



نشاط (12):

عند ذوبان ملح كلوريد الصوديوم بالماء المقطر، تكون قيمة طاقة التبلور $\Delta H_1 = 766 \text{ kJ.mol}^{-1}$ وطاقة التميي $\Delta H_2 = -770 \text{ kJ.mol}^{-1}$. المطلوب: احسب الحرارة المولية للذوبان، ثم اكتب المعادلة الحرارية المُعبّرة عن ذوبان كلوريد الصوديوم.

٥. حرارة التعديل: ΔH_N



يمكن تناول أقراص دوائية تحتوي على هيدروكسيد المغنتيوم لمعالجة زيادة حموضة المعدة. ما المقصود بتفاعل التعديل؟

أجرب وأستنتج (2):

المواد والأدوات اللازمة:

وعاء زجاجي عدد 2 – محلول حمض كلور الماء – محلول هيدروكسيد الصوديوم – ميزان حرارة عدد 2.



خطوات تنفيذ التجربة:

- أضِّعْ كمّيَةً من محلول حمض كلور الماء في وعاء، وكمّيَةً من محلول هيدروكسيد الصوديوم في وعاء آخر.
- أضِّعْ ميزانَ حرارةً في كلِّ وعاء، وانتظر حتى تصبح درجة حرارتهما متساوية.
- أمزِّجْ المحلولَين، وأقيِّسْ درجة حرارة المحلول الناتِّج، ماذا لاحظ؟
- أقارِنْ النتائج، ماذا أستنتاج؟

أستنتاج: تفاعل التعديل هو تفاعل حمض مع أساس.

- تُعرَّف حرارة التعديل بأنّها: كمية الحرارة المطلقة نتيجة تكون مول واحد من الماء عند تعديل أيون H^+ ناتج من تأين حمض مع أيون OH^- ناتج من تأين أساس، وحدتها $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.
- $$\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O} \quad \Delta H = -57.7 \text{ kJ}$$

– لاحظ المعادلات التي تعبّر عن تفاعلات التعديل الآتية وأستنتج:



- ما هي قيمة حرارة تعديل حمض قوي مع أساس قوي؟
- علّ حرارة تعديل حمض بأساس، أحدهما أو كلاهما ضعيف أصغر بالقيمة المطلقة من $-57.7 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

أستنتاج:


- حرارة تعديل حمض قوي مع أساس قوي تساوي $-57.7 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.
- الحموض والأسّين الضعيفة ذات درجة تأينٍ صغيرة، وعملية التأين تحتاج إلى طاقة حرارية.
- حرارة التعديل = حرارة تعديل حمض قوي مع أساس قوي + حرارة تأين الحمض أو الأساس الضعيف.

تطبيق (6):

إذا علمت أنّ حرارة تأين حمض سيانيد الهيدروجين $-47.24 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ ، احسب حرارة تعديل حمض سيانيد الهيدروجين مع هيدروكسيد البوتاسيوم، ثم اكتب المعادلة الحرارية المعتبرة عن التفاعل.

الحل:

$$\begin{aligned} \text{حرارة التعديل} &= \text{حرارة تعديل حمض قوي مع أساس قوي} + \text{حرارة تأين حمض سيانيد الهيدروجين} \\ \Delta H_N &= (-57.7) + 47.24 = -10.46 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \end{aligned}$$



نشاط (13):

يتناول حمض الخل مع هيدروكسيد الصوديوم، فإذا علمت أنّ حرارة تعديل حمض الخل مع هيدروكسيد الصوديوم $-56 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$. المطلوب:

1. احسب حرارة تأين حمض الخل.
2. اكتب المعادلة الحرارية المعتبرة عن تعديل حمض الخل مع هيدروكسيد الصوديوم.

٦. طاقة الرابطة : ΔH_b

- الاحظ المعادلين الحراريتين الآتيين:



- أحدد قيمة الطاقة الناتجة عن تكون الرابطة المشتركة في جزيء غاز الهdroجين H_2 .
- أحدد قيمة الطاقة الناتجة عن تكون الرابطة المضاعفة في جزيء غاز الأكسجين O_2 .
- أقارن النتائج، ماذا أستنتج؟
- أحدد قيمة الطاقة اللازمة لتفكيك الرابطة المشتركة في كل من جزيء غاز الهdroجين وجزيء غاز الأكسجين؟
- أتعرف العلاقة بين طاقة تكون الرابطة المشتركة، والطاقة اللازمة لتفكيكها.
- أتعرف العلاقة بين قيمة طاقة الرابطة المشتركة في مركب، وثبات هذا المركب حرارياً.

أستنتج:

- عند تفكيك رابطة مشتركة يجب تقديم طاقة للجزيء، وتكون مقدراً موجباً.
- عند تكون رابطة مشتركة ينطلق طاقة، وتكون مقدراً سالباً.
- طاقة تكون الرابطة المشتركة تساوي طاقة تفكيكها بالمقدار وتخالفه بالإشارة.
- طاقة الرابطة المشتركة $B - A$ هي الطاقة اللازمة لتفكيك 1 mol من المادة $B - A$ في حالته الغازية إلى ذرات مُنفردة B, A في الحالة الغازية، يرمز لها ΔH_b ، ووحدتها $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$.
- تدل قيمة طاقة الرابطة الأكبر على أن تفكيك الرابطة يحتاج إلى طاقة أكبر، فيكون المركب أكثر ثباتاً حرارياً.

نشاط (14):

إذا علمت أن طاقة الرابطة بين ذرتي نتروجين في جزيء N_2 تساوي $\Delta H_{b(N \equiv N)} = 946 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ، وطاقة الرابطة بين ذرتي الفلور في جزيء F_2 تساوي $\Delta H_{b(F - F)} = 158 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$. أي الجزيئين أكثر ثباتاً حرارياً؟ علل إجابتك.

نشاط (15):

إذا علمت أن الطاقة اللازمة لتفكيك جزيء الميتان CH_4 إلى عناصره الأولية تساوي 1660 kJ . المطلوب: احسب مُعدل طاقة الرابطة $C - H$.

حساب إنتالبية التفاعل اعتماداً على إنتالبية التشكّل القياسية

- يمكن حساب إنتالبية تفاعل اعتماداً على إنتالبية التشكّل لكلّ من المواد المتفاعلة والنتاجة باستخدام القانون:

إنتالبية التفاعل القياسية = مجموع قيم إنتالبيات التشكّل للمواد الناتجة - مجموع إنتالبيات التشكّل للمواد المتفاعلة

$$\Delta H_{rxn}^0 = \sum \Delta H_f^0 - \sum \Delta H_f^0$$


مواد متفاعلة مواد ناتجة

جدول قيم إنتالبيات التشكّل لبعض المواد:

المُركب	حرارة التشكّل القياسية ΔH_f (kJ.mol ⁻¹)	المُركب	حرارة التشكّل القياسية ΔH_f (kJ.mol ⁻¹)
H ₂ O _(g)	-241.8	C ₂ H ₄ _(g)	+52.3
H ₂ O _(l)	-286.0	C ₂ H ₂ _(g)	+226.7
HCl _(g)	-92.3	C ₆ H ₆ _(l)	+49.04
HBr _(g)	-36.2	CH ₃ OH _(g)	-201.2
HI _(g)	+25.9	CH ₃ OH _(l)	-238.6
H ₂ S _(g)	-20.2	SO ₂ _(g)	-296.1
NH ₃ _(g)	-46.2	CO _(g)	-110.5
NaCl _(s)	-411	CO ₂ _(g)	-393.5
CH ₄ _(g)	-74.85	Al ₂ O ₃ _(s)	-1669.8
C ₂ H ₆ _(g)	-84.67	Fe ₂ O ₃ _(s)	-822.2

تطبيق (7):

اعتماداً على جدول قيم إنتالبيات التشكّل القياسية، احسب تغيير الإنتالبية القياسية للتفاعل الممثل بالمعادلة الآتية:



الحل:

$$\Delta H_{rxn}^0 = \sum \Delta H_f^0 - \sum \Delta H_f^0$$

مواد متفاعلة مواد ناتجة

$$\Delta H = [3\Delta H_{f(s)}^0 + 2\Delta H_{f(H_2O)g}^0] - [2\Delta H_{f(H_2S)}^0 + 2\Delta H_{f(SO_2)g}^0]$$

$$\Delta H = [3(0) + 2(-241.8)] - [2(-20.2) + (-296.1)] = -147.1 \text{ kJ}$$

نشاط (16):

لديك التفاعل الممثل بالمعادلة الآتية: $C_2H_{4(g)} + H_{2(g)} \rightarrow C_2H_{6(g)}$ والمطلوب:


1. احسب تغير الإنثالبية القياسية لهذا التفاعل، اعتماداً على جدول إنثالبيات التشكّل القياسية.
2. هل هذا التفاعل ناشر أم ماصّ للحرارة؟ علّ إجابتك.

قانون هسن



عند الانطلاق من مكان ما في مدينة دمشق للصعود إلى جبل قاسيون، والوصول إلى قمته المطلة على مدينة دمشق.

يمكن سلوك طرائق ومسارات مختلفة، هل سيختلف ارتفاع القمة عن نقطة الانطلاق؟ كذلك تغيير الإنثالبية المُرافق لتفاعل يحافظ على قيمة ثابته، سواء تم التفاعل في مرحلة واحدة أو في عدة مراحل في الشروط نفسها، وهذا يدعى قانون هسن.



يمكن حساب تغير الإنثالبية في التحول: $A \rightarrow C$
من القانون $\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2$

أهمية استخدام قانون هسن

لكي يتحول الفحم (الغرافيت) إلى ألماس، يلزم ملايين السنين، وبالتالي لا يمكن حساب إنثالبية هذا التحول بشكل مباشر.

احتراق الكربون لتشكيل أحادي أكسيد الكربون فقط صعب، لأنّه يتشكّل غاز ثانوي أكسيد الكربون أيضاً.



نتيجة:



يمكن استخدام قانون هسن في الحالات التي لا يمكن حساب تغير الإنثالبية بشكلٍ مُباشرٍ.

تطبيق (8):

احسب تغير الإنثالبية المُرافق لتحول الفحم (الغرافيت) إلى الماس $C_{graphite} \rightarrow C_{diamond}$, اعتماداً على التفاعلات الحرارية المُمثلة بالمعادلتين الآتىين:



الحل:

تبقى المعادلة الأولى كما هي: $C_{(graphite)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} \quad \Delta H_1^0 = -393.5 \text{ kJ}$

نعكس المعادلة الثانية: $CO_{2(g)} \rightarrow C_{(diamond)} + O_{2(g)} \quad \Delta H_2^0 = +395.4 \text{ kJ}$

بجمع المعادلتين، واختصار المُشترك في الطرفين:




نحصل على المعادلة المطلوبة $C_{graphite} \rightarrow C_{diamond}$

$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = -393.5 + 395.4 = +1.9 \text{ kJ}$ وبالتالي حسب قانون هسن نجد:

نشاط (17):

احسب إنثالبية تشكّل $CO_{(g)}$ اعتماداً على تفاعلٍ الاحتراق الآتىين:



حساب إنثالبية التفاعل اعتماداً على مُعَدَّل قيمة طاقات الروابط

كيف يمكن حساب إنثالبية تفاعل ما اعتماداً على قيمة طاقات الروابط؟

نشاط (18):


المعادلة الحرارية المُعتبرة عن اتحاد غاز الهيدروجين مع غاز الكلور، وفق التفاعل الآتى:



اعتماداً على جدول طاقات الروابط، المطلوب حساب:

- أحسب مجموع طاقات روابط المواد المُتفاعلة: $H - H + Cl - Cl \rightarrow$ $[436 + 243] = 679 \text{ kJ}$ (مقدار موجب)

2. أحسب مجموع طاقات روابط المواد الناتجة:
 $\rightarrow 2\text{H} - \text{Cl}$
 $[2(432)] = 864 \text{ kJ}$ (مقدار سالب)



3. أحسب المجموع الجيري لطاقات الروابط في التفاعل:

4. أحسب تغير إنتالية التفاعل بتطبيق القانون:

$$\Delta H_{rxn}^0 = \sum \Delta H_f^0 - \sum \Delta H_f^0$$

مواد متفاعلة مواد ناتجة

$$\Delta H_{rxn}^0 = [2 \times \Delta H_f^0(\text{HCl})] - [\Delta H_f^0(\text{H}_2) - \Delta H_f^0(\text{Cl}_2)]$$

$$\Delta H_{rxn}^0 = [2(-92.3)] - [0 + 0] = 184.6 \text{ k.J}$$

أقارب النتائج، ماذا أستنتج؟

أستنتج أن:

- إنتالية التفاعل يمكن حسابها اعتماداً على قيم طاقات الروابط من القانون:
 $\text{إنتالية التفاعل} = \text{مجموع طاقات روابط المواد المُمُتَّفِعَة} - \text{مجموع طاقات روابط المواد الناتجة}$

$$\Delta H_{rxn} = \sum \Delta H_b - \sum \Delta H_b$$

مواد ناتجة مواد متفاعلة

- الاختلاف بين القيمتين السابقتين يعزى إلى البنية الهندسية للجزيئات.

جدول مُعدّل قيم بعض طاقات الروابط

نوع الرابطة	مُعدّل تغير طاقة الرابطة $\Delta H_b = (\text{kJ.mol}^{-1})$	نوع الرابطة	مُعدّل تغير طاقة الرابطة $\Delta H_b = (\text{kJ.mol}^{-1})$
H – H	436	O = O	495
H – F	563	N – H	391
H – Cl	432	C – H	415
H – Br	366	C – C	344
H – I	299	C = C	615
F – F	158	C ≡ C	812

Cl – Cl	243	C – Cl	328
Br – Br	193	C = O	724
I – I	151	C – Br	226
O – H	463	N ≡ N	946


تطبيق (9):

احسب تغير إنتالبيه التفاعل الآتي، اعتماداً على جدول قيم طاقات الروابط.
 $\text{C}_2\text{H}_{4(g)} + \text{Cl}_{2(g)} \longrightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_{2(g)}$

الحل:

$$\Delta H_{rxn} = \sum \Delta H_b - \sum \Delta H_b$$

مواد ناتجة مواد متفاعلة



$$\Delta H^\circ = [4\Delta H_{b(\text{C}-\text{H})} + \Delta H_{b(\text{C}=\text{C})} + \Delta H_{b(\text{Cl}-\text{Cl})}] - [4\Delta H_{b(\text{C}-\text{H})} + \Delta H_{b(\text{C}-\text{C})} + 2\Delta H_{b(\text{C}-\text{Cl})}]$$

$$\Delta H^\circ = [\cancel{1660} + 615 + 243] - [\cancel{1660} + 344 + 656]$$

$$\Delta H^\circ = -142 \text{ kJ}$$

نشاط (19):

لديك التفاعل الممثل بالمعادلة الآتية: $2\text{NH}_{3(g)} + \text{N}_{2(g)} \longrightarrow 2\text{NH}_{3(g)}$. المطلوب:

1. احسب إنتالبيه هذا التفاعل، اعتماداً على جدول قيم طاقات الروابط

2. هل هذا التفاعل ناشر أم ماشر للحرارة؟ علل إجابتكم.

- التغيير الحراري الذي يحصل خلال التفاعل هو الفرق بين إنتالبية المواد الناتجة وإنتالبية المواد المُتفاعلية.

• أنواع حرارة التفاعل:

1. إنتالبية التشكّل القياسيّة: هي تغيير الإنتالبيّة عند تشكّل 1 mol من المادة انطلاقاً من عناصرها الأولى في الشروط القياسية.
2. إنتالبية التفكّك القياسيّة: هي تغيير الإنتالبيّة عند تفكّك 1 mol من المادة إلى عناصرها الأولى في الشروط القياسية وحدتها $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.
3. حرارة الاحتراق القياسيّة: هي كمية الحرارة المنتشرة عند احتراق 1 mol من المادة احتراقاً تاماً بوجود كميةٍ كافيةٍ من الأكسجين في الشروط القياسية وحدتها $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$.
4. حرارة الذوبان المولية: هي التغيير الحراري الناتج عن ذوبان مول واحدٍ من المُنحل لتكوين لتر من محلول.
5. حرارة التعديل: هي كمية الحرارة المنطلقة نتيجة تكوّن مول واحدٍ من الماء عند تعادل أيون H^+ ناتج من تأين حمض مع أيون OH^- ناتج من تأين أساس.
6. طاقة الرابطة المشتركة $A - B$: هي الطاقة اللازمة لتفكيك 1 mol من المادة $B - A$ في حالتها الغازية إلى ذراتٍ منفردة A, B , في الحالة الغازية، ويرمز لها ΔH_b .

• حساب إنتالبية التفاعل:

1. اعتماداً على إنتالبيات التشكّل من القانون:

$$\Delta H_{rxn} = \sum \Delta H_f^0 - \sum \Delta H_f^0$$

مواد مُتفاعلة مواد ناتجة

2. اعتماداً على طاقاتِ الروابط من القانون:

$$\Delta H_{rxn} = \sum \Delta H_b - \sum \Delta H_b$$

مواد ناتجة مواد مُتفاعلة

3. اعتماداً على قانون هسن الذي ينصُّ على أنَّ تغيير الإنتالبيّة المرافق للتَّفاعل يحافظ على قيمة ثابتة سواء تم التَّفاعل في مرحلةٍ واحدة أو في عددٍ مراحل.

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2$$



أولاًً: اكتب المعادلات الكيميائية الحرارية للتفاعلات الآتية:

1. احتراق ثانائيّ كبريت الكربون (CS_2) السائل مُعطلياً ثانائيّ أكسيد الكربون، وثانائيّ أكسيد الكبريت، علماً أنَّ حرارة احتراقه $(-1075 \text{ kJ.mol}^{-1})$.

2. تفاعل النتروجين مع الأكسجين لتكون 1 mol من أحادي أكسيد النتروجين (NO) يحتاج إلى (90.37 kJ) .

3. احتراق الميتanol CH_3OH علماً أنَّ حرارة احتراقه $(-727 \text{ kJ.mol}^{-1})$.

4. تشكّل 2 mol SO_2 انطلاقاً من عناصره الأولية، علماً أنَّ إنتالية التشكّل القياسيّة له $(-296.1 \text{ kJ.mol}^{-1})$.

5. احتراق الكربون (الغرافيت) بوجود كمية كافية من الأكسجين، علماً أنَّ حرارة احتراقه $(-393.5 \text{ kJ.mol}^{-1})$.

6. تشكّل CO انطلاقاً من عناصره الأولية، علماً أنَّ $\Delta H_{f(\text{CO})}^0 = -110.5 \text{ kJ.mol}^{-1}$

7. ذوبان نترات الأمونيوم بالماء المقطر، علماً أنَّ حرارة ذوبانه $(+25 \text{ kJ.mol}^{-1})$.

ثانياً: اختبر الإجابة الصحيحة لكلٍّ مما يأتي:
1. إذا علمت أنَّ

$$\Delta H_{f(\text{C}_2\text{H}_4)_{(g)}}^0 = +52.3 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$\Delta H_{f(\text{C}_2\text{H}_6)_{(g)}}^0 = -84.7 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

يكون التغيير في إنتالية التفاعل:

$$\Delta H = +32.4 \text{ kJ .d} \quad \Delta H = -32.4 \text{ kJ .c} \quad \Delta H = +137 \text{ kJ .b} \quad \Delta H = -137 \text{ kJ .a}$$

2. إذا علمت أنَّ

$$\Delta H_{f(\text{HCl})_{(g)}}^0 = -92 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$\Delta H_{f(\text{HF})_{(g)}}^0 = -270 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

فإنَّ مقدار التغيير في إنتالية التفاعل:

$$\Delta H = -178 \text{ kJ .d} \quad \Delta H = -362 \text{ kJ .c} \quad \Delta H = +356 \text{ kJ .b} \quad \Delta H = -356 \text{ kJ .a}$$

3. إذا علمت أن حرارة تشكّل هاليدات الهدروجين:

$$\Delta H_{f(HBr)}^0 = -36.2 \text{ kJ.mol}^{-1} \quad \Delta H_{f(HF)}^0 = -269 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$\Delta H_{f(HI)}^0 = +25.9 \text{ kJ.mol}^{-1} \quad \Delta H_{f(HCl)}^0 = -92.3 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

فإن أقل هذه المركبات ثباتاً حرارياً هو:



4. إذا علمت أن حرارة تشكّل كل من الحموض:

$$\Delta H_{f(HCl)}^0 = -92.5 \text{ kJ.mol}^{-1} \quad \Delta H_{f(H_2SO_4)}^0 = -814 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

$$\Delta H_{f(CH_3-COOH)}^0 = -487 \text{ kJ.mol}^{-1} \quad \Delta H_{f(HNO_3)}^0 = -173 \text{ kJ.mol}^{-1}$$

فإن أكثر هذه المركبات ثباتاً حرارياً هو:



5. إذا علمت أن حرارة تعادل حمض ضعيف وأساس قوي تساوي (-10.5 kJ.mol⁻¹)، فإن حرارة تأين الحمض الضعيف تكون:

$$\Delta H = -178 \text{ kJ .d} \quad 47.2 \text{ kJ.mol}^{-1} .c \quad 57.7 \text{ kJ.mol}^{-1} .b \quad 10.5 \text{ kJ.mol}^{-1} .a$$

6. إذا علمت أن قيمة انتالية التفاعل $\Delta H_{f(Al_2O_3)}^0 = -1676 \text{ kJ.mol}^{-1}$ هي:

$$838 \text{ kJ .d} \quad -3352 \text{ kJ .c} \quad -838 \text{ kJ .b} \quad 3352 \text{ kJ .a}$$


ثالثاً: أعط تفسيراً لكل مما يأتي:

1. تغيير الإنثالبيّة يُعدّ تابع حالة.

2. يزداد ثبات الحراري للمركب كلما زادت الحرارة المُنתרّة عند تشكّله.

3. حرارة تعديل حمض ضعيف بأساس قوي، أقل بالقيمة المطلقة من حرارة تعديل حمض قوي بأساس قوي.

رابعاً: رتب الغازات الآتية:



حسب تزايد ثباتها الحراري، اعتماداً على جدول طاقات الروابط الآتى:

Cl – Cl	N ≡ N	O = O	H – H	الرّابطة
243	946	495	436	طاقة الرابطة (kJ.mol ⁻¹)

خامساً: حل المسائل الآتية:

المسألة الأولى:


احسب تغيير إنتالية التفاعل الآتي: $C_2H_{2(g)} + 2H_{2(g)} \rightarrow C_2H_{6(g)}$ في الدرجة (25°C)، اعتماداً على جدول إنتاليات التشكل القياسية.

المسألة الثانية:

إذا علمت أن حرارة احتراق كل من CO و H_2O هي على الترتيب: -284 kJ.mol^{-1} ، -286 kJ.mol^{-1} ، -727 kJ.mol^{-1} . والمطلوب.


1. اكتب المعادلات الحرارية المعتبرة عن تفاعلات احتراق كل من المواد السابقة.

2. احسب تغيير الإنتالية القياسية للتفاعل الآتي:



المسألة الثالثة:

احسب تغيير الإنتالية القياسية للتفاعل الآتي:



وذلك اعتماداً على جدول معدل طاقات الروابط الكيميائية.

المسألة الرابعة:

يتفاعل محلول حمض الخل مع محلول هيدروكسيد البوتاسيوم، فإذا علمت أن حرارة تأين حمض الخل 1.4 kJ.mol^{-1} .

المطلوب:

1. احسب حرارة تعديل التفاعل الحاصل.
2. اكتب المعادلة الحرارية المعتبرة عن تفاعل الحاصل.

المسألة الخامسة:

لديك المعادلة الحرارية الآتية:



المطلوب:

1. احسب طاقة الرابطة $\Delta H_{b(O-H)}$ اعتماداً على جدول طاقات الروابط الآتي:

$C = C$	$C - C$	$C - O$	$C - H$	الرابطة
615	344	351	415	طاقة الرابطة (kJ.mol^{-1})

2. هل هذا التفاعل ناشر أم ماصل للحرارة؟ علل إجابتك.

المُسَأَلَةُ السَّادِسَةُ:

لديك المُعادلة الحرارية الآتية:



إذا علمت أن: $\Delta H_{f(\text{CO}_2)}^\circ = -393.5 \text{ kJ.mol}^{-1}$ ، $\Delta H_{f(\text{H}_2\text{O})}^\circ = -242 \text{ kJ.mol}^{-1}$

المطلوب:

1. احسب إنتالبيه التشكّل القياسيّة لـ الإستلين C_2H_2 .

2. احسب حرارة احتراق الإستلين.

المُسَأَلَةُ السَّابِعَةُ:

إذا علمت أن حرارة احتراق الميتانول CH_3OH القياسيّة تساوي -727 kJ.mol^{-1} . وإنثالبيه التشكّل القياسيّة لـ HBr حساب إنتالبيه تشكّل الميتانول القياسيّة.

المُسَأَلَةُ الثَّامِنَةُ:

اعتماداً على جدول قيم طاقات الرّوابط احسب إنتالبيه التكوّن القياسيّة لـ HBr . انطلاقاً من عناصره الأوليّة.

المُسَأَلَةُ التَّاسِعَةُ:

اكتب المُعادلة الحراريّة المُعبّرة عن ذوبان يوديد البوتاسيوم بالماء المُقطّر، ثم احسب الحرارة المولية لذوبانه، إذا علمت أن: طاقة التبلور -619 kJ.mol^{-1} ، طاقة التمييّه 632 kJ.mol^{-1} .

المُسَأَلَةُ العَاشِرَةُ:

اعتماداً على التفاعلات الممثّلة بالمعادلات الآتية:




المطلوب:

1. ما قيمة حرارة احتراق الميتان؟

2. ما قيمة إنتالبيه التفكّك القياسيّة للماء؟

3. احسب تغيير إنتالبيه التفاعل الآتي:





إنَّ مُعْظَمَ قِيمِ إِنْتَالِيَّاتِ التَّشَكُّلِ لِلْمَوَادِ سَالِيَّةٍ، مَا تَفْسِيرُكُ لِذَلِكَ؟

أَبْحَثْ أَكْثَرْ



ابحث في مكتبة مدرستك أو في الشَّابَكَةِ عن كيَفِيَّةِ قِيَاسِ حرارةِ التَّفَاعُلِ تجْرِيَيًاً ضَمِنَ المَسْعُرَ.

مشروع الكيمياء الحرارية

الطاقة أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار حياة الكائنات الحية، حيث تترافق معظم التفاعلات والتحولات بتغيرات حرارية. وتعنى الكيمياء الحرارية، التي هي جزء من термодинاميك الحراري، بدراسة هذه التغيرات.

هدف المشروع:

التعرف على الكيمياء الحرارية.

مراحل المشروع

أولاً- التخطيط

1. التعرف على الأنظمة الحرارية (المغلق - المعزول - المفتوح).
2. التعرف على الطاقة الداخلية وعلاقتها بتحولات الحالة.
3. التعرف على أنواع الإنتالية.
4. التعرف على الطرائق التجريبية التي يتم من خلالها قياس حرارة التفاعل.
5. التعرف على أهمية الكيمياء الحرارية في حياتنا اليومية.

ثانياً- التنفيذ

- تقسيم الطلاب إلى أربع مجموعات
- المجموعة الأولى تبحث في الأنظمة الحرارية.
- المجموعة الثانية تبحث في مفهوم الطاقة الداخلية وعلاقتها بتحولات الحالة.
- المجموعة الثالثة تبحث في أنواع الإنتالية.
- المجموعة الرابعة تبحث في الطرائق التجريبية لقياس حرارة التفاعل.
- المجموعة الخامسة في أهمية الكيمياء الحرارية في حياتنا اليومية.

ثالثاً- التقويم:


مناقشة النتائج وإعداد تقرير كامل خلال مدة خمسة عشر يوماً.


الوحدة الثالثة

الكيمياء العضوية

أهداف الوحدة:


- يميز المركبات الهيدروكربونية والهيدروكربونية المشتقة.
- يتعرّف التحليل العنصري للمركبات العضوية.
- يطبق قواعد تسمية المركبات العضوية وفق الاتحاد الدولي IUPAC.
- يصبح معادلات كيميائية لتفاعلات المركبات الهيدروكربونية.
- يشّمن دور المركبات الهيدروكربونية.
- يحل تمارين تطبيقية.





٧

التحليل العنصري للمركبات العضوية



استخدم الإنسان منذ القدم مركبات عضوية استخلصها من الحيوانات والنباتات كالدهون والزيوت والسكر والخل والمطاط وغيرها. وقد أثبت علماء التاريخ استخدام التدمريين القدماء العقاقير في عمليات التخدير والأصباغ ذات الألوان الثابتة.

الأهداف:

- * يَتَعَرَّفُ إِلَى الْمُرْكَبَاتِ الْعَضُوِيَّةِ.
- * يَتَعَرَّفُ إِلَى التَّحْلِيلِ الْعَنْصَرِيِّ النَّوْعِيِّ لِلْمَادَةِ الْعَضُوِيَّةِ.
- * يَكْشِفُ نَوْعَ الْعَنَاصِرِ الْمُوْجَودَةِ فِي مَادَّةِ عَضُوِيَّةٍ.
- * يَحْسَبُ النَّسْبَ المَئُوْيَّةَ لِلْعَنَاصِرِ فِي مَادَّةِ عَضُوِيَّةٍ.
- * يَسْتَنْتَجُ صِيغَةَ مَرْكَبِ عَضُوِيٍّ اعْتِدَامًا عَلَى النَّسْبِ المَئُوْيَّةِ لِمَكْوَنَاتِهِ.

الكلمات المفتاحية:

- * الْمُرْكَبُ الْعَضُوِيُّ.
- * الْمَرْكَبَاتُ الْهَدَرُو-كَرْبُوْنِيَّةُ.
- * التَّحْلِيلُ الْعَنْصَرِيُّ النَّوْعِيُّ.
- * التَّحْلِيلُ الْعَنْصَرِيُّ الْكَمِيُّ.

المركبات العضوية: نشاط (1)

ما العنصر المشترك في المركبات العضوية؟

يوجد الملايين من المركبات العضوية، ما تفسير ذلك؟

أستنتج:

- تحتوي المركبات العضوية بشكل أساسي على عنصر الكربون.
- تميز المركبات العضوية بتنوعها الكبير ويعود ذلك إلى عدّة عوامل، أهمّها:
 - قدرة الكربون على تشكيل سلاسل طويلة وحلقات وروابط مضاعفة.
 - تمتلك ذرة الكربون قيمةً متوسطةً للكهربائية، لذلك تستطيع الارتباط بعدد كبير من عناصر الجدول الدوري.

تصنيف المركبات العضوية حسب أنواع العناصر الداخلة في تركيبها

نشاط (2):

صنف المركبات العضوية في الجدول الآتي إلى مركبات هيدروكربونية وهيدروكربونية مشتقة:

المركب	الصيغة	الميتان	إيتانول	بروبان	كلورو إيتان
---	---	CH ₄	C ₂ H ₅ OH	C ₃ H ₈	CH ₃ CH ₂ Cl
التصنيف	---	---	---	---	---

أستنتج:

- المركبات الهيدروكربونية: وهي المركبات التي تحتوي على عنصر الكربون والهيدروجين فقط.
- مشتقات الهيدروكربونية: وهي المركبات التي تحتوي على عنصر الكربون والهيدروجين، إضافةً إلى عناصر أخرى؛ مثل الأزوت والأكسجين والهالوجينات والكبريت وغيرها.

إثراء:

نظريّة القوّة الحيويّة:

كان سائداً الاعتقاد أن المركبات العضوية لديها قوّة حيويّة تميّزها عن المركبات اللاعضوية وبالتالي لا يمكن اصطناع مركبٍ عضويٍّ انطلاقاً من مركبٍ غير عضويٍّ.



فريدرش فولر Friedrich Wohler كيميائي ألماني، ولد سنة 1800

وتوفي سنة 1882 ، استطاع عام 1828 الحصول على اليوريا من سيلانات الأمونيوم في المختبر، وكان أول من يُنتج مادةً عضويةً من مادةً غير عضويةً.

التحليل العنصري النوعي:

ما الطريقة المتبعة لمعرفة مكونات كل مركب ونسب مكوناته؟

1. الكشف عن الكربون والهيدروجين (طريقة ليبيغ):

تجربة:

المواد والأدوات الازمة:

أكسيد النحاس الأسود - مسحوق كبريتات النحاس اللامائية (بيضاء اللون) - مادة عضوية (سكر مائدة،)
- رائق الكلس - حوامل معدنية - موقد بنزين - سدادات - أنبوب اختبار.

خطوات تفاصيل التجربة:

- أضع المواد وأركب الأدوات كما في الشكل.

مزيج من المركبات العضوية مع أكسيد النحاس CuO

هdroxide الكالسيوم

قطن

كبريتات النحاس اللامائية
بيضاء اللون


رائق الكلس

- أحسن الأنابيب الذي يحوي المادة العضوية وأكسيد النحاس الأسود، ماذا لاحظ؟

اللاحظ وأستنتج:

- تغير لون المادة العضوية نتيجة تفككها.

- تغير لون كبريتات النحاس البيضاء CuSO_4 إلى اللون الأزرق $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ، دليل على امتصاص بخار الماء الناتج عن تفاعل أكسيد النحاس مع هيدروجين المادة العضوية وفق المعادلة:



كبريتات النحاس المائية



كبريتات النحاس اللامائية

- تعكر رائق الكلس نتيجة امتصاصه لغاز CO_2 الناتج عن تفاعل أكسيد النحاس مع كربون المادة العضوية وفق المعادلة:



وبشكل عام:



تحتوي جميع المركبات العضوية على عنصر الكربون والهيدروجين.


الكشف عن الهالوجينات والكبريت والنتروجين (طريقة لاسين):

تصهر عينة من مادة عضوية مع قطعة صغيرة من معدن الصوديوم.

– عند وجود النتروجين في المادة العضوية يتشكّل سيانيد الصوديوم.

– عند وجود الكبريت في المادة العضوية يتشكّل كبريتيد الصوديوم.


– عند وجود الهالوجين (X, I, Br, Cl) في المادة العضوية يتشكّل هاليد الصوديوم:




يحل الناتج في الماء ويقسم محلول إلى ثلاثة أقسام كما يلي:

- نصيف إلى القسم الأول نترات الفضة فإذا تشكّل:


– راسب أبيض من كلوريد الفضة، يدل على وجود الكلور في العينة:



– راسب أبيض مُصفر من بروميد الفضة، يدل على وجود البروم في العينة:




– راسب لوئه أصفر من يوديد الفضة، يدل على وجود اليود في العينة:



- نصيف إلى القسم الثاني كمية قليلة من خلات الرصاص، فإذا تشكّل راسب أسود من كبريتيد الرصاص، يدل على وجود الكبريت في العينة.

- نصيف إلى القسم الثالث كمية من مزيج من كلوريد الحديد III، وكبريتات الحديد II، فيظهر لون أزرق داكن (أزرق بروسيا)، يدل على وجود النتروجين في العينة.



التحليل العنصري المئوي:

يهدف التحليل الكمي إلى معرفة نسبة العناصر المكونة للعينة وتحديد كنسبة مئوية، ويعبّر مصطلح النسبة المئوية في الحسابات الكيميائية عن عدد الوحدات من عنصر أو مركب بالنسبة لكل 100 وحدة من العينة.

حساب النسب المئوية للعناصر في مركباتها

تطبيق (1):

لديك مركب عضوي، صيغته المجمّلة C_2H_6O , المطلوب:

– احسب النسبة المئوية للعناصر المكونة له.

(O:16 , H:1 , C:12)

الحل:

$$M = (2 \times 12) + (1 \times 6) + (1 \times 16) = 46 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$\frac{\text{الكتلة المولية لعنصر}}{\text{الكتلة المولية للمركب}} \times 100 = \frac{\text{الكتلة المولية لعنصر في المركب}}{\text{الكتلة المولية للمركب}}$$

$$= \frac{12 \times 2}{46} \times 100 = 52.17\%$$

$$= \frac{1 \times 6}{46} \times 100 = 13.05\%$$

$$= \frac{1 \times 16}{46} \times 100 = 34.78\%$$

تطبيق (2):

يحتوي مركب عضوي على (40%) كربون (6.66%) هيدروجين، (53.34%) أكسجين. المطلوب:

– استنتج الصيغة المجمّلة للمركب، علماً أنَّ كتلته الجُزئية 90 g.mol^{-1} .

(O:16 , H:1 , C:12)

$$\frac{\text{الكتلة المولية لعنصر}}{\text{الكتلة المولية للمركب}} \times 100 = \frac{\text{الكتلة المولية لعنصر في المركب}}{\text{الكتلة المولية للمركب}}$$

$$= \frac{12}{90} \times 100 = 40$$

$$3 = \frac{36}{12} = \frac{40 \times 90}{100 \times 12}$$

$$6 = \frac{6.66 \times 90}{100 \times 1}$$

$$3 = \frac{53.34 \times 90}{100 \times 16}$$

وبالتالي تكون الصيغة المجمّلة:



نشاط (3)

مُرَكَّبٌ عضويٌّ يحتوي على كربون وهيدروجين فقط. المطلوب:

1. استنتج صيغته المجمّلة إذا علمت أنَّ النسبة المئوية الكتيلية للكربون في هذا المُرَكَّب هي 85.71% والكتلة المولية لهذا المُرَكَّب 56 g.mol^{-1} .
2. اكتب مُتصاوِغات هذا المُرَكَّب ($\text{C}:12, \text{H}:1$).

إثراء:

يوجَدُ مُرَكَّبات تحتوي على الكربون وليس عضوية؛ مثل أملاح الكربونات، وغاز ثُنائي أكسيد الكربون، ومُرَكَّبات الكربيدات، وغيرها.

تعلّمت

- تحتوي المُرَكَّبات العضوية بشكلٍ أساسٍ على عنصر الكربون.
- المركبات الهيدروكربونية: وهي المُرَكَّبات التي تحتوي على عنصر الكربون والهيدروجين فقط.
- المُشتقَّات الهيدروكربونية: وهي المُرَكَّبات التي تحتوي على عنصر الكربون والهيدروجين، إضافة إلى عناصر أخرى، مثل الأزوت والأكسجين والهالوجينات والكبريت وغيرها.
- النسبة المئوية لكتلة عنصرٍ في مُرَكَّب =
$$\frac{\text{الكتلة المولية للعنصر} \times \text{عدد ذرات العنصر}}{\text{الكتلة المولية للمُرَكَّب}} \times 100\%$$

أختبر نفسك



أولاً: اختر الإجابة الصحيحة لما يلي:

1. العنصر المشترك في جميع المركبات العضوية هو:
a. النتروجين. b. الكربون. c. الكربون والهيدروجين فقط. d. الهدروجين وعناصر أخرى.
2. يمكن معرفة الهالوجين الموجود في مركب عضوي من لون الرأس، فالرأس الأصفر دليل وجود:
a. نترات الفضة. b. كلوريد الفضة. c. بروميد الفضة. d. يوديد الفضة.

ثانياً: فسر ما يأتي اعتماداً على طريقة ليبيغ:

- تعكر رائق الكلس

- تغير لون كبريتات النحاس البيضاء إلى اللون الأزرق.

ثالثاً: هل يمكن اعتبار الخشب والورق مواد عضوية، كيف ثبت ذلك؟

رابعاً:وضح كيف تكشف عن وجود كل من الكربون والكلور في عينة.

خامساً: احسب النسبة المئوية لمكونات المركبات الآتية:



(N:14 ، O:16 ، H:1 ، C:12)

سادساً: استنتج الصيغة المجمّلة للمركبات الآتية:

1. مركب عضوي يحتوي على (53.3%) كربون، (15.55%) هيدروجين، (31.15%) نتروجين، علمًا أن كتلته الجزيئية 45 g.mol^{-1} .

2. مركب عضوي يحتوي على (47.05%) كربون، و (6.53%) هيدروجين، وكلور، علمًا أن كتلته الجزيئية 76.5 g.mol^{-1}

(N:14 ، O:16 ، H:1 ، C:12)

تفكير ناقد



لديك مركب عضوي، صيغته المجمّلة $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ، المطلوب: اكتب متضاوغات هذا المركب

أبحث أكثر



إذى تطور التقنيات المستخدمة في الكشف عن صيغ المركبات العضوية والتحليل إلى تطور الاصطناع العضوي وإنتاج المزيد من المركبات العضوية ومن هذه الطرائق: مطيافية الأشعة تحت الحمراء IR، ومطيافية NMR، الكروماتوغرافيا. أبحث باستخدام الشابكة عن آلية عمل إحدى هذه الطرائق وأهميتها في التحليل الكيميائي.

المُركّبات الهيدروكربونية ٢



يُستخدم لتشغيل وسائل النقل المُختلفة
وقوّد يحتوي على خليطٍ من مُركّبات هيدروكربونية.
ما المُركّبات الهيدروكربونية؟

الأهداف:

- * يصنّف المُركّبات الهيدروكربونية المشبعة وغير المشبعة.
- * يتعرّفُ للألكانات.
- * يستنتج الصيغة العامة للألكانات.
- * يستنتج صيغ الجذور الألكلية.
- * يسمّي الألكانات وفق قواعد IUPAC.
- * يتعرّفُ بعض الخصائص الفيزيائية للألكانات.
- * يتعرّفُ بعض الخصائص الكيميائية للألكانات.
- * يتعرّفُ بعض استخدامات مشتقات الألكانات.

الكلمات المفتاحية:

- * المُركّبات الهيدروكربونية.
- * الألكانات.
- * الجذور الألكلية.

المُركّبات الهيدروكربونية المشبعة وغير المشبعة:

نشاط (1):

أكمل الجدول الآتي:

الاسم	الإيتان	الإيتلن	اسم المركب
C_2H_2	-----	C_2H_4	الصيغة المجملة
-----	CH_3-CH_3	-----	الصيغة نصف المنشورة
-----	-----	مشتركة ثنائية	نوع الرابطة بين ذرّات الكربون
غير مشبعة	-----	-----	تصنيفها

استنتج: تصنّف المركّبات الهيدروكربونية إلى:

1. مشبعة، روابطها مشتركة أحادية بين ذرّات كربون.
2. غير مشبعة، تحتوي على رابطة مشتركة ثنائية أو ثلاثية بين ذرّات كربون.



الألكانات

يستخدم شمع البارافين في صناعة الشموع و يتكون من مركّبات هيدروكربونية مشبعة تسمى ألكانات (بارافينات).

نشاط (2):

لديك الجدول الآتي الذي يمثل بعض صيغ الألكانات ذات السلسل المفتوحة:

الصيغة النصف منشورة	عدد ذرات الكربون	الصيغة الجزيئية	اسم المركب
CH_4	1	CH_4	ميتان
CH_3-CH_3	2	C_2H_6	إيتان
$CH_3-CH_2-CH_3$	3	C_3H_8	بروبان
$CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$	4	C_4H_{10}	بوتان
$CH_3-(CH_2)_3-CH_3$	5	C_5H_{12}	بنتان
$CH_3(CH_2)_4-CH_3$	6	C_6H_{14}	هكسان
$CH_3(CH_2)_5CH_3$	7	C_7H_{16}	هبتان
$CH_3(CH_2)_6CH_3$	8	C_8H_{18}	أوكتان
$CH_3(CH_2)_7CH_3$	9	C_9H_{20}	نونان
$CH_3(CH_2)_8CH_3$	10	$C_{10}H_{22}$	ديكان

- ما العلاقة بين عدد ذرات الكربون وعدد ذرات الهيدروجين في كل مركب.
- استنتج الصيغة العامة للألكانات.
- حدِّد اللاحقة التي تميّز الألكانات.
- تُعدُّ الألكانات مركبات هdroكربونية مشبعة، فسُر ذلك.

أستنتج:

- عدد ذرات الهيدروجين = $2 \times$ عدد ذرات الكربون + 2
- الصيغة العامة للألكانات $C_n H_{2n+2}$
- تميّز الألكانات باللاحقة (آن).
- الروابط بين ذرات الكربون مشتركة أحادية.

تطبيق (1):

الكان كتلته المولية 44 g.mol^{-1} , استنتج صيغته المجمّلة ونصف المنشورة واذكر اسمه, علماً أنَّ الكتل الذرية (C:12 , H:1).

الحل:

$$\begin{aligned} C_n H_{2n+2} &= 44 \\ \Rightarrow 12n + 2n + 2 &= 44 \\ \Rightarrow 14n &= 42 \\ \Rightarrow n &= 3 \\ \Rightarrow C_3 H_8 \end{aligned}$$



اسم الألكان بروبان.

نشاط (3):



استخدم الصيغة العامة للألكانات لتحديد أيٌ من المركبات العضوية الآتية من الألكانات:



إضاعة



يتشكّل حلقي الألكان عند ارتباط ذرتي الكربون الطرفيتين في الكانِ ما، وصيغته العامة $C_n H_{2n}$. مثال:



نشاط (4)

أكتب الصيغة نصف المنشورة لحلقي الهكسان.

الجذور الألكيلية


نحصل على الجذور الألكيلية الحرة عند إنفصال ذرة هيدروجين من الصيغة العامة للألكانات، نرمز لها بالرمز $-R$ ، صيغتها العامة C_nH_{2n+1} ، وتشتّق أسماؤها من أسماء الألكانات الموافقة باستبدال اللاحقة (آن) باللاحقة (يل).

مثال:

إيزو بروبيل	نظامي بروبيل	إيتيل	متيل
	$CH_3 - CH_2 - CH_2 -$	$CH_3 - CH_2 -$	$CH_3 -$



إثراء:

تشكل الجذور الألكيلية نتيجة انقسام متجلانس للرابطة $C-H$.




نسمية الألكانات بحسب الاتحاد الدولي للكيماه البحثة والتطبيقيه IUPAC

أكتب اسم المركب الآتي وفق قواعد الاتحاد الدولي للكيماه البحثة والتطبيقيه IUPAC.



1. أحدد أطول سلسلة كربونية.
2. أحدد عدد ذرات الكربون في السلسلة الأطول، عددها يساوي
3. أكتب اسم الألكان الموافق



-2 بنتان

٤. أكتب أرقام ذرات الكربون في السلسلة بدءاً من أحد طرفيها، بحيث تأخذ مجموع أرقام ذرات الكربون الدالة على مواضع الفروع (المُتبادلات) أصغر ما يمكن.

٥. أحدد رقم كل من ذرة الكربون الدالة على الفرع

٦. أسمِي الفرع مسبوقاً برقم ذرة الكربون المرتبط بها

٧. أكتب اسم المركب :

أكتب اسم الألكان الموافق مسبوقاً باسم الفرع ورقم ذرة الكربون المرتبط بها

استنتج :

قواعد تسمية الألkanات المُتفرّعة بحسب نمط الاتحاد الدولي للكيمياء البحثة والتطبيقية IUPAC :

- نرقم أطول سلسلة كربونية من الطرف الأقرب للفرع المُرتبط بها.
- نكتب اسم الألكان الموافق لأطول سلسلة مسبوقاً برقم واسم الفرع بحيث يفصل بين الرقم والاسم خط قصير (-).


٣. إذا أحوت السلسلة على أكثر من جذرٍ أكيلي، ترتُب أسماء الفروع بحسب الحروف الأبجدية إيتيل - ميتيل - بروبيل -

٤. استخدام المقاطع ثنائية ثلاثي، عندما يوجد جذران أو ثلاثة جذور متشابهة على الترتيب على السلسلة الطويلة.


٥. عندما توجد مجموعتان فرعيتان على ذرة الكربون نفسها يكرر الرقم مع كل مجموعة فرعية.

تطبيق (2) :

أكتب اسم كل من المركبين الآتيين وفق قواعد الاتحاد الدولي للكيمياء البحثة والتطبيقية IUPAC .





2- ميتيل الهكسان



3- ميتيل الهبتان

نشاط (6) :


أكتب اسم كل من المركبين الآتيين وفق قواعد الاتحاد الدولي للكيمياء البحثة والتطبيقية IUPAC .





تصنف ذرات الكربون بحسب عدد ذرات الكربون المُرتبطة إلى:

1. أولية، إذا ارتبطت بذرة كربون واحدة فقط.
2. ثانية، إذا ارتبطت بذرتين كربون.
3. ثالثية، إذا ارتبطت بثلاث ذرات كربون.
4. رابعة، إذا ارتبطت بأربع ذرات كربون.



نشاط (7):

حدّد نوع كلّ ذرة كربون في الصيغة نصف المنشورة التالية:



الخصائص الفيزيائية للألكانات:

نشاط (8):

لديك الجدول الآتي الذي يمثل بعض الخصائص الفيزيائية للألكانات:

اسم المركب	الصيغة الجزيئية	الكتلة الجزيئية	درجة C الانصهار	درجة C الغليان
ميتان	CH_4	16	-176.7	-182.5
إيتان	C_2H_6	30	-88.6	-183.3
بروبان	C_3H_8	44	-42.1	-187.7
بوتان	C_4H_{10}	58	-0.5	-138.3
بنثان	C_5H_{12}	72	36.1	-129.8
هكسان	C_6H_{14}	86	68.7	-95.3
هيبيتان	C_7H_{16}	100	98.4	-90.6
أوكتان	C_8H_{18}	114	127.7	-56.7

– حدّد الحالة الفيزيائية للألكانات الأربع الأولى في الجدول السابق عند درجة حرارة الغرفة 25°C .

– ما العلاقة بين درجتي الغليان و الانصهار والكتلة الجزيئية للألكان؟

— فسّر سبب إنخفاض درجة الانصهار والغليان للألكانات.

— فسّر عدم احلال الألكانات بالماء؟

الخاصيّات الكيميائيّة للألكانات:

الألكانات مركبات ضعيفة الفعالية الكيميائية، لا تتفاعل إلا في شروطٍ معينة، مثل وجود طاقةٍ ضوئية أو طاقة حرارية، لاحتوائها على روابط من النوع 5 يصعب تفكيكها، ومن تفاعلاتها:

1. تفاعلات التحرير

a. تفاعل الاحتراق:

تحترق الألكانات احتراقاً تماماً بوجود كميةٍ وافرةٍ من الأكسجين وفق المعادلة الآتية:



نشاط (9): اكتب المعادلة المعتبرة عن احتراق الإيتان.

إثراء: 






يتكون غازُ الطبخ من مزيج من البروبان والبوتان بشكلٍ أساسيٍّ، حيث لا رائحة لهذِه الغازات الخانقة، لذلك تضاف لها مركباتٌ عضويَّةٌ كبريتية ذات رائحةٍ نفاذةٍ من أجلِ عاملِ الأمان.

b. التفاعل مع الكلور بوجود ضوء الشمس المباشر:



2. تفاعلات الاستبدال:

إذا عُرِض مزيج من غازِي الميتان والكلور إلى الضوء بشكلٍ غيرٍ مباشرٍ تتشكلُ مركباتٌ كلوريَّةٌ ناتجةٌ عن استبدال ذرات الهيدروجين بذراتِ من الكلور وفق المعادلات الآتية:



نقطة الألkanات نشاط (10):

كيف يمكن فصل الألkanات اعتماداً على خاصياتها الفيزيائية؟
ماذا تسمى العملية الفيزيائية التي يمكن من خلالها فصل الألkanات؟

أستنتج: تفصل الألkanات في برج التقطير اعتماداً على اختلاف درجات غليانها بعملية التقطير التجزيئي.

أهمية غاز الميتان:

يُستخدم الغاز الطبيعي الميتان كوقود في المنازل، وفي المصانع، وفي تحضير رباعي كلور الكربون CCl_4 الذي يستخدم كمذيب عضوي، وفي إطفاء الحرائق، وكما يحضر منه أسود الكربون الذي يُستخدم في صناعة حبر المطابع.



إثراء:

غاز الميتان CH_4 :
غاز عديم اللون والرائحة إذا كان نقياً، وهو يشكل بنسبة 95-70% من مكونات الغاز الطبيعي، وينتتج من التحمر اللاهوائي للمخلفات العضوية.



إنتاج غاز الميتان من تحمر المواد العضوية

- المركبات الهيدروكربونية: هي مركبات تحوي عنصري الكربون والهيدروجين فقط.
- تصنف المركبات الهيدروكربونية إلى:
 1. مشبعة، روابطها مشتركة أحادية بين ذرتي كربون.
 2. غير مشبعة، تحتوي على رابطة مشتركة ثنائية أو ثلاثة بين ذرتي كربون.
- الصيغة العامة للألكانات C_nH_{2n+2} ، وتميز باللاحقة (أن) الروابط بين ذرات الكربون مشتركة أحادية.
- الصيغة العامة للجذور الألكيلية C_nH_{2n+1}
- الخصيات الفيزيائية للألكانات: تزداد درجات انصهارها وغليانها بشكل عام بازدياد عدد ذرات الكربون في المركب.
- الخصيات الكيميائية للألكانات
 1. تفاعلات التحرير ومنها:
 - تفاعل الاحتراق.
 - التفاعل مع الكلور بوجود ضوء الشمس المباشر.
 2. تفاعلات الاستبدال.

أختبر نفسك



أولاً: اختار الإجابة الصحيحة لكلٍ مما يأتي:



1. أحد المركبات الآتية هو من المركبات الهيدروكربونية:



2. المركب الذي ليس من الألكانات هو:



ثانياً: اكتب اسم كلٍ من المركبات الآتية وفق تسمية الاتحاد الدولي IUPAC



ثالثاً: أعط تفسيراً علمياً لكلٍ مما يأتي:

1. تزداد درجات غليان الألكانات بازدياد عدد ذرات الكربون فيها.

2. لا تحل الألكانات في الماء.

3. تُعد الألكانات قليلة الفعالية الكيميائية في الشروط العاديّة.

رابعاً: اكتب الصيغ الكيميائية للمتصاوِغات البنوية الممكّنة للصيغة المجمّلة C_4H_{10} ، ثم اكتب اسم كل منها وفق قواعد IUPAC

خامساً: اكتب الصيغة النصف منشورة للمركبات الآتية:
a. 2 - متيل البنـتان. b. 3,2 - ثنـائي متـيل الـبوتـان. c. 3 - إـتـيل - 2 - مـتـيل الـهـكسـان.

سادساً: ألكان نظامي كتلته المولية 58 g.mol^{-1} . المطلوب:

1. استنتج صيغته المجمّلة.
2. اكتب صيغته نصف المنشورة و اكتب اسمه.
3. اكتب مُعادلة تفاعـل احتـراقـه، ثـم احـسب حـجـم غـاز CO_2 النـاتـج عن اـحـترـاق 3 mol من الأـلـكان السـابـق مقـاسـاً في الشـرـطـين النـظـامـيـن.
(C:12 , H:1)

تفـكـيرـناـقد

حدد أنماط تهجـين ذـرـتـي الـكـربـون فـي جـزـيـء الإـيتـان C_2H_6 ، ثـم فـسـرـ الخـمـولـ الـكـيمـائـيـ لـلـأـلـكانـات مـقـارـنـة مـع باـقـيـ المـرـكـبـاتـ العـضـوـيـةـ المـوـافـقـةـ

أـبـحـثـأـكـثـر

يعـتـبرـ وـقـودـ السـيـارـاتـ المعـرـوفـ بـاسـمـهـ الشـائـعـ "الـبـنـزـينـ" بـأنـهـ مـزيـجـ منـ أـلـكانـاتـ مـخـتـلـفـةـ تـتـراـوحـ طـولـ سـلاـسلـهاـ بـيـنـ C_6 وـ C_{10} وـ لـكـنـ أـفـضـلـهاـ عـلـىـ الإـطـلاقـ هـوـ الـوقـودـ الـذـيـ يـحـويـ كـمـيـةـ كـبـيرـةـ منـ C_8 الـأـوـكـتـانـ، إـبـحـثـ فـيـ الشـابـكـةـ عـنـ ماـ يـسـمـىـ رـقـمـ الـأـوـكـتـانـ الـذـيـ يـحـددـ جـوـدـةـ الـوقـودـ وـ التـأـثـيرـ السـلـبـيـ الـذـيـ يـحـدـثـ عـنـدـ إـنـخـفـاضـ رـقـمـ الـأـوـكـتـانـ وـ أـسـبـابـهـ

3

الإلكنات



يُحفّز الإيتلن (الإتن) نمو النباتات، ويعمل على إنصاج ثمارها ويعُدّ من الفحوم الهdroوجينية غير المشبعة، حيث يحتوي على رابطة مشتركة ثنائية بين ذرّتي كربون.

الأهداف:

- * يَتَعَرَّفُ إلِّى إلكنات.
- * يَسْتَنْجِنُ الصِّيغَةُ الْعَامَّةُ لِإلكنات.
- * يُسَمِّي إلِّى إلكنات وفق قواعد IUPAC.
- * يَتَعَرَّفُ بعْضُ الْخَاصِيَّاتِ الْفِيزيائِيَّةِ لِإلكنات.
- * يَتَعَرَّفُ بعْضُ الْخَاصِيَّاتِ الْكِيمِيائِيَّةِ لِإلكنات.
- * يَتَعَرَّفُ بعْضُ اسْتِخدَامَاتِ إلكنات.

الكلمات المفتاحية:

- * إلكنات.
- * تَفَاعُلُ ضم.
- * تَفَاعُلُ بلمرة.

الصيغة العامة للإلكنات: نشاط (1):

لديك الجدول الآتي الذي يمثل بعض صيغ إلكنات:

الصيغة البنائية	عدد ذرات الكربون	الصيغة الجزئية	اسم المركب
$\text{CH}_2 = \text{CH}_2$	2	C_2H_4	إتن
$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$	3	C_3H_6	بروين
$\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	4	C_4H_8	بوتن-1
$\text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$			بوتن-2



- ما العلاقة بين عدد ذرات الكربون وعدد ذرات الهيدروجين في كل مركب؟
- استنتج الصيغة العامة للإلكنات.
- حدد اللاحقة التي تميز الإلكنات.
- تُعدُّ الإلكنات مركبات هيدروكربونية غير مشبعة، فسر ذلك.

أستنتج:

- عدد ذرات الهيدروجين = $2 \times$ عدد ذرات الكربون.
- الصيغة العامة للإلكنات C_nH_{2n} .
- تميّز الإلكنات باللاحقة (ـن)
- تحتوي على رابطة واحدة مشتركة ثنائية.

نaming the alkenes according to IUPAC : نشاط (2)

أكتب اسم المركب الآتي وفق قواعد الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية IUPAC.



1. أرقّم أطول سلسلة كربونية حاوية على الرابطة الثنائية بدءاً من الطرف الأقرب للرابطة.

2. نشتّق اسم الألكن من الألكان الموافق باستبدال اللاحقة (ـان) باللاحقة (ـن) مع تحديد موضع الرابطة في السلسلة.

3. في حال وجود فروعٍ مُرتبطة بالسلسلة نكتب رقم واسم الفرع.

-4 بتنن

4. نكتب اسم المركب الناتج

نشاط (3):

أكتب اسم المركبات الآتية وفق قواعد الاتحاد الدولي للكيمياء البحثة والتطبيقية IUPAC:



الخامات الفيزيائية للألkanات :

تشابه الإلkanات والألكانات في بعض خصائصها الفيزيائية كدرجتي الانصهار والغليان.

نشاط (4):

جدولٌ يوضح علاقة الكتلة الجزيئية ودرجتي الانصهار والغليان:

اسم المركب	الصيغة المجزئية	الصيغة البنائية	الكتلة الجزيئية	درجة الانصهار °C	درجة الغليان °C
إيتين	C ₂ H ₄	CH ₂ = CH ₂	28	-103.7	-169.2
بروبن	C ₃ H ₆	CH ₂ = CH - CH ₃	42	-47.6	-185.2
بوتن-1	C ₄ H ₈	CH ₂ = CH - CH ₂ - CH ₃	56	-6.47	-185.3
بوتن-2	C ₄ H ₈	CH ₃ - CH = CH - CH ₃	56	3.7	-138.9

– حدد الحالة الفيزيائية للإلkanات في الجدول السابق عند درجة حرارة الغرفة 25°C .

– ما العلاقة بين درجتي الغليان والانصهار والكتلة الجزيئية للإلken؟

– فسر سبب انخفاض درجتي الانصهار والغليان للإلkanات.


– فسر عدم اتحاد الألكانات بالماء.

الخامات اليمانية للإلkanات : تفاعلات الضم:

تقوم الألكانات بتفاعلات ضم نظراً لوجود رابطة مشتركة ثنائية بين ذرّي كربون C من النوع π، π، π تهاجم الكواشف الرابطة π نظراً لضعفها.


ضمّ الهالوجينات

عند ضمّ الهالوجين المُذاب في رباعي كلور الكربون إلى الإيتن يعطي 1،2-ثنائي هاليد الإيتان.



مثال


ضمّ الكلور إلى غاز الإيتن يعطي 1،2-ثنائي كلورو الإيتان.



1،2-ثنائي كلورو الإيتان


ضمّ هاليدات الهدروجين:

عند ضمّ هاليدات الهدروجين مثل HBr, HI إلى الإلكناط تنتج هاليد الألكيل الموافق:



تطبيق(1)


اكتب مُعادلة تفاعل ضمّ بروميد الهدروجين إلى الإيتن، و سِمّ المُرْكَب العضوي الناتج.



برومو ايتان


ضمّ الماء:

يتمّ ضمّ الماء إلى الإيتن في وسٍطٍ حمضي ليتتجّ الإيتانول وفق التفاعل الآتي:



ضم الهdroجين (الهدرجة):

يتم ضم غاز الهdroجين إلى الرابطة الثنائية في الألكنات لتكوين الألكانات ويتم هذا التفاعل في وجود عامل حفاز مثل البلاتين Pt أو النيكل Ni أو البلاديوم Pd



إثراء: 




تحتوي الزيوت غير المشبعة مثل زيت عباد الشمس على روابط $\text{C}=\text{C}$ ، حيث يؤدي إشعاعها إلى تحولها من سوائل إلى مادة طرية يمكن دهنها بسهولة.


البلمرة:

تتميز الألكنات بقدرتها على تشكيل سلاسل طويلة عبر تفاعلات ضم متكررة لعدٍ كبير من جزيئاتها، وتُعرف هذه التفاعلات بالبلمرة، وينتج عنها مركبات تُعرف باسم البولميرات. وقد اصطلاح اسم البولميرات من اللغة اللاتинية وهو من كلمتين: بولي (وتعني متعدد) + مير (وتعني جزيء). يتم تفاعل البلمرة للإيتين على الشكل الآتي:

في حال وجود ثلاث جزيئات إيتين تنكسر الرابطة π لتشكل سلسلة طويلة كما في المعادلة الآتية:



في حال وجود n جزيء فإننا نحصل على جزيء ضخم ذي كتلة جزيئية كبيرة كما في المعادلة الآتية:



يمثل العدد n عدد كبير جدًا من الجزيئات قد يصل للملايين، لتشكل سلاسل طويلة من وحدات متكررة وقد اعتبرت هذه التفاعلات أساس الصناعة الحديثة للدائن (البلاستيك)، حيث اختلاف طول السلسلة البولميرية يؤدي لتنوع المنتجات في الصناعة.

من الأمثلة على صناعة البولميرات عند استخدام الإيتلن (الإيتلن وفق الاسم الشائع) نحصل على بولي إيتلن P.E ، يستخدم في صناعة الخزانات والحبال وغيرها:



خزانات مياه الشرب




حبال

تطبيق (2):

اكتب تفاعلاً بلمرة 1- كلورو الإيتلن، ثم سِمّ البوليمير الناتج، واذكر إحدى استخداماته في الحياة.


الحل:



يعرف 1- كلورو الإيتلن في الصناعة باسمه الشائع (فينيل كلوريد) نحصل على بولي فينيل كلوريد P.V.C . المستخدم في صناعة أنابيب نقل المياه والخراطيم البلاستيكية

نشاط (5):

تصنيع أواني حفظ الطعام من البولي ستيرين Polystyrene



المطلوب: اكتب معادلة تفاعل البلمرة.

أهمية غاز الان

ازدادت أهمية غاز الإيتلن الصناعية منذ سنوات عديدة، إذ يُستخدم في تحضير مركباتٍ كثيرةٍ؛ مثل حمض الخل والإيتانول، وكذلك يُستخدم في صناعة البلاستيك، وفي الإسراع بنضج الفواكه.

المُنتجات البلاستيكية والبيئة:

تشكّل المُخلفات البلاستيكية بشكل خاص والبوليمرات الصناعية بشكل عام مُشكلة بيئية كبيرةً وخطيرةً على مستوى العالم. هل يمكنك أن تتوقع سبب ذلك؟

يصعب التخلص منها بعد استعمالها لأنّها مواد غير قابلة للتحلل بيولوجيًا، بعكس البوليمرات الطبيعية كالسيلولوز في الورق الذي تستطيع الكائنات الدقيقة أن تحلله فهي تبقى بعد دفنها، وبالتالي تزايُد المساحات التي تحتلها هذه النفايات باستمرار، وهذا يؤدّي إلى خسارتنا لمساحاتٍ كبيرةٍ كان من الأفضل استغلالها لأغراض زراعية، كما أن دفنهما يؤدّي إلى تلوث المياه الجوفية.

كيف يمكن معالجة هذه المشكلة والحد من آثارها السلبية؟
بعض الطرق المتبعة في معالجة النفايات البلاستيكية:

- إنتاج أنواع جديدة من البلاستيك يمكن أن تتحلل بيولوجيًّا.
- حرق النفايات البلاستيكية في منشآت خاصة، واستخدام الحرارة الناتجة في توليد الكهرباء والتدافُتة، بشرط أن توجَد في هذه المنشآت أجهزة خاصة للتخلص من الغازات السامة الناتجة عن حرق بعض أنواع البلاستيك كغاز الكلور الناتج عن احتراق بولي فينيل كلوريد PVC.

إعادة التدوير:

هي عملية يتم فيها تحويل النفايات، سواء المنزليّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة، إلى مواد أخرى قابلة للاستخدام من جديد، وذلك لحماية البيئة بالدرجة الأولى، وتحسين الموارد الاقتصاديّة، وتوفير المواد الأوليّة.

- أهميّة إعادة تدوير البلاستيك:
- الحد من نفاد الموارد غير المتجددة.
- إنقاص المساحات اللازمّة للتخلص من النفايات بطرّها، واستغلال هذه المساحات لأغراض زراعيّة.
- توفير الطاقة حيث إن الطاقة اللازمّة لإنتاج منتج ما من المواد الخام أكبر بكثيرٍ من الطاقة اللازمّة لإنتاج المنتج نفسه من إعادة تدوير المخلفات.
- تأمين فرص عمل.
- تخفيض استهلاك المواد الخام وتكلفة التشغيل

تعلّمت

الصيغة العامة للإلكنات C_nH_{2n} وتميّز الإلكترونات باللاحقة (-ن).

الخصائص الفيزيائية للإلكنات:

تشابه الإلكترونات والأنكنتات في بعض خصائصها الفيزيائية كدرجتي الانصهار والغليان.

الخصائص الكيميائية للإلكنات:

تفاغلات الضم:

مثل ضم (الهالوجينات - هاليدات الهدروجين - الماء - البلمرة)

أختبر نفسك



أولاً: اختبر الإجابة الصحيحة لكلٍ مما يأتي:

1. الألكن من المركبات الآتية هو:



2. ينتج عن الاحتراق التام للإيتين في الهواء:

a. كربون فقط.

c. هدروجين فقط.

b. هدروجين + ثائي أكسيد الكربون.


d. ماء + ثائي أكسيد الكربون.

3. الجزيء المشبع بين الجزيئات الآتية هو:



ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية:

1. اكتب اسم المركبين الآتيين بحسب IUPAC:



2. اكتب الصيغة البنوية لجميع المتضادات المفتوحة الموافقة للصيغة C_4H_8 .

3. يملُك حلقي البتان والبتتن - 1 الصيغة الجزيئية نفسها. اقترح تفاعلاً كيميائياً بسيطاً يمكنُ بوساطته تمييز أحدهما عن الآخر.


4. اكتب الصيغة نصف المنشورة للمركبات الآتية:
الإيتين، الميتان، البوتان

5. اكتب الصيغة العامة للإلكنات، ثمَ استنتج منها الصيغة المجمَّلة للمركب عندما $n = 2$ ، $n = 3$ ، ثمَ اكتب اسم كلِّ منها والصيغة المنشورة.

ثالثاً: أعطِ تفسيراً علمياً لكُلِّ ممَّا يأتي:

١. يزول لون ماء البروم الأحمر عند إمداد غاز الـ C_2H_2 فيه.
 ٢. يعد البروبن مركبًا غير مشبع.


رابعاً: اكتب بالرموز الصيغة المفصلة لكل المعادلات الكيميائية المُعبر عن التفاعلات الآتية:



رابعاً: حل المسألتين الآتيتين:

المسألة الأولى:

يتفاعل 0.84 g من اللكن A مع 3.2 g من البروم وفق المعادلة الآتية:



المطلوب:

١. حدد نوع التفاعل.
 ٢. احس الكتلة المولية للألك، ثم استنتج صيغته المجمعة.



المسألة الثانية:

نريٰ تحضير 0.01 mol من غاز الإيتلن بنزع ذرّي هدروجين من جُزيء إيتان بوجود حفّاز من النّحاس في الدرجة 800°C . المطلوب:

١. اكتب المعادلة الكيميائية الممثلة لهذا التفاعل.
 ٢. احسب كتلة وحجم غاز الإيتان اللازم مقاساً في الشرطين النظاميين.




تفکیر ناقد

اكتب الصيغة النصف منشورة للمركب: 3،2-ثنائي كلورو بوتن 2 - ثم اكتب المتصاوغات الفراغية لهذه المركب محدداً اسم كل منها


أبحث أكثر

يدخل البروبن في صناعات عديدة منها صناعة مواد أولية لصناعة المطاط ابحث في ذلك مستعينا بالشايكة



4

الألكينات



يُعدُّ غاز الاستيلين C_2H_2 من الألكينات، حيثُ يُستفادُ من حرارة احتراقه في لحام المعادن

الأهداف:

- * يَتَعَرَّفُ للألكينات
- * يَسْتَنْجِنُ الصِّيغَةُ الْعَامَّةُ
لِلألكينات.
- * يُسَمِّيُّ الألكينات وفقَ قواعدِ IUPACِ.
- * يَتَعَرَّفُ بعْضُ الخصائصِ
الفيزيائيةِ للألكينات.
- * يَتَعَرَّفُ بعْضُ الخصائصِ
الكيميائيةِ للألكينات.
- * يَتَعَرَّفُ بعْضُ استخداماتِ
الألكينات.
- * يَتَعَرَّفُ بعْضُ تفاعلاتِ
البنزن.

الكلمات المفتاحية:

- * ألكينات.
- * البنزن.

الألكينات (الاستيленات)

هي مركبات هdroو كربونية غير مشبعة، تتميز بوجود رابطة مشتركة ثلاثة واحدة بين ذرتين كربون متتاليتين $-C \equiv C-$ ، وصيغتها العامة C_nH_{2n-2} ، وأبسط أفرادها الإيتين $HC \equiv CH$ ويُعرف بالإستلين.

نسمة الألكينات بحسب نمط IUPAC

لتسمية الألكينات غير المترقبة تتبع الخطوات التالية :

- نرقم ذرات الكربون في السلسلة بدءاً من الطرف القريب للرابطة المشتركة الثلاثية.
- نكتب اسم الألكان الموفق، ثم رقم ذرة الكربون التي تبدأ عندها الرابطة الثلاثية.
- نستبدل المقطع (آن) في نهاية الألكان بالقطع (ين) كما في الأمثلة التالية:

$^4CH_3-^3CH_2-^2C \equiv ^1CH$	$^3CH_3-^2C \equiv ^1CH$
بوتين-1	بروبين-1
$^1CH_3-^2C \equiv ^3C-^4CH_2-^5CH_3$	
بنتين-2	

نشاط (1):

اكتب الصيغة نصف منشورة للمركب: 3-متيل البنتين - 1

الخواص الفيزيائية للألكينات:

تشابه الألكينات مع كلّ من الإلکنات والألكانات في بعض الخصائص كما يتضح من الجدول التالي:

اسم المركب	الصيغة الجزيئية	الصيغة البنائية	الكتلة الجزيئية	درجة الانصهار C°	درجة الغليان C°
إيتين	C_2H_2	$HC \equiv CH$	26	-82	-84
بروبين	C_3H_4	$HC \equiv C-CH_3$	40	-101.5	-23.2

- تردد درجة الغليان بازدياد الكتلة الجزيئية للمركب.
- جميع الألكينات لاتذوب بالماء، ولكنها تذوب في المذيبات العضوية (غير القطبية).

نشاط (2):


ما الحالة الفيزيائية للبروبين في درجة حرارة الغرفة؟

الخاصيات اليمينية للألكينات

ستقتصر الأمثلة على تفاعل غاز الإيتين (الإستلين).


ضم الهالوجينات:

تتفاعل الألكينات مع الهالوجينات، مثل الكلور Cl_2 أو البروم Br_2 المذاب في رباعي كلور، لتعطي هاليدات الألكيل الموافق، ويتوقف نوع الناتج على كمية الهالوجين في التفاعل كما هو موضح بالمعادلة التالية:




ضم الهيدروجين:

تتفاعل غاز الاستلين مع غاز الهيدروجين في وجود عامل حفّاز، مثل البلاتين Pt أو البلاديوم Pd ، ليكون الإيتان وهذا تفاعل ناشئ للحرارة.



ضم هاليدات الهيدروجين:

يتفاعل غاز الاستلين مع غاز هاليد الهيدروجين HBr , HCl بالطريقة نفسها المتبعة مع الإلکنات.




أَهْمَيَّةُ غَازِ الْإِسْتَلِين

1. يُسْتَخَدَّمُ غَازُ الْإِسْتَلِينَ فِي صِنَاعَةِ الْمَطَاطِ الصَّنَاعِيِّ .
2. يُحَرِّقُ غَازُ الْإِسْتَلِينَ فِي جُوَرٍ مِنَ الْأَكْسِجِينِ احْتِرَاقاً تَامًاً مُعْطِيًّا لِهِبَ الْإِكْسِيِّ إِسْتَلِينَ الَّذِي يُسْتَخَدَّمُ فِي لِحَامِ وَقْطَعِ الْمَعَادِنِ مِثْلِ الْحَدِيدِ .


الْمُهَبَّاتُ الْهَدِرُوكَرُوبِونِيَّةُ الْأَرْوَمَاتِيَّةُ (الْعَطَرِيَّةُ)

الْبِنْزِينُ


يَتَشَكَّلُ الْبِنْزِينُ مِنْ حَلْقَةٍ تَحْتَوِي عَلَى سَتُّ ذَرَّاتٍ كَرْبُونٍ، تَرْتَبِطُ مَعَ بَعْضِهَا بِرَوَابِطٍ أُحَادِيَّةٍ وَثُنَائِيَّةٍ مُمْتَنَاوِيَّةٍ وَفِي الْشَّكْلِ الْأَتَى:



يُمْكِنُ كِتَابَةُ الرَّوَابِطِ بَيْنَ ذَرَّاتِ الْكَرْبُونِ فِي الْبِنْزِينِ بِأَكْثَرِ مِنْ طَرِيقَةٍ:



يُمْكِنُ التَّعْبِيرُ عَنِ الْبِنْزِينِ بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ تَجْمَعُ كُلَّا الصِّيغَيْنِ:



وَتُعَرَّفُ هَذِهِ الظَّاهِرَةُ بِالرِّنِينِ أَوِ الطَّنِينِ.



المُركّبات الهيدروكربونية الأُرُوماتيّة تسلّك سلوكاً كيميائياً مُختلفاً عن المُركّبات الهيدروكربونية الأليفاتيّة كالإلكنات، على الرّغم من أنَّ كلاً المجموعتين تمتاز بوجود روابط ثنائية في تركيبها، ويعزى هذا الاختلاف في السلوك الكيميائي إلى أنَّ البنزن أكثر ثباتاً من الإلكنات بسبب ظاهرة الطين.

الخواص الفيزيائيّة للبنزن:

سائلٌ عديم اللّون، له رائحة مميّزة، وبخاره سامٌ ومسّطّن، لا يذوب في الماء ولكنه يذوب في المذيبات العضويّة مثل الإيثر والكحول. كثافته أقلُّ من الماء، ودرجة غليانه 80.1°C ، ويجمدُ عند 5.5°C على شكل بلوراتٍ بيضاء يشتعلُ بلهبٍ ساطع مُدَخّن كما يعتبر من المذيبات الهامة؛ لأنَّه يذيبُ كثيراً من المواد العضويّة وبعض العناصر كالليود والفوسفور.

نشاط (3):


فسر عدم ذوبان البنزن في الماء.

الخواص الكيميائيّة للبنزن:

تفاعلات الاستبدال :


1. الترجمة:

يُقصَدُ بالترجمة استبدال ذرة هيدروجين من البنزن بمجموعة نيترو NO_2^- ، ويتم ذلك عن طريق معالجة البنزن بمزيج حمضي من حمض الأزوت والكبريت المركّبين، والذي يُعرف بالمزيج المُترسِّج وفق المعادلة الآتية:




2. الْهَلْجَةُ:

هي العملية التي يتّم من خلالها استبدال ذرة هيدروجين من البنزن بذرة هالوجين، وعادة تكون Cl أو Br، ويتم ذلك عن طريق معالجة البنزن بالهالوجين في وجود ملح الحديد (III) كعامل حفاز.



٢- تفاعلات الضم:

يضم البنزن الهدروجين مُشكلاً حلقي الهكسان.



نشاط (4):

فِسْر تَفَاعُل الْبَنْزَن تَفَاعُلَات ضَمّ

تعلیمات

- الألكيّنات مُركّبات هdro-كربونية تتضمّن رابطة مشتركة ثلاثيّة واحدة بين ذرتَي كربون متاليّة وصيغتها العامة C_2H_{2n-2} .
 - درجة الغليان للمُركّبات الألكيّنية تزداد بازدياد الكتلة الجزيئيّة للمُركّب.
 - الألكيّنات أكثر نشاطاً من الألكانات وتتفاعل بالضمّ.
 - البنزén أبسط المُركّبات الهdro-كربونية الأروماتيّة، وهو يتكونُ من حلقةٍ ذات روابطٍ أحاديّة وثنائيّة مُتبادلَة.
 - أهمّ تفاعلات التبادل في البنزén هي النّترجة - الـهـلـجـنة.

أختبر نفسك



أولاًً: اختر الإجابة الصحيحة لـكـل مـمـا يـأتـي:

١. الألکین من المركبات الآتية هو:



2. ينتج عن الاحتراق التام لـ(الإيتين) في الهواء:

a. ماء + ثنائية، أكسيد الكربون.

مکالمہ

c. هدر و جین فقط.



b. هدروجين + ثانائي أكسيد الكربون.

٢٥

• 54 •

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية:

١. اكتب اسم المركّبين الآتىين بحسب IUPAC




٢. اكتب الصيغة نصف المنشورة لكل من المركبات الآتية:

٣- كلورو-٤،٤-ثنائي متيل الهكسين-

3- متيال الينتيرن

٣. اكتب الصيغة العامة للألكينات، ثم استنتج منها الصيغة المجمّلة للمركب عندما $n = 2$ ، و $n = 3$.
ثم اكتب اسم كلّ منها والصيغة المنشورة.

ثالثاً: أكما المعدلات الكيميائية المُعيَّنة عن التفاعلات الآتية:



رابعاً: أعط تفسيراً علمياً لكل مما يأتي:

1. لا تنحل الألkinات في الماء.
2. يعد البنزن أكثر ثباتاً من الألkinات الموافقة ذات السلسل المفتوحة.
3. يُعد البروبين مركباً غير مشبع.

خامساً: حل المسألة الآتية:

يتفاعل 5.2 g من غاز الإيتين (الاستيلين) مع كمية كافية من غاز الهيدروجين يوجد حفاز مناسب، ويتكون الإيتان فقط وفق المعادلة



المطلوب حساب:

– عدد مولات غاز الهيدروجين المتفاعـل.

– حجم غاز الإيتان المُتكـون.

– كتلة غاز الإيتان المُتكـون.

علمـاً بأن حجوم الغازات مقيسـة في الشرطـين التـظامـيين.


(C:12, H:1)

تفكير ناقد

يقوم البنزن بتفاعلات الاستبدال بشكل أكبر من تفاعلات الضم، بينما تقوم الألkinات بتفاعلات ضم بشكل أكبر من تفاعلات الاستبدال مع العلم أن كلا المركبين يحتويان على روابط مضاعفة؟

أبحث أكثر

يعد الاستيلين من المركبات الهامة صناعياً
ابحث في الشابكة أو في مكتبة مدرستك عن طائق اصطناع الاستيلين.



5

النفط والغاز الطبيعي



تراكمت بقايا الكائنات الحية منذ ملايين السنين في البحار والمحيطات، واستقرت في القاع، وتجمعت فوقها الرؤاسب والطمي بوجود الضغط والحرارة العالية وعدم وجود الأكسجين اللازم لتحللها، تفككت المواد العضوية إلى مركبات هيدروكربونية أطلق عليها اسم النفط.

الأهداف:

- * يعرّفُ منشأ النفط.
- * يفهمُ مكونات النفط.
- * يشرحُ تصفية النفط.
- * يحدّدُ استخدامات مشتقات النفط.

الكلمات المفتاحية:

- * النفط.
- * الغاز الطبيعي.
- * التقطر التجزيئي.

نشاط (1):



- ما مصدر الغاز المنزلي ووقود السيارات والحافلات والطائرات والسفن والمصانع؟
- ما الوقود اللازم لتوليد الكهرباء في المحطات الحرارية؟
- من أين نحصل على الزفت المستخدم في تعبيد الشوارع؟
- لماذا سمي النفط بالذهب الأسود؟

تصنيف النفط

يمكن تصنيف النفط بحسب الخصائص الفيزيائية والكيميائية إلى ثلاثة أصناف:

1. النفط الخفيف ذو أساس بارفيني: الذي يحتوي على نسبة عالية من الألكانات.
2. النفط الثقيل ذو أساس أسفلتي: الذي يحتوي على نسبة عالية من الزيوت الثقيلة.
3. النفط المختلط: الذي يحتوي على كلا النوعين السابقين بنسبة مُتقاربة.

كما صنف بحسب ما يحتويه من الكبريت:

1. نفط ذو محتوى كبريتى عالى: نسبة الكبريت فيه أكثر من 3% وزناً.
2. نفط ذو محتوى كبريتى متوسط: نسبة الكبريت فيه أقل من 3% وأكبر من 1% وزناً.
3. نفط ذو محتوى كبريتى منخفض: نسبة الكبريت فيه أقل من 1% وزناً.

إثراء:

يتم تنقية النفط المستخرج قبل عملية التقطير لأن وجود بخار الماء يؤدى إلى حدوث انفجار في برج التقطير، أمّا الأملاح فتسبب تأكل الحديد المصنوع منه البرج.

تلذيم النفط


نشاط (2):

هل يمكن استخدام النفط مباشرة بعد استخراجه؟

يحتوي النفط المستخرج على غازات ذائبة إضافة للماء والأملاح والمركبات الكبريتية التي تشكل ضرراً على المعدّات في حال استخدامه، لذلك يمر بعدة مراحل لعزل الغاز والتخلص من المركبات المُنحلّة فيه قبل تقطيره.

يتم التقطير التجاري للنفط على الشكل:

1. تسخين النفط ليتحوّل معظمه إلى بخار ويقى جزء سائل يترسب في قاع البرج.
2. يوجه البخار إلى مكثف بدرجة حرارة محددة تعمل كوسيلة تبريد وتبخير في آن واحد معاً، حيث تتكون علىها الزيوت الثقيلة ذات درجات الغليان المرتفعة بينما تبخّر المركبات الخفيفة ذات درجات الغليان المنخفضة.



نشاط (3):

اعتماداً على الشكل السابق:
أذكر أهم المنتجات النقطية الناتجة عن برج التقطير التجاري وأهم استخداماتها

الغاز الطبيعي

يتكون الغاز الطبيعي في ظروف مشابهة لتلك التي يتشكل عندها النفط.

مكونات الغاز الطبيعي:

مزيج من المركبات الهيدروكربونية، تحوي من 1 إلى 4 ذرات كربون تكون نسبة الميتان فيه ما بين 70% إلى 100%.

بعض استخدامات الغاز الطبيعي:

- في منزلياً، في الطبخ.
- في الصناعات الكيميائية.
- في محطات توليد الكهرباء.
- والتدافئة، وتسخين الماء.

تعلمت

- يتشكل النفط من بقايا الكائنات الحية.
- يمكن تصنيف النفط بحسب الخصائص الفيزيائية والكيميائية إلى ثلاثة أصناف:
 1. النفط الخفيف: الذي يحتوي على نسبة عالية من الألكانات.
 2. النفط الثقيل: الذي يحتوي على نسبة عالية من الزيوت الثقيلة.
 3. النفط المختلط: الذي يحتوي على كلا النوعين السابقين بنسبة مترادفة.
- يصنف النفط بحسب ما يحتويه من الكبريت إلى نفط ذي محتوى كبريتى (عالٍ، متوسط، منخفض).
- تتحول بقايا الكائنات الأولية بعد مئات السنين من الزَّمن نتيجة الضغط والحرارة تحت الطبقات الرسوبية إلى غاز طبيعي.

أختبر نفسك



أولاً: اجب عن الأسئلة الآتية:

1. صنف النفط بحسب الخصائص الفيزيائية إلى عدّة أصناف، ما هي؟ قارن بينها.
2. كيف يتشكل النفط؟ ولماذا يعُد من أنواع الطاقة غير المتجددة.
3. فسر ما يلي:
 - a. تحوّل بقايا الكائنات الأولية إلى غاز طبيعي.
 - b. سُمّ النفط بالذهب الأسود؟
4. اشرح آلية التقطر التجزئي.

أبحث أكثر



ابحث في الشبكة، عن أنواع المواد المُنبعة من مصافي التقط وكيف يمكن تقليل ضررها لحماية البيئة؟

أسئلة الوحدة

السؤال الأول: اربط المفاهيم الآتية لتكون خارطة مفاهيم مناسبة:

الألكين

المركيبات العضوية

روابطها مشتركة أحادية فقط

هيدرو كربونية مشتقة

تحوي رابطة مشتركة ثلاثة

الألكان

الألكين

هيدرو كربونية

تحوي رابطة مشتركة ثنائية

السؤال الثاني: اكتب الكلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة في كل مما يلي :

1. تفاعُل الألkanات تفاعُل ضم.

2. الألkenات مركبات هيدرو كربونية تحتوي على رابطة ثنائية بين ذرَّيَّ كربون متاليتين.

3. البوتان هو مركب غير مشبع يحتوي على 4 ذرات كربون.

4. الصيغة الجزيئية C_4H_{10} يمكن تمثيلها بثلاث صيغ منشورة.

5. درجة غليان المركب هبتين - 1 أقل من درجة غليان المركب أوكتين - 1.

السؤال الثالث: اختار الإجابة الصحيحة:

1. الهيدرو كربون الذي يتميّز إلى الألkanات من المركبات الآتية هو:

C_4H_{10} .d

C_4H_8 .c

C_5H_8 .b

C_4H_6 .a

2. الصيغة العامة التي يتميّز إليها المركب :

C_5H_8

C_nH_{2n+2} .d

C_nH_{2n-2} .c

C_nH_{2n} .b

C_nH_{2n+1} .a

3. عدد الروابط المشتركة الأحادية في المركب ذي الصيغة الكيميائية C_3H_8 هي:

12 .d

10 .c

8 .b

6 .a

4. المركب ذو درجة الغليان الأعلى من المركبات الآتية هو:

CH_4 .d

C_3H_4 .c

$CH_3CH_2CH_2CH_3$.b

$CH_3CH_2CH_3$.a

5. يزيد عدد ذرات الهيدروجين في حلقي الهكسان عن عددها في البنزين بـ:


ذرَّتين .d

ثمان ذرات .c

ست ذرات .b


أربع ذرات .a

السؤال الرابع: ارسم متصاوِغاً واحداً لكل مركبٍ من المركبات الآتية محدداً نوع التصاوِغ:



السؤال الخامس: هل تُعد الصيغة 3-متيل البوتان صحيحة؟ فسر إجابتك.

السؤال السادس: أكمل المعادلات الآتية:



السؤال السابع: لديك المركبات الهيدروكربونية الآتية:

4-متيل بنتين -2,2 -ثنائي متيل بوتن -1 .

المطلوب:

1. اكتب الصيغة نصف المنشورة لكل منها.
2. حدد نوع ذرات الكربون فيها (أولية - ثانوية - ثالثية).
3. حدد نمط تهجين كل ذرة كربون.

مشروع النفط والغاز الطبيعي

يُعدّ النفط مصدراً أساسياً للطاقة غير المتجددة، فضلاً عن أنه يحتوي على عددٍ كبيرٍ من المواد الأولية التي تقوم عليها الصناعات البترو كيميائية.

هدف المشروع

التعرّف على النفط والغاز والصناعات البتروكيميائية في سوريا.

مراحل المشروع

أولاً - التخطيط:

1. يتعرّف على مَنْشأَ النفط والغاز الطبيعي.
2. يتعرّف على طرائق تكرير النفط والغاز.
3. يتعرّف على أهمية النفط الاقتصادية والاستراتيجية كمصدر للطاقة والمواد الأولية.
4. يبحث في طرائق معالجة فضلات الصناعات البتروكيميائية والحدّ من آثارها السلبية.

ثانياً - التنفيذ

- تقسيم الطّلاب إلى أربع مجموعات.
 - المجموعة الأولى: تبحث في أصل النفط.
 - المجموعة الثانية: تبحث في تكرير النفط والغاز.
 - المجموعة الثالثة: تبحث في أهمية النفط كمصدر للطاقة والمواد الأولية.
 - المجموعة الرابعة: تبحث في مشكلة فضلات الصناعات البتروكيميائية والاستفادة الأمثل منها، بحيث تتم عملية المحافظة على البيئة.

ثالثاً - التقويم:

تبادل المعلومات بين المجموعات ومناقشتها، وتسليم نسخة ورقية أو إلكترونية حول البحث خلال مدة خمسة عشر يوماً.


الوحدة الرابعة

الصناعات والتّعدين

أهداف الوحدة:

- يَعْرَفُ طرائقَ تَصْنِيعِ الْمَوَادِ الْأُولَى.
- يَعْرَفُ أَشْكَالَ وَجُودِ بَعْضِ الْمَعَادِنِ فِي الطَّبِيعَةِ.
- يَعْرَفُ التّعدينَ.
- يَعْرَفُ السّبائكَ.





٧

المُوادُ الأوَلِيَّةُ وتقنياتِ التصنيع



تهتمُ الجمهوريَّةُ العربيَّةُ السُّورِيَّةُ بالحرف، ومنها صناعةُ الفخار الذي يدخلُ في صناعته الطينُ والرملُ وبعضُ الفخار القديم كموادٍ أولية، ويلوّن بأكاسيد المعادن.

الأهداف:

- * يميِّز بينَ المُوادِ الأوَلِيَّةِ الطبيعيةِ والصناعيَّةِ.
- * يعرِّفُ طرائقَ تصنيعِ المُوادِ الأوَلِيَّةِ.
- * يعرِّفُ تقنياتِ التصنيع الصناعيَّ للموادِ الرئيسيَّةِ ذاتِ الاستخدامِ الشائعِ.
- * يعرِّفُ طرائقَ تصنيعِ بعضِ المنتجاتِ الصناعيَّةِ (أسمندة، إسمنت، زجاج).

الكلمات المفتاحية:

- * المادَةُ الأوَلِيَّةُ.
- * النَّشادرُ.
- * حمضُ الأزوَوتُ.
- * الأوْلِيُومُ.
- * الأسمدةُ الأزوَوتِيَّةُ.
- * الأسمدةُ الفوسفورِيَّةُ.
- * إسمنتُ.
- * زجاجُ.

المواد الأولية نشاط (1)

لديك المواد الأولية الآتية:
حمض الكبريت - القطن - هيدروكسيد الصوديوم - الحجر الكلسيي - الرمل - الخشب
المطلوب:
صنف هذه المواد إلى مواد أولية طبيعية أو صناعية.

نتيجة:

المواد الأولية هي إما مواد طبيعية أو مواد تحضر صناعياً.

إثراء:




اشتهر السّوريّون منذ القدم بصناعة الصابون، حيث يصنع في مدينة حلب نوع من الصابون يسمى صابون الغار مواده الأولية، هي زيت الزيتون وهيدروكسيد الصوديوم بشكلٍ أساسيٍ وكمية قليلة من زيت الغار.

طريق التّحضير المُناعي لبعض المواد الأولية:

١- صناعة النشادر (طريقة هابر - بوش):

نشاط (2):

الاحظ المخطط وأجيئ:



- حدد المواد الأولية التي تدخل في تحضير غاز النشادر.
- بين دور كلٍ من ملف التبريد والحفاز.

أستنتج:

يتفاعل غاز التتروجين والهيدروجين ببنسبة 3:1 على التوالي، عند الدرجة 475°C ، وتحت الضغط 300 atm، بوجود حفاز أكسيد الحديد III المنشط ببعض أكاسيد المعادن مثل أكسيد الألمنيوم. يلاحظ أن نسبة النشادر تزداد بازدياد الضغط وانخفاض درجة الحرارة.


نشاط (3):

اكتب معادلة تفاعل تحضير النشادر، هل يعد التفاعل تام أم عكوس؟

2- صناعة حمض الآزوت:

نشاط (4):

الاحظ الشكل وأجيب:




- حدد المواد الأولية التي تدخل في تحضير حمض الآزوت.
- حدد الغاز المنطلق من برج الأكسدة.
- أكتب المعادلة الكيميائية المعبرة عن التفاعل الحادث في برج التبريد.
- صِف ما يحدث في برج الامتصاص.

أستنتج:

1. يدفع خليط من الهواء وغاز النشادر في برج خاص، فيه شبكة من البلاتين (عامل مُساعد)، ويُسخن إلى الدرجة 900°C، فيتاكسد غاز النشادر بالأكسجين إلى أكسيد النتروجين NO وفق المعادلة:



2. يبرد المزيج الغازي المتشكل بسرعة حتى لا يتفكّك الأكسيد المتشكل في برج خاص بوساطة تيارٍ من الهواء، حيث يتحوّل الأكسيد NO إلى NO_2 وفق المعادلة:



3. يحلّ NO_2 بالماء ويتشكل حمض الأزوت وفق المعادلة:



تعادل أكسدة NO الناتج عن التفاعل إلى NO_2 معطيًا حمض الأزوت من جديد. هذه الطريقة مردودها من محلول حمض الأزوت بتركيز 68%， أمّا حمض الأزوت المدخن 98% فيحضر من انحلال NO_2 في محلول حمض الأزوت الممدد والساخن بوجود الأكسجين وتحت ضغطٍ معين.


نشاط (5):

ما وظيفة كلٌ من (شبكة البلاتين، برج التبريد) عند تحضير حمض الأزوت؟

3 - صناعة حمض الكبريت:

نشاط (6):

الاحظ المخطّط وأجيّب:




- حدد المواد الأولية التي تدخل في تحضير حمض الكبريت.
- حدد الغاز المُنطلق من برج التحويل (وحدة التحفيز).
- عبر بمعادلة كيميائية عن تفاعل تحضير الأوليوم.

أستنتج:

يحضر حمض الكبريت من الكبريت كمادة أولية وفق المراحل الآتية:

1. يدخل الكبريت مع تيار من الهواء الجاف إلى وحدة الحرق فيتاكسد معملياً غاز ثانوي أكسيد الكبريت وفق المعادلة:



2. تمرر الغازات إلى برج التحويل المحتوي على حفاز أكسيد الفناديوم ليتأكسد غاز ثانوي أكسيد الكبريت إلى ثلاثي أكسيد الكبريت في درجة حرارة معينة وفق المعادلة:



3. يُمتص غاز SO_3 بوساطة حمض الكبريت المُضاف ليتَّأكسد الأوليوم



4. يضاف الماء إلى الأوليوم فتحصل على حمض الكبريت وفق المعادلة:



5. تنطلق الغازات غير المتفاعلة من فتحة أعلى البرج.


نشاط (7):

ما التفاعل الحادث في كل من وحدتي التحفيز، والامتصاص؟

4- صناعة حمض كلور الماء:

يُحضر حمض كلور الماء بعدة طرائق منها:

1. الاتّحاد المباشر بين الكلور والهدروجين وفق التفاعل الآتي:



يُذاب غاز كلوريد الهدروجين بالماء للحصول على الحمض بتركيز معيّن.

2. تفاعل أملاح الكلوريدات مع حمض الكبريت. مثال: تفاعل كلوريد الصوديوم مع حمض الكبريت وفق ما يأتي:



يُذاب غاز كلوريد الهدروجين بالماء للحصول على الحمض بتركيز معيّن.

نشاط (8):

- يُحضر كلوريد الأمونيوم من تفاعل حمض كلور الماء مع غاز النشادر. أكتب المعادلة المعبّرة عن التفاعل بشكل موزون.




جابر بن حيان من علماء العرب يعدّ أول من فصل الذهب عن الفضة بوساطة الحمض وشرح عملية تحضير وتنقية بعض المعادن.

يُعَدُّ أَوْلُ مِنْ حَضَرَ حَمْضَ الْكَبِيرِتِ بِتَقْطِيرِ مَادَّةِ الشَّبْ وَحَمْضِ الْأَزُوتِ، وَحَضَرَ حَمْضَ كُلُورِ الْمَاءِ وَسَمَّاهُ رُوحَ الْمَلْحِ.

5- صناعة حمض الفوسفور بالطريقة الحرارية:

تمُّ وفقَ المراحل الآتية:

١. تعتمد على إرجاع فلزات الفوسفات إلى فوسفور بوساطة الكربون.
 ٢. يؤكسد الفوسفور الناتج بالأكسجين في درجات الحرارة العالية متحولاً إلى خماسي أكسيد الفوسفور.
$$P_4 + 5O_2 \longrightarrow 2P_2O_5$$



3. يمتلك خماسي أكسيد الفوسفور الماء، ويتشكل حمض الفوسفور.

$$\text{P}_2\text{O}_5 + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_3\text{PO}_4$$



طرائق صناعة بعض امتحانات السمائة

صناعة الأسمدة:

نشاط (9):

- ما أهم العناصر التي تحتاجها النباتات؟
 - كيف نعوض نقص العناصر الأساسية في التربة الالزمة لنمو النباتات؟

الأسمدة الفوسفاتية:

يساهم الفوسفور في نمو النبات والمزروعات، ومن أهم أنواع الأسمدة الفوسفاتية:

١. السوبر فوسفات: وهو عبارة عن حبيبات تحتوي فوسفات أحادية الكالسيوم مترافق مع كبريتات الكالسيوم، ويُعد من الأسمدة الرّخيصة الثمن.
 ٢. السوبر فوسفات المضاعف: وهو سُمادٌ عالي التركيز يحتوي بشكل رئيس فوسفات أحادية الكالسيوم من دون كبريتات الكالسيوم كما يحتوي بعض فوسفات حديد، المنيوم، السيلikon.

نشاط (10):

قارن بين السوبر فوسفات والسوبر فوسفات المضاعف من حيث مكوناته؟

تحضير الأسمدة الفوسفاتية صناعياً:



تم بطرقَيْن :

1. تحضير السماد بمعالجة فلزات فوسفات ثلاثي الكالسيوم بحمض الكبريت، حيث يتشكل فوسفات أحادي الكالسيوم وكبريتات الكالسيوم الصاربة بعملية التحضير.
2. تحضير السماد بمعالجته فلزات فوسفات ثلاثي الكالسيوم بحمض الفوسفور، حيث يتشكل فوسفات أحادي الكالسيوم.

نشاط (11):

برأيك أي طريقة أفضل في صناعة السماد الفوسفاتي، ولماذا؟

تحضير الأسمدة الآزوتية صناعياً:




أهم أنواع الأسمدة الأزوتية :

1. الـ **اليوريا** $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$: تُحضر من تفاعل الأمونيا مع ثنائي أكسيد الكربون وفق المعايرة :



2. كبريتات الأمونيوم : $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

تحضر من تفاعل حمض الكبريت مع الأمونيا تحت ضغط منخفض واسترداد البلورات بوساطة طارد مركزي أو مرشح وفق المعايرة :



3. نترات الصوديوم NaNO_3 : استعملت كسماد جيد للقطن والتبغ.

ووجدت في تشييلي بشكل مادة خام، تم سحقها وطحنتها، ثم ترشح في أوعية معينة بعد الغسل . يؤخذ الناتج عن الترشيح ليُبرد في وحدات خاصة، فيترسب نترات الصوديوم البلورية .

4. نترات الكالسيوم: ينتج من تفاعل حمض الأزوت مع كربونات الكالسيوم وفق المعايرة:



يجب حماية هذا السماد لأنّه يمتّص الرطوبة لذلك يخلط مع مواد كارهة للماء وعادةً يُمزج مع نترات الأمونيوم.

إثراء:

تُجمّع الأغذية التالفة والمنتهية الصلاحية لمعالجتها، ولصنع الأعلاف والأسمدة منها.
كل ذلك يدل على تقدّم المجتمع، حيث إنّ مستقبله يتوقف على مدى التّطوير العلمي فيه
ولا سيما في مجال الكيمياء.

صناعة إسمنت:



اكتشف الإنسان أنواع من الصخور تتصلب عند إضافة الماء له واعتمدَه في البناء، وكان النّواة لصناعة الإسمنت، وأصل الكلمة إسمنت في المصطلح اللاتيني يعني المقطع الحجري.

المواد الأولية في صناعة الإسمنت:

تُقسم المواد الأولية إلى قسمين هما:

1. الغضار، حبيبات تحوي بشكل رئيسي سيليكات الألمنيوم المائية، وقد يحتوي أيونات الألمنيوم أو الحديد أو... بدلاً من أيون السيليكون، مما يؤدي إلى اختلاف في خصائصه ولون الغضار.
2. الكلس (كربونات الكالسيوم).



مراحل صناعة الإسمنت :

تم صناعة الإسمنت وفق المراحل التالية :


1. تكسير المواد الأولية وسحقها وتجفيفها.
2. خلط المواد الأولية بنسب معيّنة.
3. تسخين المزيج في أفران بالدرجة تتراوح بين $1400 - 1600^{\circ}\text{C}$ ويُسمى الخليط الناتج كلينكر.
4. يُمزج الكلنكر بعد تبريده مع كمية صغيرة من مادة مبطئة للتصلب كالجص.
5. يُسحق المزيج من جديد للحصول على الإسمنت.
6. يُخزن في مستودعات لمدة لا تقل عن عشرة أيام.
7. يمكن الحصول على عدّة أنواع من الإسمنت من خلال تغيير نسب المزج وإضافة مواد أخرى.

نشاط (13):

ميّز بين الإسمنت والكلنكر؟

صناعة الزجاج :

اكتشف الفينيقيون الزجاج عندما أضرم بعض بخارتهم النار فوق رمال الشاطئ، فتشكلت كتلة زجاجية على الرمال نتيجة الحرارة، وتطورت فكرة هذه الصناعة، حيث اشتهر الدمشقيون بهذا الفن، وهذا ما يبدو واضحاً بالسيف الدمشقي الموضوع في ساحة الأمويين.



المواد الخام المستخدمة في صناعة الزجاج :

يُستخدم في صناعة الزجاج المواد الخام الآتية:

1. رمل السيليكا الذي يحتوي أكسيد السيليكون.
2. كربونات الصوديوم.
3. الحجر الكلسي.
4. قطع الزجاج الصغيرة التي تحتاج إلى إعادة تدوير (الكسارة).

يحتاج الزجاج إلى 4000 سنة ليتحلل، حيث يؤدي تراكمه إلى تلوث البيئة لذلك يعاد تدويره، ويُستخدم في صنع القوارير والعلب الزجاجية الجديدة.

تحضير الزجاج صناعياً:

تمر صناعة الزجاج بعدة مراحل هي :

1. تُوزَّن المواد الأولية بحسب معيينة، ثم يتم مزجها، ثم تُنقل إلى الفرن ليتم صهرها، فتحوَّل إلى عجينة.



2. تُشكَّل العجينة بالشكل المطلوب بعدة طرق، كالتفخ والتشكيل الآلي مع مراعاة السرعة قبل أن يتحوَّل الزجاج إلى الحالة الصلبة.

3. يبرد الزجاج المشكَّل بفرنٍ خاصٍ عند الدرجة من $600 - 400^{\circ}\text{C}$ ، وتتم هذه العملية ببطء.

4. تُصقل وتنظف قطع الزجاج بعد التبريد لتصبح جاهزةً للاستخدام.

إثراء:

أنواع الزجاج:

نوع الزجاج	استخدامه
السيليكا المزججة	صنع العدسات والمواشير.
زجاج الكلس الصودي	صناعة الألواح الزجاجية والأواني.
الزجاج السائل	1- صناعة الدهانات السيликاتية. 2- يستخدم في لصق أوراق الكرتون.
الزجاج الرصاص	صناعة زجاج الزينة والمصابيح.
زجاج البوروسيليكات	1- صنع الأجهزة المخبرية الكيميائية والصناعية. 2- صناعة أواني الطهي.
الزجاج الخاص (الملون - الفوسفورى- الشفاف- الليف الزجاجي- زجاج الأمان)	أنواع مُتعددة من الاستخدامات

- المواد الأولية هي إما مواد طبيعية أو تُحضر صناعيًّا.
- غاز النشادر NH_3 يستخدم كمادة أساسية في صناعة الأسمدة الأزوتية واليوريا، يُحضر صناعيًّا بطريقة هابر - بوش.
- حمض الأزوت يدخل في صناعة الأسمدة يُحضر بأكسدة غاز النشادر بأكسجين الهواء، فيتكون أكسيد الأزوت NO_2 الذي ينحل بالماء مُعطيًا حمض الأزوت.
- حمض الكبريت يُحضر بأكسدة الكبريت بالهواء وبوجود حفاز أكسيد الفناديوم يتشكّل غاز SO_3 ، الذي ينحل بحمض الكبريت المركّز مشكلًا الأوليوم، يضاف الماء إلى الأوليوم ليتشكّل حمض الكبريت.
- يُحضر حمض كلور الماء بعدة طرائق أبرزها: الاتّحاد المباشر بين الكلور والهالوجين.
- يُعد حمض الفوسفور من المواد الأولية المهمة في صناعة الأسمدة الفوسفاتية . يُحضر صناعيًّا بالطريقة الحرارية، حيث ترجع فلزات الفوسفات بالكربون إلى فوسفور الذي يؤكسد مُعطيًا P_2O_5 خماسي أكسيد الفوسفور الذي يمتص الماء مُعطيًا حمض الفوسفور.
- الأسمدة هي مواد طبيعية أو مصنوعة تضاف إلى التّربة لتمدّها بعنصر غذائي أو أكثر، وتعويض ما تقدّه التّربة من العناصر المغذية للنبات وتزييدُ من خصوبة التّربة منها الأسمدة الأزوتية (اليوريا - كبريتات الأمونيوم - نترات الصوديوم - نترات الكالسيوم). منها الأسمدة الفوسفورية (السوبر فوسفات - السوبر فوسفات المضاعف).
- الإسمنت مادة تُستخدم بالبناء، تُحضر بسحق المواد الأولية (الغضار والرمل) وخلطها بالنسبة المطلوبة، ثم تسخينها للحصول على الكلنكر الذي يُمزج بعد تبريدِه مع الجص، ويُسحق الناتج للحصول على الإسمنت .
- صناعة الرّجاج: توزن المواد الأولية (الرمل - كربونات الصوديوم - الحجر الكلسي - الكسارة) بحسب معيّنة، ثم يتم خلطها وتنقل إلى الفرن ليتم صهرُها وتحوّل إلى عجينة. لتشكل بعد طائق كالنفح والتشكيل الآلي ثم ييرد الرّجاج المتشكل ببطءٍ في فرنٍ خاص عند الدرجة 600°C - 400°C ، ثم تصقل قطع الرّجاج وتنظف لتصبح جاهزة للاستخدام.

أختبر نفسك




أولاً: أجب عن الأسئلة التالية :

1. عدد مراحل صناعة الإسمنت.

2. ما المواد الأولية التي تدخل في صناعة الزجاج.

3. ما أهمية الأسمدة للترابة الزراعية.

4. أي سماد تختاره لتسمييد أرض فقيرة بالأزوٰت غنية بالبوتاسيوم من السمادين الآتىين:



ثانياً: أعطِ تفسيراً علمياً لكلٍّ مما يأتي :



1. يحفظ سماد نترات الكالسيوم بمزجه بـ نترات الأمونيوم.

2. يستخدم حمض الكبريت في تجفيف الغازات.

3. يستخدم فوسفات أحادي الكالسيوم في الأسمدة الفوسفورية.

ثالثاً: قارن بين السوبر فوسفات والسوبر فوسفات المضاعف من حيث التركيز والحببات التي يحتويها السماد

رابعاً: أكمل المعادلات الآتية، ثم وزنها:



خامساً: يتفاعل 5g من كربونات الكالسيوم مع حمض الكبريت الممدد. المطلوب :

1. اكتب المعادلة الكيميائية بشكل موزون.

2. احسب كتلة الراسب الناتج.

3. احسب عدد مولات الحمض المتفاعل .

4. احسب حجم الغاز المنطلق في الشرطين النظاميين.

(S:32 , H:1 , O:16 , Ca:40)

تفكير ناقد



السوبر فوسفات سماد غير مرغوب فيه مقارنة بالسوبر فوسفات المضاعف، فسر ذلك.

أبحث أكثر



ابحث في مكتبة المدرسة و الشبكة عن صناعة الأسمدة الكيميائية في سوريا موضوعاً:

1. أنواع الأسمدة الكيميائية المصنعة .

2. الآثار السلبية لاستخدام الأسمدة الكيميائية في الزراعة.

3. طرائق الاستفادة من الأسمدة الكيميائية في الزراعة .

2

المَعَادُنُ وَالسِّبَائِكُ

الأَهْدَافُ:

- * يَتَعَرَّفُ أَشْكَالَ وَجُودِ بعضِ الْمَعَادِنِ فِي الطِّبِيعَةِ وَمَصَادِرِهَا.
- * يَعْرِفُ عَمَلِيَّةِ التَّعْدِينِ.
- * يَشْرُحُ اسْتِخْرَاجِ الْمَعَادِنِ مِنْ خَامَاتِهَا.
- * يَتَعَرَّفُ بِنِيَّةِ السِّبَائِكِ.
- * يَذَكُرُ بَعْضُ خَاصِيَّاتِ السِّبَائِكِ.

الكلمات المفتاحية:

- * التعدين.
- * السبائك.



عِرَفَ الْإِنْسَانُ مِنْذَآلَافِ السَّنِينِ الْمَعَادِنَ الَّتِي تَدْخُلُ فِي تَرْكِيبِ الْقَشْرَةِ الْأَرْضِيَّةِ، وَتَمَكَّنَ مِنْ اسْتِخْرَاجِهَا وَاسْتِخْدَامِهَا فِي صَنْعِ الْأَدْوَاتِ وَالْحَلِيِّ، وَمَعَ النَّطُورِ الْوَاسِعِ فِي الصَّنَاعَةِ تَطَوَّرَتْ عَمَلِيَّاتُ اسْتِحْصَالِ الْمَعَادِنِ مِنْ باطنِ الْأَرْضِ لِتَلْتَيِ احْتِياجَاتِ الْمَصَانِعِ لِلْمَوَادِ الْأُولَى وَلِدَعْمِ اقْتَصَادِ الدُّولِ.

أَشْكَالُ وَجُودُ بَعْضِ الْمَعَادِنِ فِي الطَّبِيعَةِ :



عروق الذهب



بلاتين متتركز في الصخر



فلز البيركسيت

نشاط (1) :

- ما أهم المعادن التي توجد حزّةً في الطبيعة؟
- ما أهم المعادن التي توجد على شكل فلزات؟
- ما الأشكال التي تأخذها المعادن في القشرة الأرضية؟

استنتاج

- يوجد الذهب حراً في الطبيعة على شكل عروقٍ أو مع الرواسب الطينية، وقد يوجد البلاتين متتركزاً في التكوين الصخري.
- توجد بعض المعادن مثل الألمنيوم والحديد على شكل فلزات طبقية.

نشاط (2) :

أفسر وجود الذهب والبلاتين بشكل حرٌّ في الطبيعة، بينما الألمنيوم وال الحديد يوجد على شكل مركبات.

إثراء:

يتكون الماء الملكي من مزيج من حمض الأزوت وكلور الماء بنسبة 3:1، وسمى بالماء الملكي لقدرته على إذابة الذهب.

التعدين

للحصول على المعادن من خاماتها، لابد من القيام بمجموعة عمليات مترابطة تدعى التعدين.

نشاط (3) :

ما العمليات الأساسية في التعدين؟

أستنتج:

يتضمن التعدين العمليات الآتية :

1. المعالجة الأولية:

تضمن الحفر وتجهيز كميات من الصخور التي تحتوي على كميات كبيرة ومتاسبة من المعدن.




2. المعالجة الآلية والفيزيائية للفلزات:

يكسر الفلز إلى قطع صغيرة بآلات خاصة، ثم يمرر عليه تيار مائي فيحمل القسم الأكبر من الشوائب.

3. المعالجة الكيميائية للفلزات:


تهدف إلى الحصول على المعدن من مركباته وتحتفل بحسب نوع الفلز.

1. الفلز على شكل أكسيد: يرجع بفحm الكوك وبوجود الحرارة، كما في إرجاع أكسيد النحاس II.



2. الفلز على شكل كربونات: يتبع على مرحلتين:


– تسخن الكربونات مثل (كربونات النحاس II) بوجود فحم الكوك فتتفكك وفق المعادلة الآتية:



ثم يرجع الأكسيد بعدها مباشرة بالكربون.

3. الفلز على شكلكبريتيد معدن:

– يُشوى الفلز لتحويله إلى أكسيد المعدن في أفران خاصة، ثم يرجع الأكسيد بعدها بالكربون، كما في تعدين الزنك من كبريتيد الزنك.



4. إرجاع الأكسيد المعدنية بالألمنيوم:

يصعب إرجاع بعض المعادن بالكربون كالكروم والمنغنيز، لذلك يستعمل الألمنيوم في استحصلالها من أكسيداتها.



5. استحصلال المعادن بالتحليل الكهربائي:

المعادن شديدة الفعالية كالصوديوم والألمنيوم يتم استحصلالها بالتحليل الكهربائي لمركباتها.

أصبحت الصناعات الحديثة بحاجةٍ ماسّة إلى المعادن بدرجةٍ عالية من النقاء لتلبية مُطلبات التكنولوجيا الحديثة.

نشاط (4)

كيف يمكن الحصول على المعدن بدرجةٍ عالية من النقاء؟

استنتاج: تُحضر المعادن على درجة عالية من النقاء بعدة طرائق، أهمّها:

1. التقاطير التجزئي: وتعتمد على الفرق بين درجة غليان المعدن ودرجة غليان شوائبه.
2. الانصهار المتبع بالتبريد الجزئي (إعادة البلورة): وتعتمد على الفرق بين درجة تجمد المعدن ودرجة تجمد شوائبه، حيث يتم صهر المعدن المراد تنقيته، ثم يبرد جزئياً فيتجمد جزء من المعدن الصلب ويرسب في أسفل الوعاء، بينما تبقى الشوائب في الجزء السائل منه.
3. التنقية بنزع الشوائب: وتتم باستعمال معدن منصهر عديم الامتزاج بالمعدن المراد تنقيته، يقوم بدور المُ محلل للشوائب.

إثراء:

تعدين الذهب :

الذهب من أهم المعادن الثمينة الموجودة على سطح الأرض في الوقت الحالي، استُخدم كوحدة للتعامل التجاري وشراء البضائع في كثير من الأماكن، كما استُخدم في صناعة الحلي والصناعات الإلكترونية المتطورة (صناعة المعالجات).



طرائق استخراج الذهب

تختلف طرائق استخراج الذهب بحسب نوع الرواسب العالقة فيه ومنها:



1. طريقة الطفو: تكون بعد طحن خام الذهب وغرباته ومعالجته بالتعويم أو الطفو لفصله عن باقي المعادن.

2. طريقة السيانيد: تتم من خلال رش المادة الخام بمحلول السيانيد الذي يقوم بإذابة الذهب، ومن ثم يمرر على أعمدة تحتوي حبيبات الكربون ليترسب الذهب، وتعُد هذه الطريقة الأفضل نظراً لكفاءتها في عملية الاستخلاص بنسبة 96%， ولكن كمية الملوثات الضارة ببيئة الناتجة عنها كبيرة، وكلفتها قليلة وبإمكان إعادة تدوير المواد المستخدمة في عملية الاستخراج مرة أخرى.

3. طريقة الماء المالكي: تحتاج إلى علمٍ وخبرة بعملية ترسيب الذهب، وهي خطوةٌ نظراً للغازات المستخدمة فيها.
4. طريقة الرئيق: وتشكل ما نسبته 100% من حيث الكفاءة . إلا أنَّ أبرز عيوبها الكلفة العالية وخطورتها استرجاع الذهب.

السُّبَائِكَ



تحتاج صناعة الطائرات إلى معدن خفيفٍ ومتين، ولا توافر هذه الخصائص في معدن واحدٍ، كيف يمكن تحقيق ذلك؟

نشاط (5):

1. ما الغاية من صناعة السبائك؟
2. مما تتكون السبيكة؟

أستنتج

- تتطلب الصناعات الحديثة مواداً أولية توافر فيها خصائص فيزيائية وألية لا توافر في المعادن النقيّة لوحدها، لذلك لجأ العلماء إلى صناعة السبائك.
- تتكون السبيكة من معدنين أو أكثر، وقد يكون أحد عناصرها من الالمعادن كالكرتون.

إثراء:

جدولٌ يبيّن بعض أنواع السبائك، نسبها، مكوناتها، وخدماتها:

السبائك	نسب مكوناتها	استخداماتها
الفولاذ غير القابل للصدأ.	74% حديد 18% كروم 8% نيكل.	صناعة أدوات المائدة.
الألمونيوم القاسي (الدورالومين)	95% ألمونيوم 4% نحاس 1% مغزنيوم ومنغنيز وسيليكون	صناعة الطائرات والسيارات وغيرها.
الفولاذ	99% حديد 1% كربون	صناعات عديدة.
الميخور	50% نحاس 25% نيكل 25% زنك	يُستعمل في الأفران الكهربائية.
البرونز	85% نحاس 15% قصدير	صناعة الأجراس والتماثيل.
خلية حروف الطباعة.	55% نحاس 25% أنتموان 20% قصدير	صناعة حروف الطباعة.
خلية النحاس الأصفر	66% نحاس 34% زنك	صناعة الصمامات والأنباب




بنية السّبائك:

تصنّف السّبائك من حيث بنيتها إلى:

1. الخليط الميكانيكي: تتكون السبيكة من خليطٍ من بلورات العناصر الدّاخلة في تركيبها كما في سبيكة رصاص وقصدير.

2. محلول الصلب: تتكون السبيكة عندئذٍ من شبكةٍ بلوريّة واحدة، فيها ذراتُ العناصر المكوّنة للسبائك كما في سبيكة محلول الصلب.

3. المركب الكيميائي: مثل الزنك مع النحاس حيث يتشكل مركب $(Cu \cdot Zn_2)$ من بلورات الزنك والنحاس.



خواصِيَّاتِ السّبائكِ:

1. درجة انصهار السّبائك غالباً أخفض من درجة انصهار المعادن الدّاخلة في تركيبها.

2. المقاومة الكهربائية للسبائك أعلى من مقاومة العناصر الدّاخلة في تركيبها.

3. السبيكة أكثر قساوةً وأقلّ مرونةً من العناصر الدّاخلة في تركيبها، لكنّها أكثر قابلية للكسر وأقلّ قابلية للسحب والتّصفير.

4. السّبائك أقلّ نشاطاً كيميائياً من العناصر الدّاخلة في تركيبها.

نشاط (6):

تُستخدم سبيكة ستانلس ستيل التي تتألّف من الحديد والكروم والكربون في صناعة أدوات المائدة. قارن بينها وبين الحديد من حيث النشاط الكيميائي.

يُعاد تدوير مخلفات المعادن كالألミニوم والصلب، فيقل استنزاف الموارد الطبيعية، ويقلل من الاحتباس الحراري، حيث تُصهر على الألミニوم للمشروبات الغازية في مسابك لتصنع منها ألواح الألミニوم المستخدمة في المنازل وبعض قطع للسيارات. وبعد الحديد الصلب من المخلفات التي يمكن تدويرها وإعادة تصنيعها بنسبة 100%.

تعلمت

تأخذ المعادن أشكالاً مختلفة في القشرة الأرضية بحسب الظروف الجيولوجية التي تكونت خلالها، ويمكن تحديد هذه الأشكال وفق ما يأتي (العروق - معادن متعركة في التكوين الصخري - خامات طباقية - معادن في الرواسب الطينية).

- التعدين هو مجموعة أعمال مترابطة لاستخراج وتنقية الرواسب والخامات المعدنية من القشرة الأرضية.
- تتضمن عمليات التعدين عدّة مراحل تتضمّن (المعالجة الأولية - المعالجة الفيزيائية - المعالجة الكيميائية والتي تختلف بحسب نوع الفلز) يلي ذلك تنقية المعادن باستخدام التحليل الكهربائي .
- تُحضر المعادن على درجة عاليةٍ من النقاء لتلبّي مُطلبات التكنولوجيا الحديثة بعدة طرائق، أهمّها: (التقطير التجزئي - الانصهار المتبع بالتبريد الجزئي - التنقية بنزع الشوائب).
- الصناعات الحديثة تتطلّب مواد أولية توافر فيها خاصيات فизيائية وآلية لا توافر في المعادن النقيّة لوحدها، لذلك لجأ العلماء إلى صناعة السّبائك.
- تكون السبيكة من معدّين أو أكثر وقد يكون أحد عناصرها من اللا معادن .
- تصنّف بنية السّبائك في (الخليط الميكانيكي - محلول الصلب - المركب الكيماوي).
- تختلف الخصائص الآلية والفيزيائية للسبائك عن خصائص المعادن الداخلة في تركيبها فهي أكثر قساوةً وأقلّ مرونةً، لكنّها أكثر قابلية للكسر وأقلّ قابلية للسحب والتصفيح، أخفض درجة انصهار، مقاومتها الكهربائية عالية، وأيضاً أقلّ نشاطاً كيميائياً.

أختبر نفسك



أولاً : اختر الإجابة الصحيحة للجمل الآتية :

1. من المعادن التي توجد في الرّواسب الطينية :

- a. الحديد. b. الذهب.
- c. الألمنيوم. d. النحاس.

2. يرجع أكسيد الكروم (Cr_2O_3) الصعب الانصهار :

- a. بالكريbones. b. بالحديد.
- c. بالنحاس. d. بالألمنيوم.

3. يمكن الحصول على معدن بدرجة عالية من النقاء عن طريق :

- a. التقطر التجزيئي. b. التقطر.
- c. التحليل الكهربائي. d. إرجاع أكسيدها.

ثانياً: أعطِ تفسيراً علمياً لكُلّ ممّا يائني :

1. صعوبة استحصلال الألمنيوم من خاماته.

2. تجمع الذهب في قاع أووعية الغربلة.

3. تفضّل السبائك على المعادن النقيّة في الصناعات.

ثالثاً: قارن بين السبائك والمعادن من حيث القساوة والمثانة والمقاومة الكهربائية.

رابعاً: حل المسألتين الآتيتين :

المسألة الأولى :

سيكة مكونة من نحاس وحديد، كتلتها 24 g ، يضاف إليها كمية معينة من حمض كلور الماء ذي التركيز 0.5 mol.L^{-1} ، فينتج غاز حجمه في الشرطين النظاميين 6.72 L .

المطلوب:

1. اكتب معاذلة التفاعل الحاصل.

2. احسب النسبة المئوية لكُلّ من الحديد والنحاس في السيكة .

3. احسب حجم حمض كلور الماء المتفاعل.

(Cu:63.5 , Cl:35.5 , Fe:56 , H:1)

المسألة الثانية :

يتفكّك 8 g من فلز السيدريت (كربونات الحديد II) بالحرارة، يعالج ناتج التفكّك بأحادي أكسيد الكربون حتى تمام الإرجاع، ثم يلقى الناتج في مقاييس الغاز الذي يحوي حمض الكبريت المُمدَد، فينطلق غاز حجمه بالشرطين النظاميين 1.12 L . المطلوب :

1. اكتب معاذلات التفاعل الحادثة.

2. احسب النسبة المئوية لкарbonات الحديد II في الفلز.

(O:16 , Fe:56 , C:12)



كيف يمكن تغيير الخصائص الآلية والفيزيائية للسبائك؟

أبحث أكثر



ابحث في مكتبة مدرستك أو في الشبكة عن تحضير السبائك و أهميتها في الصناعة.

أسئلة الوحدة

أولاًً: ضع إشارة صح أو غلط أمام العبارات الآتية، وصحح المغلوط منها:


1. حمض الأزوت المدخن ينتج من انحلال غاز NO في حمض الأزوت الممدد والساخن.
2. يسحق مزيج الكلنكر مع الجص ويتشكل الإسمنت.
3. الأوليوم هو الحمض الناتج عن امتصاص حمض الكبريت المركز لغاز SO_2 .

ثانياً: أجب عن الأسئلة الآتية:

1. ما وظيفة مضخة إعادة التدوير عند صناعة غاز النشارد؟
2. عدد المواد الخام الضرورية في صناعة الزجاج؟
3. بيان أهمية الأسمدة للتربيه، ثم اذكر بعض أنواع الأسمدة الأزوتية.
4. عدد مراحل صناعة الإسمنت.
5. ما التعدين، عددين مراحله.
6. تُحضر المعادن على درجة عالية من النقاء بطريقة إعادة البلورة، كيف يتم ذلك؟

ثالثاً: قارن بين السبائك والمعادن الداخلة في تركيبها من حيث النشاط الكيميائي ، المقاومة الكهربائية، القساوة، قابلية السحب والطرق.

رابعاً: أتمِّمْ وزِّن التفاعلات الآتية:



خامساً: حل المسائل الآتية

المسألة الأولى :

سبائك نحاس وزنك، كتلتها 20 g، معاملها بكمية كافية من محلول حمض كلور الماء، فينطلق غاز حجمه بالشرطين النظاميين 2.24 L.

المطلوب:

1. أكتب معادلة التفاعل الحادثة بشكل موزون.
2. أحسب النسبة المئوية لكلاً من الزنك والنحاس في السبيكة.
3. أحسب تركيز محلول الحمض المتفاعل بفرض أنَّ الحجم المستخدم منه 100 ml
(Cl:35.5, Zn:65, Cu:64, H:1)

المُسألة الثانية :

يُعالِج طنٌ من كربونات النحاس الأساسية $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}(\text{OH})_2$ المحتوية على 25% شوائب بالكربون في فرنٍ خاصٍ للحصول على النحاس.

المطلوب:

1. اكتب مُعادلات التفاعلات الحاصلة.

2. احسب كتلة النحاس الناتج .

$(\text{Cu}:63.5 , \text{C}:12 , \text{O}:16 , \text{H}:1)$

المُسألة الثالثة :

يراد الحصول على طنٌ من الزنك الصّرف من فلز بلاند، الذي يحوي 80% من ZnS ، وذلك بشيءٍ ثمَّ إرجاعه بالكربون. المطلوب:

1. اكتب مُعادلات التفاعل الحاصلة.

2. احسب كتلة البلاند المستعمل.

3. احسب كتلة فحم الكوك اللازم، مع العلم أنَّ فحم الكوك المستعمل يحوي 85% من الكربون.

$(\text{Zn} = 65 , \text{S} = 32 , \text{C} = 12)$

مشروع صناعات

سورية غنية بالمواد الأولية الخام، التي استُخدمت في الكثير من الصناعات، ومع التطور العلمي تم التوسيع بالصناعات الكيميائية التي حددت مدى تقدُّم المجتمع وتطوره.

هدف المشروع:

- التعرف على إحدى الصناعات في سوريا.

مراحل المشروع:

أولاً التخطيط:

- التعرف على المواد الأولية في هذه الصناعة.
- التعرف على مراحل عمل المنشأة والتفاعلات الكيميائية في كل مرحلة.
- التعرف على المنتجات وأهميتها الاقتصادية.
- اقتراح طرائق لتطوير عمل المنشأة.
- اقتراح حلول لمعالجة تلوث البيئة من مخلفات الصناعة.

ثانياً التنفيذ:

- توزيع طلاب الصف إلى مجموعات.
- تحديد مهمة كل مجموعة.
- القيام برحلة علمية إلى إحدى المنشآت الصناعية القرية، أو القيام برحلة إلكترونية عبر الشبكة.

موقع المنشأة	اسم المنشأة	الصناعة	المجموعة
		الدهان	الأولى
		الصابون	الثانية
		الإسمنت	الثالثة
		الزجاج	الرابعة
		الأسمدة	الخامسة

- تبادل المعلومات بين المجموعات.
- تسليم نسخة ورقية من البحث أو نسخة إلكترونية.

ثالثاً التقويم:

مناقشة النتائج التي تم التوصل إليها، وإعداد تقرير كامل عن الصناعة خلال مدة عشرين يوماً.

ପର୍ମାଣୁ ରମେଶ

 البيهود	 معدان قلوية	 معدان تربوية	 معدان انتقالية
 أعزاز نبتية (خاملة)	 معدان نباتية (نادرة)	 معدان داخلية (نادرة)	 معدان أخرى
 لا معدان			
			 معدانات نباتية (خاملة)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	VIII A
I A	H	Hydrogen 1.00794	2	2	2	2	2	2	2	VII B	VIII B	VIII B	VIII B	VIII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
3	Li	Lithium 6.941 9.012182	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
11	Na	Sodium 22.98976928	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
19	K	Calcium 40.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
37	Rb	Rubidium 85.4678	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
55	Cs	Cesium 132.954519	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
87	Fr	Francium [223]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
133	He	Helium 4.002802	2	2	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
134	Be	Beryllium 9.012182	2	2	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
135	Sc	Scandium 44.9559	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
136	Ti	Titanium 47.887	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
137	V	Vanadium 50.9415	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
138	Cr	Chromium 51.9861	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
139	Mn	Manganese 54.938045	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
140	Fe	Iron 55.845	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
141	Ni	Nickel 58.933195	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
142	Co	Cobalt 63.546	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
143	Zn	Zinc 65.38	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
144	Ga	Gallium 69.729	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
145	Al	Aluminum 26.9815386	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
146	Si	Silicon 28.0855	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
147	P	Phosphorus 30.973762	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
148	S	Sulfur 32.0855	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
149	Cl	Chlorine 35.453	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
150	F	Fluorine 39.948	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
151	Ne	Neon 20.1797	2	7	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
152	Kr	Krypton 83.798	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
153	Xe	Xenon 131.293	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
154	Rn	Radon [222]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
155	At	Astatine [210]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
156	Pb	Pbium [209]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
157	Tl	Thallium 204.3933	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
158	Bi	Bismuth 208.9804	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
159	Po	Poison [208]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
160	At	Antimony [216]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
161	Tm	Tellurium 127.6	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
162	Te	Tellurium 126.90447	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
163	Se	Selenium 79.904	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
164	Br	Bromine 36.36	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
165	Kr	Krypton 36.37	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
166	Ar	Argon 36.38	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
167	Ne	Neon 36.39	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
168	He	Helium 4.002802	2	2	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
169	Li	Lithium 6.941 9.012182	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
170	Na	Sodium 22.98976928	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
171	Al	Aluminum 24.305	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
172	Sc	Scandium 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
173	Ti	Titanium 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
174	V	Vanadium 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
175	Cr	Chromium 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
176	Mn	Manganese 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
177	Fe	Iron 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
178	Ni	Nickel 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
179	Co	Cobalt 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
180	Zn	Zinc 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
181	Ga	Gallium 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
182	Al	Aluminum 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
183	Sc	Scandium 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
184	Ta	Tantalum 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
185	Ti	Titanium 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
186	W	Tungsten 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
187	Re	Rhenium 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
188	Os	Osmium 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
189	Pd	Palladium 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
190	Ir	Iridium 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
191	Pt	Platinum 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
192	Ag	Silver 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
193	Ge	Germanium 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
194	As	Arsenic 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
195	Se	Selenium 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
196	Te	Tellurium 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
197	Br	Bromine 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
198	Kr	Krypton 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
199	Xe	Xenon 21.078	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
200	Rn	Radon [212]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
201	At	Astatine [210]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
202	Po	Poison [209]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
203	Tl	Thallium [207]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
204	Bi	Bismuth [205]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
205	Pb	Pbium [204]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
206	At	Astatine [203]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
207	Te	Tellurium [202]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
208	Br	Bromine [201]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
209	Kr	Krypton [200]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
210	Xe	Xenon [199]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
211	Rn	Radon [198]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	
212	At	Astatine [197]	2	8	2	2	2	2	2	VII B	VII B	VII B	VII B	VII B	VIA	VIA	VIA	VII A	

سلسلة الالاتينيدات

57	La	Lanthanum	140.116	2	58	Ce	Cerium	138.90567	2	59	Pr	Praseodymium	140.90765	2	60	Nd	Dysprosium	144.242	2	61	Pm	Promethium	[145]	2	62	Sm	Samarium	150.346	2	63	Eu	Europium	151.984	2	64	Gd	Gadolinium	157.25	2	65	Tb	Terbium	158.9253	2	66	Dy	Dysprosium	164.93932	2	67	Ho	Holmium	167.259	2	68	Er	Erbium	168.93421	2	69	Tm	Thulium	172.054	2	70	Yb	Ytterbium	174.9868	2	71	Lu	Lutetium	174.9868	2									
59	Ac	Actinium	223.03066	2	90	Th	Thorium	228.02991	2	91	Pa	Protactinium	231.03568	2	92	Np	Neptunium	237.1	2	93	U	Uranium	[241]	2	94	Pu	Plutonium	[244]	2	95	Cm	Curium	[243]	2	96	Bk	Berkelium	[247]	2	97	Cf	Fermium	[257]	2	98	Es	Californium	[251]	2	99	Md	Mendelevium	[261]	2	100	No	No	[262]	2	101	Fm	No	[263]	2	102	Md	No	[264]	2	103	No	No	[265]	2	104	Lr	No	[266]	2	105	Lawrencium	[267]	2
61	Pr	Praseodymium	140.90765	2	92	Th	Thorium	228.02991	2	93	Pa	Protactinium	231.03568	2	94	U	Uranium	[241]	2	95	Np	Neptunium	[237]	2	96	Am	Americium	[243]	2	97	Cm	Curium	[247]	2	98	Bk	Berkelium	[247]	2	99	Cf	Fermium	[257]	2	100	Es	No	[262]	2	101	Md	No	[264]	2	102	No	No	[265]	2	103	Lu	No	[266]	2																			
63	Sm	Samarium	150.346	2	94	Pa	Protactinium	231.03568	2	95	U	Uranium	[241]	2	96	Np	Neptunium	[237]	2	97	Am	Americium	[243]	2	98	Cm	Curium	[247]	2	99	Bk	Berkelium	[247]	2	100	Cf	Fermium	[257]	2	101	Es	No	[262]	2	102	Md	No	[264]	2	103	No	No	[265]	2	104	Lu	No	[266]	2																								
65	Eu	Europium	151.984	2	96	U	Uranium	[241]	2	97	Np	Neptunium	[237]	2	98	Am	Americium	[243]	2	99	Cm	Curium	[247]	2	100	Bk	Berkelium	[247]	2	101	Cf	Fermium	[257]	2	102	Es	No	[262]	2	103	Md	No	[264]	2	104	No	No	[265]	2	105	Lu	No	[266]	2																													
67	Tb	Terbium	158.9253	2	97	Np	Neptunium	[237]	2	98	Am	Americium	[243]	2	99	Cm	Curium	[247]	2	100	Bk	Berkelium	[247]	2	101	Cf	Fermium	[257]	2	102	Es	No	[262]	2	103	Md	No	[264]	2	104	No	No	[265]	2	105	Lu	No	[266]	2																																		
69	Dy	Dysprosium	164.93932	2	99	Cm	Curium	[247]	2	100	Bk	Berkelium	[247]	2	101	Cf	Fermium	[257]	2	102	Es	No	[262]	2	103	Md	No	[264]	2	104	No	No	[265]	2	105	Lu	No	[266]	2																																												
71	Ho	Holmium	167.259	2	101	Cf	Fermium	[257]	2	102	Es	No	[262]	2	103	Md	No	[264]	2	104	No	No	[265]	2	105	Lu	No	[266]	2	106	Lu	No	[267]	2																																																	
73	Er	Erbium	168.93421	2	105	No	No	[265]	2	106	Lu	No	[267]	2	107	Lu	No	[268]	2	108	Lu	No	[269]	2	109	Lu	No	[270]	2	110	Lu	No	[271]	2	111	Lu	No	[272]	2																																												
75	Tm	Thulium	172.054	2	107	No	No	[265]	2	108	Lu	No	[268]	2	109	Lu	No	[269]	2	110	Lu	No	[270]	2	111	Lu	No	[271]	2	112	Lu	No	[272]	2	113	Lu	No	[273]	2																																												
77	Yb	Ytterbium	174.9868	2	108	Lu	No	[268]	2	109	Lu	No	[269]	2	110	Lu	No	[270]	2	111	Lu	No	[271]	2	112	Lu	No	[272]	2	113	Lu	No	[273]	2	114	Lu	No	[274]	2																																												
79	Lu	Lutetium	174.9868	2	109	Lu	No	[269]	2	110	Lu	No	[270]	2	111	Lu	No	[271]	2	112	Lu	No	[272]	2	113	Lu	No	[273]	2	114	Lu	No	[274]	2	115	Lu	No	[275]	2																																												

هذه ملحوظات باللغة الإنجليزية تم الترتيب الأبجدي للكلمات الإنجليزية.

الكلمات الكهربائية

موجب / قطب موجب	Anode
توازن / ميزان	Balance
مدخنة	Battery
مصد / قطب سالب	Cathode
خلية	Cell
كمون الخلية	Cell Potential
كيميائي	Chemical
تركيز	Concentration
تحليل كهربائي	"Electrolysis" Electrical analysis "
شحنة كهربائية	Electrical charge
مسرى	Electrode
كمون المسري	Electrode Potential
تفاعل التحليل الكهربائي	Electrolysis reaction
خلية التحليل الكهربائي	Electrolytic cell
قوة محركة كهربائية	"Electron motion force "emf
معادلة	Equation
دارة كهربائية خارجية	External circuit
ثابت فارادي	Faraday constant
خلية وقود	Fuel Cell
خلية غلافانية	Galvanic Cell
نصف الخلية	Half-cell
نصف التفاعل	half-Reaction
غشاء	Membrane
شروط غير قياسية	Nonstandard Conditions
عدد الإلكترونات	Number of electrons
أكسدة	Oxidation
نصف تفاعل الأكسدة	Oxidation half reaction

رقم الأكسدة	Oxidation number
حالة الأكسدة	Oxidation state
عامل مؤكسد	" Oxidizing agent " oxidant
كمون، جهد	Potential
فرق كمون / فرق جهد	Potential Difference
الطاقة الكامنة	Potential energy
تفاعل	Reaction
يرجع	Reduce
عامل مرجع	"Reducing agent " reductant
إرجاع	Reduction
نصف تفاعل الإرجاع	Reduction half reaction
جسر ملحي	Salt bridge
غشاء نصف نفوذ	Semipermeable membrane
تفاعل تلقائي	Spontaneous reaction
كمون القياسي للخلية	Standard Cell Potential
شروط قياسية	Standard Conditions
القوة المحركة الكهربائية القياسية	Standard emf
مسرى الهيدروجين القياسي	standard hydrogen electrode" "SHE
كمون الإرجاع القياسي	Standard reduction potential
معايرة	Titration
انتقال الإلكترونات	Transfer of electrons
خلية فولط	Voltaic Cell

الكيمياء الحرارية

طاقة الرابطة	Bond Energy
طاقة كيميائية	Chemical Energy
ماص للحرارة	Endothermic
انتالبية التكون / التشكيل	Enthalpies of Formation
انتالبية	Enthalpy

الكيمياء الحرارية

تغیر الانثالبيّة	Enthalpy change
انثالبيّة الاحتراق	Enthalpy of Combustion
انثالبيّة التفكك	Enthalpy of Decomposition
انثالبيّة الرابطة	Enthalpy of Bond
انثالبيّة التعديل	Enthalpy of Neutralization
انثالبيّة الانحلال	Enthalpy of Solubility
ناشر للحرارة	Exothermic
حالة نهائية	Final state
حرارة	Heat
طاقة حرارية	Heat Energy
حرارة الاحتراق	Heat of Combustion
حرارة التفكك	Heat of Decomposition
حرارة التكون	Heat of formation
حرارة التعديل	Heat of Neutralization
قانون هسّ	Hess's Law
حالة بدائية	Initial state
طاقة داخلية	Internal energy
حرارة الانحلال	Heat of Solubility
تغیر الانثالبيّة القياسيّة	Standard enthalpy change
انثالبيّة التكون القياسيّة	Standard enthalpy of formation
محتوى حراري	Thermal content
أثر حراري	Thermal effect
كيمياء حرارية	Thermochemistry
ترموديناميک	Thermodynamic
مقاييس حرارة	Thermometer

الكيمياء العضوية

تفاعل إضافة / ضم	Addition reaction
الكان	Alkane
ألكين	Alkene
الكيون	Alkyne
هdroوكربونات حلقيّة غير مشبعة	Aromatic hydrocarbons
ذرة	Atom
درجة غليان	Boiling-Point
سلسلة	Chain
رابطة ثنائية	Double bond
صيغة	Formula
هdroوكربون	Hydrocarbon
جزيئية	Molecule
تسمية	Nomenclature
كيمياء عضوية	Organic Chemistry
مركب عضويّة	Organic compound
مادة عضويّة	Organic material
رابطة أحادية	Single bond
بنية	Structure
تفاعل استبدال	Substitution reaction
رابطة ثلاثيّة	Triple bond

قسم الصناعات

سبائك	Alloy
أمونيا/ نشادر	Ammonia
إسمنت	Cement
مازوت (وقود الشاحنات)	Diesel
تقطير	Distillation
سماد	Fertilizer
تقطير تجزيئي	Fractional distillation
وقود	Fuel
بنزين (وقود السيارات الصغيرة)	(Gasoline (Petrol
زجاج	Glass
التعدين	Mining
غاز طبيعي	Natural gas
حمض النتروجين/حمض الأزوت	Nitric acid
سماد آزوتني	Nitrogen fertilizer
نفط	Oil
$\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_7$	Oleum
حمض الفوسفور	Phosphoric acid
سماد فوسفوري	Phosphoric fertilizer
مادة أولية/ مادة خام	raw material
حمض الكبريت	Sulfuric acid