



أجد كلاً من التكاملين الآتيين:

$$\int x dx \quad (a) \int x^2 \sin x dx$$

$$\int x dx = \frac{x^2}{2} + C$$

$$\int x^2 \sin x dx = -x^2 \cos x + \int 2x \cos x dx = -x^2 \cos x - \int 2 \sin x dx = -x^2 \cos x + 2 \sin x + C$$

$$\int x^3 e^{4x} dx \quad (b) \int x^3 e^{4x} dx$$

$$\int x^3 e^{4x} dx = \frac{x^3}{4} e^{4x} - \int 3x^2 e^{4x} dx = \frac{x^3}{4} e^{4x} - \frac{3}{4} \int x^2 e^{4x} dx = \frac{x^3}{4} e^{4x} - \frac{3}{4} \left( \frac{x^2}{4} e^{4x} - \int \frac{2x}{4} e^{4x} dx \right) = \frac{x^3}{4} e^{4x} - \frac{3}{16} x^2 e^{4x} + \frac{3}{8} \int x e^{4x} dx = \frac{x^3}{4} e^{4x} - \frac{3}{16} x^2 e^{4x} + \frac{3}{8} \left( \frac{x}{4} e^{4x} - \int \frac{1}{4} e^{4x} dx \right) = \frac{x^3}{4} e^{4x} - \frac{3}{16} x^2 e^{4x} + \frac{3}{32} x e^{4x} - \frac{3}{32} e^{4x} + C$$

## التكاملات الدورية

أتحقق من فهمي صفحة (66):

أجد كلاً من التكاملين الآتيين:

$$\int x e^x dx \quad (a) \int x e^x dx$$

$$\int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x (x - 1) + C$$

$$\int x dx \quad (b) \int \sec^3 x dx$$

$$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} \int (\sec x + \sec x \tan^2 x) dx = \frac{1}{2} \left( \int \sec x dx + \int \sec x \tan^2 x dx \right) = \frac{1}{2} \left( \ln |\sec x + \tan x| + \int \sec x \tan^2 x dx \right) = \frac{1}{2} \left( \ln |\sec x + \tan x| + \int \sec x (\sec^2 x - 1) dx \right) = \frac{1}{2} \left( \ln |\sec x + \tan x| + \int \sec^3 x dx - \int \sec x dx \right) = \frac{1}{2} \left( \ln |\sec x + \tan x| + \int \sec^3 x dx - \ln |\sec x + \tan x| \right) = \frac{1}{2} \int \sec^3 x dx$$

$$x + \ln x \tan x dx = \sec x + \tan x \sec x \tan x + \sec x + \int \sec^2 x \tan x dx = \sec x + \tan x \sec x + \ln x \tan x dx = 12(\sec x + \tan x \sec x + \ln x \tan x dx)$$

تكرار التكامل بالأجزاء باستعمال طريقة الجدول

أتحقق من فهمي صفحة (67):

أجد كلاً من التكاملين الآتيين:

$$\int (4x dx) \cos f$$

نفرض أن:  $f(x) = x^4, g(x) = \cos$ ، استخدم طريقة الجدول للتكامل بالأجزاء:

$f(x)$  ومشتقاته المتكررة

$g(x)$  وتكاملاته المتكررة

$x^4$	+	$\cos 4x$
$4x^3$	-	$\frac{1}{4} \sin 4x$
$12x^2$	+	$-\frac{1}{16} \cos 4x$
$24x$	-	$-\frac{1}{64} \sin 4x$
$24$	+	$\frac{1}{256} \cos 4x$
$0$	-	$\frac{1}{1024} \sin 4x$


$$\int (4x^4 + 3124x - 332x \cos 4x - 316x^2 \sin 4x + 14x^3 \cos 4x) dx = 14x^4 \sin 4x \cos f + 4x + C8 \sin$$

$$\int (x^5 e^x dx) \quad (b)$$

نفرض أن:  $f(x) = x^5, g(x) = e^x$ ، استخدم طريقة الجدول للتكامل بالأجزاء:

$f(x)$  ومشتقاته المتكررة

$g(x)$  وتكاملاته المتكررة



$$\int x^5 e^x dx = e^x(x^5 - 5x^4 + 20x^3 - 60x^2 + 120x - 120) + C$$

أتحقق من فهمي صفحة (68):

التكلفة الحدية: يمثل الاقتران:  $C'(x) = (0.1x + 1)e^{0.03x}$  التكلفة الحدية لكل قطعة (بالدينار) تنتج في إحدى الشركات، حيث  $x$  عدد القطع المنتجة، و  $C(x)$  تكلفة إنتاج  $x$  قطعة بالدينار. أجد اقتران التكلفة  $C(x)$ ، علماً بأن  $C(10) = 200$ .

$$\begin{aligned} C(x) &= \int (0.1x + 1)e^{0.03x} dx \\ u &= 0.1x + 1 \quad dv = e^{0.03x} \\ du &= 0.1 dx \quad v = \frac{1}{0.03} e^{0.03x} = 10.03 e^{0.03x} \\ C(x) &= \int (0.1x + 1)e^{0.03x} dx = (0.1x + 1)(10.03 e^{0.03x}) - \int 0.1 \cdot 10.03 e^{0.03x} dx \\ C(x) &= 10.03(x + 10)e^{0.03x} - 1000.9 e^{0.03x} + C \\ C(10) &= 200 \Rightarrow 200 = 10.03(20)e^{0.3} - 1000.9 e^{0.3} + C \\ C &= 200 \Rightarrow C \approx 260 \Rightarrow C(x) = 10.03 e^{0.03x}(x - 70.3) + 260 \end{aligned}$$

التكامل بالأجزاء لتكاملات محدودة

أتحقق من فهمي صفحة (70):

أجد كلاً من التكاملين الآتيين:

$$\int x^2 dx \quad \int a^x dx$$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\int \frac{1}{x^2} dx = \int x^{-2} dx = -x^{-1} + C = -\frac{1}{x} + C$$

$$\int (0.1x e^{-2x}) dx \quad (b)$$

$$u = x \quad dv = e^{-2x} \quad du = dx \quad v = -\frac{1}{2} e^{-2x}$$

$$\int x e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} x e^{-2x} - \int -\frac{1}{2} e^{-2x} dx = -\frac{1}{2} x e^{-2x} + \frac{1}{4} e^{-2x} + C$$

التكامل بالأجزاء، والتكامل بالتعويض

أتحقق من فهمي صفحة (71):

أجد قيمة كل من التكاملين الآتيين:

$$\int (x^2 dx (ax^3 + x^5) \sin) \int$$

$$\int x^2 dx + \int x^5 \sin x^2 dx = \int x^3 \sin x^3 + x^5 \sin) \int$$

نجد كل تكامل على حدة. فنجد التكامل الأيسر كما يأتي:

$$y dy = y dy \quad 2x = 12 \int x^2 \sin x^2 dx = \int x^3 \sin y = x^2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2x \Rightarrow dx = \frac{dy}{2x}$$

$$\int x^2 \sin x^2 dx = -\frac{1}{2} \cos y \int y \sin y du = dy \quad v = -\cos y \quad dy = y dv = \sin 12 \int y \sin x^2 + C x^2 + 12 \sin x^2 dx = -12 x^2 \cos \int x^3 \sin$$

ونجد التكامل الأيمن كما يأتي:

$$y dy \quad dy = y^2 dv = \sin y \quad dy = 12 \int y^2 \sin y \quad dy \quad 2x = 12 \int x^4 \sin x^2 dx = \int x^5 \sin x^5 \sin \int$$

$$y + 2y \sin y \quad dy = -y^2 \cos y - \int -2y \cos y \quad dy = -y^2 \cos y \int y^2 \sin u = 2y \quad dy \quad v = -\cos x^2 + x^2 \sin x^2 dx = -12 x^4 \cos y \int x^5 \sin y + 2 \cos y + 2y \sin y \quad dy = -y^2 \cos y - 2 \int \sin x^2 x^2 - 12 x^4 \cos x^2 + 12 \sin x^2 dx = -12 x^2 \cos x^2 + C \int (x^3 + x^5) \sin x^2 + \cos \sin x^2 + C x^2 + \cos + x^2 \sin$$

$$\int (x^5 e^{x^2}) dx \quad (b)$$

$$y = x^2 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 2x \Rightarrow dx = \frac{dy}{2x} \int x^5 e^{x^2} dx = \int x^5 e^y \quad dy \quad 2x = \int 12 x^4 e^y \quad dy$$

$$= 12 \int y^2 e^y dy = y^2 dv = e^y dy du = 2y dy v = e^y \int y^2 e^y dy = y^2 e^y - \int 2y e^y dy = y^2 e^y - 2y e^y + \int 2e^y dy = y^2 e^y - 2y e^y + 2e^y = (y^2 - 2y + 2)e^y \int x^5 dx = (12x^4 - x^2 + 1)e^{x^2} + C$$