

## أدرب وأحل المسائل

### مشتقتا الضرب والقسمة والمشتقات العليا

أجد مشتقة كل اقتران مما يأتي:

$$(1) f(x) = x^3 2x - 1$$

$$f(x) = x^3 2x - 1 \quad f'(x) = (2x - 1)(3x^2) - (x^3)(2)(2x - 1)^2 = 4x^3 - 3x^2(2x - 1)^2$$

$$(2) f(x) = x^3 \sec x$$

$$f(x) = x^3 \sec x \quad f'(x) = (x^3)(\sec x \tan x) + (\sec x)(3x^2) = x^3 \sec x \tan x + 3x^2 \sec x$$

$$(3) f(x) = x + 1 \cos x$$

$$f(x) = x + 1 \cos x \quad f'(x) = (\cos x)(1) - (x + 1)(-\sin x)(\cos x)^2 = \cos x + x \sin x + \sin x \cos^2 x$$

$$(4) f(x) = e^x (\tan x - x)$$

$$f(x) = e^x (\tan x - x) \quad f'(x) = (e^x)(\sec^2 x - 1) + (\tan x - x)(e^x) = e^x \tan^2 x + e^x \tan x - x e^x$$

$$(5) f(x) = \sin x + \cos x e^x$$

$$f(x) = \sin x + \cos x e^x \quad f'(x) = (e^x)(\cos x - \sin x) - (\sin x + \cos x)(e^x)(e^x)^2 = -2 \sin x e^x$$

$$(6) f(x) = x^3 \sin x + x^2 \cos x$$

$$f(x) = x^3 \sin x + x^2 \cos x \quad f'(x) = (x^3)(\cos x) + (\sin x)(3x^2) + (x^2)(-\sin x) + (\cos x)(2x) = x^3 \cos x + 2x^2 \sin x + 2x \cos x$$

$$(7) f(x) = x^3(x + 3)$$

$$f(x) = x^3(x + 3) = x^5 + 3x^3 \quad f'(x) = 5x^4 - 16 + x - 23 = 5x^4 + 1x^2 - 39$$

$$(8) f(x) = 1 + \sec x - \sec x$$

$$f(x) = 1 + \sec x \quad f'(x) = (1 + \sec x)(\sec x \tan x) - (1 + \sec x)(-\sec x \tan x) = 2 \sec x \tan x$$

(9)  $f(x) = 2 - 1/x$

$$f(x) = 2 - 1/x \quad f'(x) = (2 - 1/x)(-1/x^2) - (-1/x^2)(2 - 1/x) = -2/x^2 + 2/x^3$$

(10)  $f(x) = (x^3 - x)(x^2 + 2)(x^2 + x + 1)$

$$f'(x) = (x^3 - x)((x^2 + 2)(2x + 1) + (x^2 + x + 1)(2x)) + (x^2 + 2)(x^2 + x + 1)(3x^2 - 1) = (x^3 - x)(x^2 + 2)(2x + 1) + (x^3 - x)(x^2 + x + 1)(2x) + (x^2 + 2)(x^2 + x + 1)(3x^2 - 1)$$

(11)  $f(x) = (\csc x + \cot x) - 1$

$$f'(x) = -1(-\csc x \cot x - \csc^2 x) = \csc x \cot x + \csc^2 x = \csc x(\cot x + \csc x)$$

$f(x)$  إذا كان  $g(x)$  و  $g(x)$  اقترايين قابلين للاشتقاق عندما  $x = 0$  ، وكان:

$$f(0) = 5, f'(0) = -3, g(0) = -1, g'(0) = 2$$

(12)  $(fg)'(0)$

$$(fg)'(0) = f(0)g'(0) + g(0)f'(0) = 5 \times 2 - 1 \times -3 = 13$$

(13)  $(fg)'(0)$

$$(fg)'(0) = g(0)f'(0) - f(0)g'(0) = -1 \times -3 - 5 \times 2 = -7$$

(14)  $(7f - 2fg)'(0)$

$$(7f - 2fg)'(0) = 7f'(0) - 2(fg)'(0) = 7(-3) - 2(13) = -47$$

أجد المشتقة الثانية لكل اقتران مما يأتي عند قيمة المعطاة:

$$(15) f(x) = x^2 - 4x^2 + 4, x = -2$$

$$f(x) = x^2 - 4x^2 + 4 \quad f'(x) = (x^2 + 4)(2x) - (x^2 - 4)(2x)(x^2 + 4)^2 = 16x(x^2 + 4)^2 f''(x) = (x^2 + 4)^2(16) - (16x)(2)(x^2 + 4)^1(2x)(x^2 + 4)^4 = (16)(x^2 + 4) - (16x)(2)(2x)(x^2 + 4)^3 f''(-2) = (16)(8) - (-32)(2)(-4)(8)^3 = -14$$

$$(16) f(x) = 1 + x^1 + x^3, x = 8$$

$$f(x) = 1 + x^1 + x^3 = (1 + x^3)(1 - x^3 + x^2)^3 \quad 1 + x^3 = 1 - x^3 + x^2 \quad 3f'(x) = -13x - 23 + 23x - 13 \quad f''(x) = 29x - 53 - 29x - 43 = 29x^5 - 29x^4 \quad 3f''(8) = 29 \cdot 8^5 - 29 \cdot 8^4 = 29(132 - 116) = -1144$$

$$(17) f(x) = 11 + x, x = 4$$

$$f(x) = 11 + x \quad f'(x) = -(12x)(1 + x)^2 = -12x(1 + x)^2 \quad f''(x) = 2x(2)(1 + x)^1(12x) + (1 + x)^2(1x)^4 = 2 + 1 + 2x^2 \quad 3f''(4) = 2 + 1 + 2 \cdot 2^2 = 7 \quad 864$$

أجد معادلة المماس لكل اقتران ممّا يأتي عند النقطة المعطاة:

$$(18) f(x) = 1 + x^1 + e^x, (0, 12)$$

$$f(x) = 1 + x^1 + e^x \quad f'(x) = (1 + e^x)(1) - (1 + x)(e^x)(1 + e^x)^2 = 1 - x e^x (1 + e^x)^2$$

$$= 14 \quad f'(0) \text{ هو: } (12, 0)$$

معادلة المماس هي:

$$y - 12 = 14(x - 0) \rightarrow y = 14x + 12$$

$$(19) f(x) = e^x \cos x + \sin x, (0, 1)$$

$$f(x) = e^x \cos x + \sin x \quad f'(x) = (e^x)(-\sin x) + (\cos x)(e^x) + \cos x$$

$$= 1 \quad f'(0) \text{ هو: } (1, 0)$$

$$f(0) = (1)(0) + (1)(1) + 1 = 2$$

معادلة المماس هي:

$$y-1=2(x-0) \rightarrow y=2x+1$$

أثبت صحة كلِّ ممَّا يأتي معتمداً أنَّ  $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$  :  $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$

$$(20) \frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$$

$$\frac{d}{dx}(\cot x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{\cos x}{\sin x}\right) = \frac{(\sin x)(-\sin x) - (\cos x)(\cos x)}{\sin^2 x} = \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = \frac{-1}{\sin^2 x} = -\csc^2 x$$

$$(21) \frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$$

$$\frac{d}{dx}(\sec x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\cos x}\right) = \frac{0 \cdot \cos x - (-\sin x) \cdot 1}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos x} \times \frac{\sin x}{\cos x} = \sec x \tan x$$

$$(22) \frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$$

$$\frac{d}{dx}(\csc x) = \frac{d}{dx}\left(\frac{1}{\sin x}\right) = \frac{0 \cdot \sin x - (\cos x) \cdot 1}{\sin^2 x} = \frac{-\cos x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin x} \times \frac{\cos x}{\sin x} = -\csc x \cot x$$

ألاحظ المشتقة المعطاة في كلِّ ممَّا يأتي، ثم أجد المشتقة العليا المطلوبة:

$$(23) f'(x) = 2 - 2x, f''(x)$$

$$f''(x) = 2 - 2x, f'''(x) = 2x^2$$

$$(24) f''(x) = 2x, f(4)(x)$$

$$f''(x) = 2x, f(4)(x) = 1x$$

$$(25) f(4)(x) = 2x + 1, f(6)(x)$$

$$f(4)(x) = 2x + 1, f(5)(x) = 2, f(6)(x) = 0$$



(26) نباتات هجينة: وجد فريق بحث زراعي أنه يمكن التعبير عن ارتفاع نبتة هجينة من نبات تباع الشمس  $h$  بالأمتار، باستعمال الاقتران:  $h(t) = 3t^2 + t^4$ ، حيث  $t$  الزمن بالأشهر بعد زراعة البذور. أجد معدّل تغير ارتفاع النبتة بالنسبة إلى الزمن.

$$h(t) = 3t^2 + t^4 \quad h'(t) = (4 + t^2)(6t) - (3t^2)(2t) = 24t(4 + t^2) - 6t^3 = 24t(4 + t^2) - 6t^3$$


$y = e^x \sin x$  إذا كان الاقتران: ، فأجيب عن السؤالين الآتيين تبعاً:

(27) أجد  $dy/dx$  ، و  $d^2y/dx^2$  .

$$dy/dx = (e^x)(\cos x) + (\sin x)(e^x) = e^x(\cos x + \sin x) \quad d^2y/dx^2 = e^x(-\sin x + \cos x) + e^x(\cos x + \sin x) = 2e^x \cos x$$

(28) أثبت أنّ  $d^2y/dx^2 = 2dy/dx - 2y$

$$2dy/dx - 2y = 2e^x(\cos x + \sin x) - 2e^x \sin x = 2e^x \cos x = d^2y/dx^2$$



أقمار صناعية: عندما ترصد الأقمار الصناعية الأرض، فإنه يُمكنها مسح جزء فقط من سطح الأرض. وبعض الأقمار الصناعية تحوي مُستشعرات لقياس الزاوية  $\theta$  (بالراديان) المبيّنة في الشكل المجاور. إذا كان  $h$  يمثل المسافة بين القمر الصناعي وسطح الأرض بالكيلومترات، و  $r$  يُمثل نصف قطر الأرض بالكيلومترات، فأجيب عن السؤالين الآتيين تبعاً:

(29) أثبت أنّ  $h = r(\csc \theta - 1)$  .

$$\csc \theta = r + h/r \rightarrow r + h = r \csc \theta \rightarrow h = r(\csc \theta - 1)$$


(30) أجد معدّل تغير  $h$  بالنسبة إلى  $\theta$  عندما  $\theta = \pi/6$  rad (أفترض أن  $r = 6371$  km).

$$dh/d\theta = r(-\csc \theta \cot \theta) \quad dh/d\theta |_{\theta = \pi/6} = 6371(-\csc \pi/6 \cot \pi/6) = 6371(-2 \times 3) \approx -22070 \text{ km/rad}$$

(31) إذا كان:  $x+12x^2f(x)=9\ln$  ، فأثبت أن  $f(x)=(3x-1)(3x+1)x^3$  .

$$f(x)=9\ln x+12x^2f(x)=9(1x)+-1(4x)4x^4=9x-1x^3=9x^2-1x^3=(3x-1)(3x+1)x^3$$

$F(x)$  يبين الشكل المجاور منحنىي الاقتراني: ، و  $G(x)$  .



$P(x) = F(x)G(x)$  إذا كان: ، وكان:  $F(x)G(x)Q(x) =$  ، فأجد كلاً ممّا يأتي:

(32)  $P'(2)$

$$P'(2)=F(2)G'(2)+G(2)F'(2)$$

$G'$  (( ميل المستقيم الذي يمر بالنقطتين (2, 2) و (4, 3) ويساوي

$F'$  (( ميل المماس الأفقي، ويساوي صفراً.

$$P'(2)=3 \times 12+2 \times 0=32$$

(33)  $Q'(7)$

$$Q'(7)=G(7)F'(7)-F(7)G'(7)G^2(7)=1 \times 14-5 \times -231=4312$$