

## أُتدرب وأحل المسائل

### المعادلات التفاضلية

أحدد إذا كان الاقتران المعطى حلاً للمعادلة التفاضلية في كل مما يأتي:

$$(y=x; xy' - y = 0) \quad (1)$$

$$y' = 12x \quad xy' - y = x12x - x = 12x - x = -12x \neq 0$$

إذن،  $y=x$  ليس حلاً للمعادلة التفاضلية  $xy' - y = 0$

$$(x-5x+7; y'' - 1x = 0) \quad (2) \quad y = x \ln$$

$$x-4y'' = 1x \quad y'' - 1x = 1x - 1x = 0 \quad x-5 = \ln \quad y' = x(1x) + \ln$$

إذن،  $x-5x+7y = x \ln$  هو حل للمعادلة التفاضلية  $y'' - 1x = 0$

$$(x; y' + y^2 = 1) \quad (3) \quad y = \tan$$

$$x \neq 1 \quad x = 1 + 2 \tan^2 x + \tan^2 x \quad y' + y^2 = \sec^2 y' = \sec^2$$

إذن،  $xy = \tan$  ليس حلاً للمعادلة التفاضلية  $y' + y^2 = 1$

$$(y = e^x + 3x e^x; y'' - 2y' + y = 0) \quad (4)$$

$$y' = e^x + 3x e^x + 3e^x = 4e^x + 3x e^x \quad y'' = 4e^x + 3x e^x + 3e^x = 7e^x + 3x e^x$$

$$y'' - 2y' + y = 7e^x + 3x e^x - 8e^x - 6x e^x + e^x + 3x e^x = 0$$

إذن،  $y = e^x + 3x e^x$  هو حل للمعادلة التفاضلية  $y'' - 2y' + y = 0$

أحل كلاً من المعادلات التفاضلية الآتية:

$$(dy/dx = 3xy) \quad (5)$$

$$dy/dx = 3xy \quad dy/y = 3x dx \Rightarrow \int dy/y = \int 3x dx \Rightarrow 2y^{1/2} = 3/2 x^2 + C$$

$$(dy/dx + 3xy^2 = 0) \quad (6)$$

$$dy/dx = -3xy^2 \Rightarrow y^2 dy = -3x dx \quad \int y^2 dy = \int -3x dx \Rightarrow 1/3 y^3 = -3/2 x^2 + C$$

$$(y (7x \sin y dx = \cos$$

$$y dy = \int \csc x dx \int \csc y dy = \int \cos x dx \Rightarrow \int \csc y = \cos y dx dy \sin x \sin y dx = \cos y dy = - \int -(\csc^2 y + \cot y \csc y \cot y + \csc y dy = \int \csc^2 y + \cot y \csc y + \cot x \csc x + C y = \sin y + \cot | \csc y | \Rightarrow -\ln y + \cot | \csc y dy = -\ln y + \cot y) \csc y \cot y + \csc$$

$$(dy dx = x(x^2 + 1)^2 (8$$

$$dy = x(x^2 + 1)^2 dx \int dy = \int x(x^2 + 1)^2 dx u = x^2 + 1 \Rightarrow dx = du 2x \Rightarrow \int x(x^2 + 1)^2 dx = \int x u^2 du 2x = 1/2 \int 1 u^2 du = -1/2 u + C = -1/2 (x^2 + 1) + C \Rightarrow \int dy = \int x(x^2 + 1)^2 dx \Rightarrow y = -1/2 (x^2 + 1) + C$$

$$(dy dx = x e^x + y (9$$

$$dy dx = x e^x e^y \Rightarrow dy e^y = x e^x dx \int dy e^y = \int x e^x dx \Rightarrow \int e^{-y} dy = \int x e^x dx \Rightarrow -e^{-y} = x e^x - \int e^x dx \int x e^x dx = x e^x - \int e^x dx \int x e^x dx = x e^x - e^x + C \Rightarrow -e^{-y} = x e^x - e^x + C$$

$$(e^{-1/x} dy dx = x - 2y^2 (10$$

$$\int dy y^2 = x - 2e^{-1/x} dx = e^{-1/x} x^2 dx \int y - 2 dy = \int e^{-1/x} x^2 dx \Rightarrow -y - 1 = \int e^{-1/x} x^2 dx u = 1/x \Rightarrow du dx = -1/x^2 \Rightarrow dx = -x^2 du \Rightarrow \int e^{-1/x} x^2 dx = \int e^{-u} x^2 dx = \int e^{-u} x^2 dx = -e^{-u} x^2 + C = -e^{-1/x} x^2 + C \Rightarrow -y - 1 = -e^{-1/x} x^2 + C \Rightarrow y = e^{-1/x} x^2 - 1 + C$$

$$(dy dx = x y x - 3 (11$$

$$|x - 3| + C |y| = x + 3 \ln dy y = x x - 3 dx \int dy y = \int x x - 3 dx \int dy y = \int (1 + 3x - 3) dx \ln$$

$$(y x^3 + 2 (12 dy dx = 3x^2 \sin^2$$

$$y dy = \int 3x^2 x^3 + 2 y = \int 3x^2 (x^3 + 2) dx \int \csc^2 y = 3x^2 (x^3 + 2) dx \int dy \sin^2 dy \sin^2 |x^3 + 2| + C y = \ln x - \cot$$

$$(x (13 dy dx = y^3 \ln$$

$$x dx dv = dx du = dx x v = x \int \ln u = \ln x dx \int dy y^3 = \int \ln dy y^3 = \ln x - x + C dx \Rightarrow -1/2 y - 2 = x \ln x - x + C \Rightarrow \int y - 3 dy = \int \ln x - \int x dx x = x \ln x = x \ln$$

$$(dydx=2x^3(y^2-1)) \quad (14)$$

$1y^2-1=1(y-1)$  استخدم نستخدم الكسور الجزئية  $dy^2-1=2x^3dx \int dy^2-1 = \int 2x^3dx$   
 $(y+1)=Ay-1+By+1 A(y+1)+B(y-1)=1y=1 \Rightarrow A=12y=-1 \Rightarrow B=-12 \Rightarrow 1$   
 $y^2-1=12y-1+-12y+1 \Rightarrow \int dy^2-1 = \int 2x^3dx \Rightarrow \int (12y-1+-12y+1)dy =$   
 $|y+1|=12x^4+C|y-1|-12 \ln \int 2x^3dx \Rightarrow 12 \ln$

$$(x (15x \cos^2 y dy dx = \sin^3$$

$x \Rightarrow dx = u = \cos$  استخدم التعويض  $x dx x \cos^2 x dx \int y dy = \int \sin^3 x \cos^2 y dy = \sin^3$   
 $x u^2 du = \int (-1 + \cos x = \int -\sin^2 x u^2 du - \sin x dx = \int \sin^3 x \cos^2 x \int \sin^3 du - \sin$   
 $x - 1x) u^2 du = \int (-1 + u^2) u^2 du = \int (u^4 - u^2) du = 15u^5 - 13u^3 + C = 15 \cos^5 2$   
 $x + C x - 13 \cos^3 x dx \Rightarrow 12y^2 = 15 \cos^5 x \cos^2 x + C \Rightarrow \int y dy = \int \sin^3 3 \cos^3$

$$(dydx=xy) \quad (16)$$

$$dy = x dx \int dy = \int x dx \int y - 12 dy = \int x^2 dx \int 2y = 23x^3 + C$$

$$(x (17 dy dx = y \ln$$

$x dv = u = \ln$  استخدم الأجزاء  $x dx x^2 dx \int dy = \int 12 \ln x^2 dx \int dy = \int \ln dy = \ln$   
 $x - 1x dx = 12x \ln x - x + C \Rightarrow \int 12 \ln x - \int x dx = x \ln x dx = x \ln x du = dx x v = x \int \ln$   
 $x - 12x + C |y| = 12x \ln x dx \Rightarrow \ln^2 x + C \int dy = \int 12 \ln$

$$(2x+1)(x+2) dy dx = -3(y-2) \quad (18)$$

الجزئية الكسور  $(2x+1)(x+2) dy = -3(y-2) dx \int -13 dy y - 2 = \int dx (2x+1)(x+2)$   
 $2x+1)(x+2) = A2x+1 + Bx+2 A(x+2) + B(2x+1) = 1x = -12 \Rightarrow 1$  استخدم نستخدم  
 $A = 23x = -2 \Rightarrow B = -13 \Rightarrow 1(2x+1)(x+2) = 232x+1 + -13x+2 \Rightarrow \int -13 dy -$   
 $|y - |x+2| + C \Rightarrow -\ln|2x+1| - 13 \ln|y-2| = 13 \ln 2 = \int dx (2x+1)(x+2) \Rightarrow -13 \ln$   
 $|2x+1x+2| + C |y-2| = \ln|x+2| + C \Rightarrow -\ln|2x+1| - \ln 2 = \ln$

أجد الحل الخاص الذي يحقق الشرط الأولي المعطى لكل من المعادلات التفاضلية الآتية:

$$(dydx=y^4-x; y(1)=2) \quad (19)$$

$$dydx = y^2 4 - x \quad dy y^2 = 4 - x \quad dx \int dy y^2 = \int 4 - x \quad dx \int y - 2 dy = \int (4 - x) 12 dx - 1 y = -23(4 - x)^3 2 + C$$

الخا  $1 y = -23(4 - x)^3 2 + 23 - 12$  بتعويض  $(C \Rightarrow C = 23 - 12)$   $(1, 2 + 23 - = 12 -$   
ص الحل

$$(xy; y(0) = 1) \quad (20) \quad dy dx = 2 \sin^2$$

$$2x) dx 12 x dx \int y dy = \int (1 - \cos x) dx \int y dy = \int 2 \sin^2 x y dy = 2 \sin^2 dy dx = 2 \sin^2$$

الحل العام  $2x + C y^2 = x - 12 \sin$

الحل الخاص  $2x + 12 12 y^2 = x - 12 \sin$  بتعويض  $C \Rightarrow C = 12$   $0, 1 + 0 = 12$

$$(y; y(0) = \pi/4) \quad (21) \quad x \cos^2 dy dx = 2 \cos^2$$

$$y dx dx \int \sec^2 y = \int 2 \cos^2 x dx \int dy \cos^2 y = 2 \cos^2 y dy \cos^2 x \cos^2 dy dx = 2 \cos^2$$

الحل العام  $2x + C y = x + 12 \sin 2x) dx \tan y = \int (1 + \cos$

الحل الخاص  $2x + 1 y = x + 12 \sin C = 1 \tan$  بتعويض  $(C(0, \pi/4 + 0 + 0 = 1$

$$(xey; y(\pi) = 0) \quad (22) \quad x e \sin dy dx = \cos$$

$x \Rightarrow du dx u = \sin$  نستخدم التعويض  $x dx x e \sin x e y f e y dy = \int \cos x e \sin dy dx = \cos$   
 $x = \int e u du = e u + C = x e u x du \cos x dx = \int \cos x e \sin x \int \cos x \Rightarrow dx = du \cos = \cos$   
بت  $e 0 = e 0 + C \pi, 0$  الحل العام  $x + C x dx e y = e \sin x e \sin x + C \Rightarrow f e y dy = \int \cos e \sin$   
عويض  $x C = 0 e y = e \sin \Rightarrow$  الحل

$$(dy dx = 8x - 18(3x - 8)(x - 2); y(3) = 8) \quad (23)$$

الجزئية الكسور  $z$   $dy dx = 8x - 18(3x - 8)(x - 2) \int dy = \int 8x - 18(3x - 8)(x - 2) dx$   
 $8x - 18(3x - 8)(x - 2) = A 3x - 8 + B x - 2 A(x - 2) + B(3x - 8) = 8x - 18x$  نستخدم  
 $= 2 \Rightarrow B = 1 x = 8 \Rightarrow A = 5 \Rightarrow 8x - 18(3x - 8)(x - 2) = 5 3x - 8 + 1 x - 2 \Rightarrow \int dy = \int 8x$   
 $|x - 2| |3x - 8| + \ln - 18(3x - 8)(x - 2) dx \Rightarrow y = \int (5 3x - 8 + 1 x - 2) dx \Rightarrow y = 5 3 \ln$   
الحل العام  $|x - 2| + 8 |3x - 8| + \ln y = 5 3 \ln$  بتعويض  $C \Rightarrow C = 8$   $3, 8 + 0 + 0 = 8$   
الحل

$$(dy dx = 1/x; y(e) = 1) \quad (24)$$

$C \Rightarrow$  بتعويض  $C = e, 1+1=2$  العام الحل  $|x| + C dy dx = 1xy f y dy = \int dx x 12y^2 = \ln$   
الحل الخاص  $|x| - 12 - 121zyz = \ln$

(25) تتحرك سيارة في مسار مستقيم، ويعطى تسارعها بالمعادلة التفاضلية:  
 $dv/dt = 10 - 0.5v$ ، حيث  $t$  الزمن بالثواني، و  $v$  سرعتها المتجهة بالمتري لكل ثانية، أجد  
السرعة المتجهة للسيارة بعد  $t$  ثانية من بدء حركتها، علماً بأن السيارة تحركت من  
وضع السكون.

$|10 - 0.5v| = t + C \Rightarrow dv/dt = 10 - 0.5v$   
 $dv 10 - 0.5v = dt \int dv 10 - 0.5v = \int dt - 2 \ln$   
 $\ln \Rightarrow$  بتعويض  $10 t = 0, v = 0 10 = 0 + C \Rightarrow C = \ln \ln$  العام الحل  $|10 - 0.5v| = -t^2 + C \ln$   
الحل الخاص  $|10 - 0.5v 10| = -t^2 10 \Rightarrow \ln |10 - 0.5v| = -t^2 + \ln$

إذن، يمكن نمذجة السرعة المتجهة للسيارة بعد  $t$  ثانية من بدء حركتها بالعلاقة  
الآتية:

$$|10 - 0.5v 10| = -t^2 \ln$$



(26) ذئب: يمكن نمذجة معدل تغير عدد الذئب في إحدى الغابات  
بالمعادلة التفاضلية:  $dN/dt = 260 - 0.4N$ ، حيث  $N$  عدد الذئب في  
الغابة بعد  $t$  سنة من بدء دراسة عليها. أجد عدد الذئب في الغابة  
بعد 3 سنوات من بدء الدراسة، علماً بأن عددها عند بدء الدراسة  
هو 300 ذئب.

$dN/dt = 260 - 0.4N = 0.4(650 - N) dN 650 - N = 0.4 dt \int dN 650 - N = \int 0.4 dt - \ln$   
عام الحل  $|650 - N| = 0.4t + C \ln$   
الحل الخاص  $|350 650 - N| = 0.4t 350 \Rightarrow \ln |650 - N| = 0.4t - \ln \ln \Rightarrow$

لا يمكن أن يكون  $N = 650$  لأن  $\ln 0$  غير معرف ولأن  $N = 300$  عندما  $t = 0$  والاقتران  
( $N t$ ) متصل فلا يمكن أن يكون  $N$  أكبر من 650، ولذا فإن  $N > 0$  ويكون  $|N - 650|$   
مسار لـ  $N - 650$

$(350 650 - N) = \ln$  نعوض  $t = 3$  نجد  $(350 650 - N) = 0.4t N |350 650 - N| = \ln \ln \Rightarrow$   
 $1.2 \Rightarrow 350 650 - N = e^{65} \Rightarrow 650 - N 350 = e^{-65} N = 650 - 350 e^{-65} \approx 545$

إذن، بعد ثلاث سنوات يكون عدد الذئب في تلك الغابة 545 ذئباً تقريباً.

كرة: تنكم ش كرة، ويتغير نصف قطرها بمعدل يمكن نمذجته بالمعادلة التفاضلية:  
 $drdt = -0.0075r^2$ ، حيث  $r$  طول نصف قطر الكرة بالسنتيمتر، و  $t$  الزمن بالثواني  
 بعد بدء انكماش الكرة:

(27) أحل المعادلة التفاضلية لإيجاد طول نصف قطر الكرة بعد  $t$  ثانية، علماً بأن  
 طول نصف الكرة الابتدائي هو 20 cm.

$$drdt = -0.0075r^2 \int -dr r^2 = \int 0.0075 dt \quad 1r = 0.0075t + C$$

$$+0 = 120 \text{ العام الحل } r = 0.0075t + 120 \Rightarrow r = 20 \text{ عند } t = 0, r = 20$$

(28) بعد كم ثانية يصبح طول نصف قطر الكرة 10 cm؟

نضع  $r = 10$  في المعادلة الناتجة:

$$201 + 0.15t \Rightarrow 0.1 = 1 + 0.15t \Rightarrow 2 = 1 + 0.15t \Rightarrow t = 10.15 \approx 6.67s = 10$$

إذن، يكون طول نصف قطر الكرة 10cm بعد 6.67 ثانية تقريباً بعد بدء انكماشها.

حشرات: يتغير عدد الحشرات في مجتمع للحشرات بمعدل يمكن نمذجته بالمعادلة  
 التفاضلية:  $tdndt = 0.2n(0.2 - \cos t)$ ، حيث  $n$  عدد الحشرات، و  $t$  الزمن بالأسابيع بعد  
 بدء ملاحظة الحشرات:

(29) أحل المعادلة التفاضلية لإيجاد عدد الحشرات في هذا المجتمع بعد  $t$  أسبوعاً،  
 علماً بأن عددها الابتدائي هو 400 حشرة.

$$400 = 0 + C \Rightarrow \ln \text{ العام الحل } t) + Cn = 0.2(0.2t - \sin t) dt \quad \ln dn n = \int 0.2(0.2 - \cos t) dt$$

$$n400 = 0.2(0.400 \Rightarrow \ln t) + \ln n = 0.2(0.2t - \sin t) \text{ نعوض } 400 \text{ عند } t = 0, n = 400 \Rightarrow C = \ln$$

$$\text{ الخاص الحل } (t) \Rightarrow n = 400e^{0.2(0.2t - \sin 2t - \sin t)}$$

(30) أجد عدد الحشرات في هذا المجتمع بعد 3 أسابيع.

نعوض  $t = 3$  في المعادلة الأخيرة:

$$3) \approx 400e^{0.12 - 0.028} \approx 400e^{0.092} = 400e^{0.2(0.6 - \sin 3)} = 400e^{0.2(0.2t - \sin t)}$$

$$0.092 \approx 439$$

إذن، بعد 3 أسابيع يكون عدد الحشرات 439 حشرة تقريباً.

(31) تمثل المعادلة التفاضلية:  $x dy dx = y \cos$  ميل المماس لمنحنى علاقة ما، أجد قاعدة هذه العلاقة إذا علمت أن منحنىها يمر بالنقطة  $(0,1)$ .

$$C \Rightarrow C=0 \quad y=+0=0 \quad \text{الحل العام} \quad x+C|y| = \sin x dx \Rightarrow \ln x \int dy y = \int \cos dy dx = y \cos$$

$$xx \Rightarrow y = e \sin |y| = \sin \ln \Rightarrow \text{نعوض } 1, x=0$$

ملاحظة: منحنى الاقتران  $xy = -e \sin$  لا يمر بالنقطة  $(0,1)$ .

(32) تمثل المعادلة التفاضلية:  $x(x+1) dy dx = y$  ميل المماس لمنحنى علاقة ما، أجد قاعدة هذه العلاقة إذا علمت أن منحنىها يمر بالنقطة  $(1,3)$ .

$$1x(x+1) = Ax + Bx + 1A(x+1) + B(x) \quad \text{نستخدم الكسور الجزئية}$$

$$dy y = \int dx x(x+1) = \int dx (Ax + Bx + 1A(x+1) + B(x)) = \int dx (1x + 0) = \int dx x = \frac{1}{2} x^2 + C$$

$$23 = 0 - \ln \ln \quad \text{الحل العام} \quad |x+1| + C|x| - \ln|y| = \ln|y| = \int (1x + -1x + 1) dx \Rightarrow \ln \Rightarrow \ln$$

$$|y|6 \Rightarrow \ln|x+1| + \ln|x| - \ln|y| = \ln \ln \Rightarrow \text{نعوض } 6 \quad y=3, x=12 = \ln 3 + \ln + C \Rightarrow C = \ln$$

$$|6xx+1| \Rightarrow |y| = |6xx+1| \Rightarrow y = 6xx+1 = \ln$$

ملاحظة: منحنى الاقتران  $y = -6xx+1$  لا يمر بالنقطة  $(1,3)$