


## أدرب وأحل المسائل


### المتجهات في الفضاء

أعین کلاً من النقاط الآتية في نظام الإحداثيات ثلاثي الأبعاد:

(1)  $(4, 5, 3)$




(2)  $(-2, 3, -5)$



(3)  $(3, -4, 0)$

منهاجي



أجد الطول وإحداثيات نقطة المنتصف للقطعة المستقيمة التي أعطي طرفاها في كل مما يأتي:

(4)  $(5, 4, 2), (2, 8, -3)$

$$A(3, -2, 8), B(5, 4, 2) \quad AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} = \sqrt{2^2 + 6^2 + (-6)^2} = \sqrt{76} = 2\sqrt{19}$$

$$N = \left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right) = \left( \frac{3 + 5}{2}, \frac{-2 + 4}{2}, \frac{8 + 2}{2} \right) = (4, 1, 5)$$

(5)  $(5, 3, -2), (2, 7, 0)$

$$A(-2, 7, 0), B(2, -5, 3) \quad AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} = \sqrt{16 + 144 + 9} = \sqrt{169} = 13$$

$$N = \left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right) = \left( \frac{-2 + 2}{2}, \frac{7 - 5}{2}, \frac{0 + 3}{2} \right) = (0, 1, 3/2)$$

(6)  $(3, 6, 7), (5, -12, 8)$

$$A(12, 8, -5), B(-3, 6, 7) \quad AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} = \sqrt{225 + 4 + 144} = \sqrt{373}$$

$$N = \left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right) = \left( \frac{12 - 3}{2}, \frac{8 + 6}{2}, \frac{-5 + 7}{2} \right) = (9/2, 7, 1)$$


(7)  $(6, -3, 2), (8, 4, -5)$

$$A(-5, -8, 4), B(3, 2, -6) \quad AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2} = \sqrt{64 + 100 + 100} = \sqrt{264} = 2\sqrt{66}$$


$$N = \left( \frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}, \frac{z_1 + z_2}{2} \right) = \left( \frac{-5 + 3}{2}, \frac{-8 + 2}{2}, \frac{4 - 6}{2} \right) = (-1, -3, -1)$$

أمثل كلاً من المتجهات الآتية بيانياً في الفضاء:


$$(\vec{v} = \langle -3, -4, 5 \rangle) \quad (8)$$




$$(\vec{m} = \langle 2, -3, -4 \rangle) \quad (9)$$




$$(\vec{p} = \langle -3, 5, -2 \rangle) \quad (10)$$




$$(\vec{e} = -5\hat{i} + 3\hat{j} + 4\hat{k}) \quad (11)$$



$$(\vec{AB} : A(4, 1, 1), B(-3, 6, 3)) \quad (12)$$



(GH→:G(1,-3,5),H(0,4,-2) (13



أجد الصورة الإحداثية والمقدار للمتجه  $\vec{AB}$  الذي أعطيت نقطة بدايته ونقطة نهايته في كل مما يأتي:

(A(4,6,9),B(-3,2,5) (14

$$\vec{AB} = \langle -3-4, 2-6, 5-9 \rangle = \langle -7, -4, -4 \rangle \quad |\vec{AB}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{49 + 16 + 16} = \sqrt{81} = 9$$

$$(A(-8,5,7), B(6,3,2)) \quad (15)$$

$$AB \rightarrow = (6 - (-8), 3 - 5, 2 - 7) = (14, -2, -5) \quad |AB \rightarrow| = \sqrt{14^2 + (-2)^2 + (-5)^2} = \sqrt{196 + 4 + 25} = \sqrt{225} = 15$$

$$(A(12, -5, 4), B(4, 1, -1)) \quad (16)$$

$$AB \rightarrow = (4 - 12, 1 - (-5), -1 - 4) = (-8, 6, -5) \quad |AB \rightarrow| = \sqrt{(-8)^2 + 6^2 + (-5)^2} = \sqrt{64 + 36 + 25} = \sqrt{125} = 5\sqrt{5}$$

$$(A(24, -8, 10), B(10, 6, 3)) \quad (17)$$

$$AB \rightarrow = (10 - 24, 6 - (-8), 3 - 10) = (-14, 14, -7) \quad |AB \rightarrow| = \sqrt{(-14)^2 + 14^2 + (-7)^2} = \sqrt{196 + 196 + 49} = \sqrt{441} = 21$$

(18) إذا كان  $OAB$  مثلثاً فيه:  $OA \rightarrow = a$ ,  $AB \rightarrow = b$ , والنقطة  $C$  هي منتصف  $AB \rightarrow$ , فأكتب المتجه  $OC \rightarrow$  بدلالة  $a$  و  $b$ .

$$OC \rightarrow = OA \rightarrow + AC \rightarrow = a \rightarrow + \frac{1}{2}AB \rightarrow = a \rightarrow + \frac{1}{2}(b \rightarrow - a \rightarrow) = \frac{1}{2}(a \rightarrow + b \rightarrow)$$

إذا كان:  $e \rightarrow = (-3, 9, -4)$ ,  $f \rightarrow = 5i \hat{ - } 3j \hat{ + } 7k \hat{ }$ ,  $g \rightarrow = (-1, 8, -5)$  فأجد كلاً مما يأتي:

$$(3e \rightarrow + 4f \rightarrow) \quad (19)$$

$$3e \rightarrow + 4f \rightarrow = 3(-3, 9, -4) + 4(5, -3, 7) = (-9, 27, -12) + (20, -12, 28) = (11, 15, 16)$$

$$(e \rightarrow + f \rightarrow - 3g \rightarrow) \quad (20)$$

$$e \rightarrow + f \rightarrow - 3g \rightarrow = (-3, 9, -4) + (5, -3, 7) - 3(-1, 8, -5) = (5, -18, 18)$$

$$(4e \rightarrow - 2f \rightarrow + 3g \rightarrow) \quad (21)$$

$$4e \rightarrow - 2f \rightarrow + 3g \rightarrow = 4(-3, 9, -4) - 2(5, -3, 7) + 3(-1, 8, -5) = (-25, 66, -45)$$

$$(2e \rightarrow + 7f \rightarrow - 2g \rightarrow) \quad (22)$$

$$\langle 2e \rightarrow + 7f \rightarrow - 2g \rightarrow = 2\langle -3, 9, -4 \rangle + 7\langle 5, -3, 7 \rangle - 2\langle -1, 8, -5 \rangle = \langle 31, -19, 51 \rangle$$

إذا كانت:  $A(-1, 6, 5), B(0, 1, -4), C(2, 1, 1)$  نقاطاً في الفضاء، فأجد كلاً مما يأتي:  
(23) متجه موقع كل من النقاط: A و B و C.

$$\langle OA \rightarrow = \langle -1, 6, 5 \rangle, OB \rightarrow = \langle 0, 1, -4 \rangle, OC \rightarrow = \langle 2, 1, 1 \rangle$$

(24) متجه الإزاحة من النقطة B إلى النقطة A.

$$\langle BA \rightarrow = OA \rightarrow - OB \rightarrow = \langle -1, 6, 5 \rangle - \langle 0, 1, -4 \rangle = \langle -1, 5, 9 \rangle$$

(25) متجه الإزاحة من النقطة C إلى النقطة B.

$$\langle CB \rightarrow = OB \rightarrow - OC \rightarrow = \langle 0, 1, -4 \rangle - \langle 2, 1, 1 \rangle = \langle -2, 0, -5 \rangle$$

(26) المسافة بين النقطة C والنقطة B.

$$|BC \rightarrow| = \sqrt{2^2 + 0^2 + 5^2} = \sqrt{4 + 0 + 25} = \sqrt{29}$$

أكتب كلاً من المتجهات الآتية بدلالة متجهات الوحدة الأساسية:

$$(g \rightarrow = \langle 5, 7, -1 \rangle) \quad (27)$$

$$\hat{g} \rightarrow = 5\hat{i} + 7\hat{j} - \hat{k}$$

$$(ST \rightarrow : S(1, 0, -5), T(2, -2, 0)) \quad (28)$$

$$\hat{ST} \rightarrow = (2-1)\hat{i} + (-2-0)\hat{j} + (0-(-5))\hat{k} = \hat{i} - 2\hat{j} + 5\hat{k}$$

$$(a \rightarrow + 3b \rightarrow : a \rightarrow = \hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}, b \rightarrow = 4\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}) \quad (29)$$

$$\hat{a} \rightarrow + 3\hat{b} \rightarrow = -\hat{i} - 2\hat{j} + 4\hat{k} + 12\hat{i} - 9\hat{j} + 15\hat{k} = 11\hat{i} - 11\hat{j} + 19\hat{k}$$

أجد متجه وحدة في اتجاه كل متجه مما يأتي:

$$(4\hat{i} + 3\hat{j}) \quad (30)$$

$$\hat{v} \rightarrow = -4\hat{i} + 3\hat{j} \quad |v \rightarrow| = \sqrt{16 + 9} = 5 \quad \hat{v} = \frac{1}{5}v \rightarrow = -\frac{4}{5}\hat{i} + \frac{3}{5}\hat{j}$$

وهذا هو متجه الوحدة في اتجاه  $v \rightarrow$

$$(143i^{\wedge} - 24j^{\wedge}) \quad (31)$$

$$v \rightarrow = 143i^{\wedge} - 24j^{\wedge} \quad |v \rightarrow| = \sqrt{20449 + 576} = \sqrt{21025} = 145 \quad v^{\wedge} = \frac{1}{145} v \rightarrow = 143i^{\wedge} - 24j^{\wedge}$$

وهذا هو متجه الوحدة في اتجاه  $v \rightarrow$

$$(72i^{\wedge} + 33j^{\wedge} + 56k^{\wedge}) \quad (32)$$

$$v \rightarrow = 72i^{\wedge} + 33j^{\wedge} + 56k^{\wedge} \quad |v \rightarrow| = \sqrt{5184 + 1089 + 3136} = \sqrt{9409} = 97 \quad v^{\wedge} = \frac{1}{97} v \rightarrow = \frac{72}{97}i^{\wedge} + \frac{33}{97}j^{\wedge} + \frac{56}{97}k^{\wedge}$$

وهذا هو متجه الوحدة في اتجاه  $v \rightarrow$

$$(11138) \quad (33)$$

$$v \rightarrow = (11138) \quad |v \rightarrow| = \sqrt{121 + 169 + 64} = \sqrt{354} \quad v^{\wedge} = \frac{1}{\sqrt{354}} v \rightarrow = \frac{11}{\sqrt{354}}i^{\wedge} + \frac{13}{\sqrt{354}}j^{\wedge} + \frac{8}{\sqrt{354}}k^{\wedge}$$

وهذا هو متجه الوحدة في اتجاه  $v \rightarrow$

$$(5-4-2) \quad (34)$$

$$v \rightarrow = (5-4-2) \quad |v \rightarrow| = \sqrt{25 + 16 + 4} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \quad v^{\wedge} = \frac{1}{3\sqrt{5}} v \rightarrow = \frac{5}{3\sqrt{5}}i^{\wedge} - \frac{4}{3\sqrt{5}}j^{\wedge} - \frac{2}{3\sqrt{5}}k^{\wedge}$$

وهذا هو متجه الوحدة في اتجاه  $v \rightarrow$

$$(n \rightarrow = \langle -2, 0, 3 \rangle) \quad (35)$$

$$|n \rightarrow| = \sqrt{4 + 0 + 9} = \sqrt{13} \quad n^{\wedge} = \frac{1}{\sqrt{13}} n \rightarrow = \frac{-2}{\sqrt{13}}i^{\wedge} + \frac{3}{\sqrt{13}}k^{\wedge}$$

وهذا هو متجه الوحدة في اتجاه  $n \rightarrow$

(36) إذا كان:  $a \rightarrow = -3i^{\wedge} + 4j^{\wedge} + 12k^{\wedge}$ ,  $b \rightarrow = 7i^{\wedge} + 39j^{\wedge} - 2k^{\wedge}$ ، وكان:  $3a \rightarrow + cb \rightarrow = -23i^{\wedge} - 66j^{\wedge} + 40k^{\wedge}$ ، فأجد قيمة  $c$ .

$$3a \rightarrow + cb \rightarrow = 3(-3i^{\wedge} + 4j^{\wedge} + 12k^{\wedge}) + c(7i^{\wedge} + 39j^{\wedge} - 2k^{\wedge}) = (-9 + 7c)i^{\wedge} + (12 + 39c)j^{\wedge} + (36 - 2c)k^{\wedge} = -23i^{\wedge} - 66j^{\wedge} + 40k^{\wedge} = (-9 + 7c)i^{\wedge} + (12 + 39c)j^{\wedge} + (36 - 2c)k^{\wedge}$$



في هذه المعادلة يتساوى المتجهان، إذن، فإن إحداثياتهما المتناظرة متساوية:

$$9+7c=-23, 12+39c=-66, 36-2c=40$$

وعند حل هذه المعادلات نجد أن لها الحل نفسه  $c=-2$

(37) إذا كان:  $t \rightarrow = (3v, 2)$ ،  $s \rightarrow = (2w+47, -4)$ ، وكان:  $w \rightarrow = (6, 31)$ ، فأجد قيمة كل من  $v$  و  $w$  و  $k$ .

$$ks \rightarrow - 4t \rightarrow = k(2w+47, -4) - 4(3v, 2) = (2k-12k(w+47), -4v-4k-8) \Rightarrow (6, 31) \\ w) = (2k-12k(w+47), -4v-4k-8) \Rightarrow 2k-12=6 \Rightarrow k=9-4k-8=w \Rightarrow w=-36 \\ -8=-44k(w+47)-4v=31 \Rightarrow 9(-44+47)-4v=31 \Rightarrow v=-1$$

(38) إذا كان:

$$5m \rightarrow + 2p \rightarrow = 4n \rightarrow, \text{ فما قيمة } a \text{ الثابت}$$

$$5m \rightarrow + 2p \rightarrow = 4n \rightarrow \Rightarrow 5(4, 1, -2) + 2(2, a, -1) = 4(6, 2, -3) \Rightarrow (24, 5+2a, -12) = (24, 8, -12)$$

في هذه المعادلة يتساوى المتجهان، إذن، فإن إحداثياتهما المتناظرة متساوية:

$$5+2a=8 \Rightarrow a=3/2$$

(39) إذا كان:  $v \rightarrow = (u-3, u+1, u-2)$ ، وكان:  $|v \rightarrow| = 17$ ، فما قيمة  $u$  ؟

$$|v \rightarrow| = \sqrt{(u-3)^2 + (u+1)^2 + (u-2)^2} = 17 \\ u^2 - 6u + 9 + u^2 + 2u + 1 + u^2 - 4u + 4 = 289 \\ 3u^2 - 8u - 275 = 0 \\ u = \frac{8 \pm \sqrt{64 + 3300}}{6} = \frac{8 \pm 58}{6} \\ u = 11 \text{ أو } u = -25$$

(40) إذا كان متجهها الموقع للنقطة  $G$  والنقطة  $H$  هما:

$$g \rightarrow = (-2, c+1, -8) \text{ و } h \rightarrow = (c-1, -4, c+2) \text{، على الترتيب، فأجد قيمة } c \text{، علماً بأن: } |GH \rightarrow| = 19, \text{ وأن: } c > 0.$$

$$GH \rightarrow = (c-1-(-2), -4-(c+1), c+2-(-8)) = (c+1, -5-c, c+10) \\ |GH \rightarrow| = \sqrt{(c+1)^2 + (-5-c)^2 + (c+10)^2} = 19 \\ c^2 + 2c + 1 + 25 + c^2 + 20c + 100 = 361 \\ 3c^2 + 32c - 235 = 0 \\ c = \frac{-32 \pm \sqrt{1024 + 28350}}{6} = \frac{-32 \pm 173}{6} \\ c = 5 \text{ أو } c = -47$$

ولكن  $c > 0$  إذن،  $c = 5$